مزینوکس-آی اچ ۱۲۰۰

مزالازین پیوسته رهش

قرص پیوسته رهش حاوی ۱۲۰۰ میلی گرم مزالازین

پیش از شروع مصرف مزینوکس-آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی اطلاعات جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

مزینوکس-آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود:

قرص مزینوکس-آی‌اچ (م-زی-نوکس-آی اچ) حاوی ۱۲۰۰ میلی‌گرم ماده موثره مزالازین می‌باشد که به گروه دارویی ۵- آمینو سالیسیلیک اسید تعلق دارد. مزینوکس-آی اچ به عنوان درمان و دوز نگهدارنده جهت بهبود فرم فعال خفیف تا متوسط کولیت اولسراتیو استفاده می‌شود. بیماری کولیت اولسراتیو التهاب تکرار شونده در لایه مخاطی روده بزرگ می باشد.

آنچه که باید پیش از مصرف داروی مزینوکس-آی اچ بدانید:

مزینوکس-آی اچ برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه با توصیه به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه با شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید:

- اگر به مزالازین، سالیسیلات‌ها، آمینوسالیسیلات‌ها یا سایر ترکیبات فرمولاسیون حساسیت دارید.

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

- مصرف این دارو در بیمارانی که مستعد پریکاردیت (التهاب پرده قلب) و میوکاردیت (التهاب عضله قلب) می‌باشند، با احتیاط صورت پذیرد (به دلیل واکنش‌های افزایش حساسیتی قلبی ناشی از مزالازین).
- اگر مبتلا به اختلالات انسدادی دستگاه گوارش هستید، بایستی این دارو را با احتیاط مصرف کنید. در بیماران مبتلا به تنگی پیلور یا هر گونه نارسایی در عملکرد دستگاه گوارش فوقانی، ممکن است احتیاس طولانی مدت قرص ها در معده و یا تاخیر در آزادسازی مزینوکس-آی اچ در کولون ایجاد شود.
- مصرف مزینوکس-آی اچ ممکن است سبب ایجاد سندرم عدم تحمل حاد، همانند: گرفتگی و انقباض، دردهای شکمی، اسهال خونی و در برخی مواقع ایجاد تب، سردرد، بدحالی، خارش، راش پوستی و ورم ملتحمه گردد. در صورت وقوع با احتمال وقوع سندرم مذکور، مصرف این دارو قطع گردد.
- مصرف این دارو در بیمارانی که حساسیت شدید به سولفاسالازین دارند با احتیاط صورت پذیرد. این گروه از بیماران ممکن است نسبت به مزینوکس-آی اچ هم واکنش نشان دهند.
- مواردی از ایجاد واکنش های حساسیتی شدید، به دنبال استفاده از مزالازین گزارش شده است که ممکن است شامل درگیری اندام های درونی همانند: هپاتیت، اختلالات خونی و یا پنیومونی (عفونت ریه) باشد. در صورت ایجاد واکنش های افزایش حساسیتی ناشی از مصرف مزینوکس-آی‌اچ، مصرف این دارو قطع گردد.
- مصرف مزینوکس-آی‌اچ ممکن است سبب ایجاد عوارض کلیوی، همانند: نفروپاتی، نفریت بینابینی حاد یا مزمن، سندرم نفروتیک و به ندرت سبب نارسایی کلیه شود. بنابراین توصیه می گردد پیش از شروع درمان و یا در بازه های زمانی مشخص در طول مدت درمان، عملکرد کلیه مورد ارزیابی قرار گیرد.
- مواردی از الیگواسپرمی (کاهش تعداد اسپرم ها) ناشی از مصرف این دارو در مردان گزارش شده است (از جمله موارد نادر و بازگشت پذیر می باشد).
- مصرف مزینوکس-آی اچ در افراد بالای ۶۵ سال بایستی با احتیاط صورت پذیرد. گزارش های دریافتی بیانگر افزایش وقوع دیسکرازی خونی در بیماران با سن بالاتر از ۶۵ سال می باشد. لازم است در طول مدت درمان، آزمایشات CBC به صورت دوره ای انجام شود. همچنین ممکن است عملکرد کلیه در بیماران مسن کاهش پیدا کرده باشد.

مزینوکس-آی اچ را چگونه مصرف کنید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

در بزرگسالان:

- جهت درمان بیماری: ۲/۴ یا ۴/۸ گرم در روز
- درمان نگهدارنده: ۲/۴ گرم در روز

چطور مصرف کنید: دارو را همراه با یک لیوان پر از آب (۲۵۰ میلی‌لیتر) میل نمایید. از شکستن، خردکردن و جویدن قرص خودداری نمایید.

چه زمانی مصرف کنید: دارو را همراه با بلافاصله بعد از غذا میل نمایید.

برای چه مدت مصرف کنید: مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید. چنانچه قصد دارید مصرف دارو را متوقف نمایید، در این خصوص با پزشک خود مشورت کنید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید: بلافاصله پس از به خاطر آوردن، یک قرص مصرف کنید. اگر نزدیک به زمان مصرف قرص بعدی است، از مصرف قرص فراموش شده خودداری نموده و استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. از دو برابر کردن دوز مصرفی خودداری نمایید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید (Overdose): بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید.

مزینوکس-آی اچ یک آمینو سالیسیلات است و نشانه های مسمومیت با سالیسیلات ممکن است شامل: وزوز گوش، سرگیجه، سردرد، گیجی، خواب آلودگی، تعریق، تشنج، نفس تنگی، نفس زدن، تنگی نفس، استفراغ و اسهال باشد. مسمومیت شدید، ممکن است منجر به از بین رفتن تعادل الکترولیتی و pH خون، هایپرترمی، کمبود آب بدن و آسیب به ارگان های حیاتی گردد. لازم به ذکر است که پادزهری برای مزینوکس-آی اچ وجود ندارد، اگرچه درمان های معمول مربوط به رفع مسمومیت ناشی از سالیسیلات در موارد حاد سوء مصرف می تواند سودمند باشد. عدم تعادل مایعات و الکترولیت های بدن بایستی از طریق درمان های داخل وریدی مناسب اصلاح شود. همچنین عملکرد مناسب کلیه نیز بایستی بررسی گردد.

آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیردهی:

- در مطالعات تولید مثل حیوانی عوارض جانبی مشاهده نشده است. در صورت نیاز به درمان بیماری‌های التهابی روده در طول مدت بارداری، ممکن است از مزینوکس-آی اچ استفاده شود.
- به دلیل احتمال ایجاد هر گونه عوارض جانبی مانند اسهال در نوزادان، مصرف این دارو در طول مدت شیردهی با احتیاط صورت پذیرد.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
- آنتی اسیدها: از مصرف هم زمان آنتی اسیدها با قرص پیوسته رهش مزینوکس-آی اچ پرهیز کنید.
- گلیکوزیدهای قلبی: از مزینوکس-آی‌اچ به دلیل کاهش غلظت سرمی گلیکوزیدهای قلب توسط مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید، با احتیاط استفاده کنید.
- آنتاگونیست‌های هیستامینی (H_2): به دلیل افزایش pH دستگاه گوارش، از مصرف هم‌زمان آنتاگونیست‌های گیرنده هیستامینی با دوز بالا به همراه قرص پیوسته رهش مزینوکس-آی اچ، پرهیز کنید.
- هیاربن و هیاربن با وزن مولکولی پایین: مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید ممکن است سبب تقویت عوارض جانبی یا اثرات سمی هیاربن یا هیاربن با وزن ملکولی پایین گردد.
- عوامل ضدالتهابی غیر استروئیدی: داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی ممکن است سبب افزایش اثرات سمی مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید بر کلیه گردد.
- مهارکننده های پمپ پروتون: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است سبب کاهش اثرات درمانی مزینوکس-آی اچ گردند. از مصرف هم زمان مهارکننده های پمپ پروتون با مقادیر بالا، به همراه قرص پیوسته رهش مزینوکس-آی اچ پرهیز کنید.
- آنالوگ‌های تیوپورین: مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید، ممکن است سبب کاهش متابولیسم آنالوگ‌های تیوپورین گردند.
- واکسن حاوی ویروس واریسلا: مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید، ممکن است سبب افزایش سمیت واکسن حاوی ویروس واریسلا گردد. اولین نکته ای که به دنبال مصرف سالیسیلات در کودکان مبتلا به عفونت واریسلا باید مد نظر قرار گیرد، احتمال ابتلا به سندرم ری می باشد.

عوارض جانبی احتمالی مصرف مزینوکس-آی اچ:

هر دارو به موارات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض ممکن است در یک فرد دیده نشود ولی در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- عوارض با شیوع بیشتر از ۱۰٪ : سردرد، دردهای شکمی، آروغ، بدتر شدن کولیت اولسراتیو، حالت تهوع، فارنژیت، نازوفارنژیت، ضعف و تب.
- عوارض با شیوع کمتر از ۱۰٪ : درد قفسه سینه، فشار خون بالا، ادم محیطی، گشادشدگی رگ ها، اضطراب، لرز، سرگیجه، خستگی، سختی و سفتی عضلانی، بی خوابی، بد حالی، میگرن، عصبانیت، پارستزی (گزگز شدن اندام‌ها)، سرگیجه، آکنه ولگاریس، آلوپسی، بوسته پوسته‌شدن، خارش، راش پوستی، افزایش تری گلیسیرید خون، کاهش وزن، ورم شکم، مدفوع غیر عادی، دردهای روده ای- مقعدی، اسهال خونی، پیوست، اسهال، سوء هاضمه، نفخ شکم، گاستروانتریت، خونریزی دستگاه گوارش، هموروئید، پانکراتیت، درد در ناحیه مقعد، کلانژیت (التهاب مجاری صفراوی)، تانسموس (احساس نیاز به دفع مدفوع علی رغم خالی بودن کولون)، استفراغ، وجود خون در ادرار، کاهش هماتوکریت خون، کاهش هموگلوبین خون، خونریزی مقعدی، عملکرد نامناسب کبدی، هپاتیت کولستاتیک، افزایش ALT (آلانین آمینوترنسفراز) و ترانس آمینازهای سرم، آنافیلاکسی، عفونت، عفونت ویروسی، تب، سندرم عدم تحمل، درد مفاصل، التهاب و سفتی مفاصل، درد در ناحیه پشت، دردهای اسکلتی عضلانی (پا / مفاصل)، درد عضلانی، ضعف، ورم ملتحمه، اختلال بینایی، درد گوش، وزوز گوش، کاهش دفع کراتینین، پر ادراری، برونشیت، سرفه، تنگی نفس، التهاب بینی، سینوزیت، خواب آلودگی و گلودرد.

آیا می‌دانید در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی می‌توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقاء گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است.)

مزینوکس-آی اچ چگونه نگهداری می شود:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- در طول مدتی که قرص های خود را مصرف می کنید آن ها را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری کنید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری نمایید.

توصیف محصول:

شکل ظاهری مزینوکس-آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص پیوسته رهش مزینوکس-آی اچ به صورت قرمز مایل به قهوه ای، بیضی شکل، با حکاکی ⚠ بر یک طرف قرص می‌باشد که در جعبه‌های ۳۰ عددی (حاوی ۳ بلیستر کارت ۱۰ عددی)، همراه با برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

مزینوکس-آی اچ محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.

کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران.
تلفن صدای مشتری: ۹-۹۸۲۱۴۴۹۰۵۵۱۷+ (داخلی ۳۵۸)

تاریخ بازنگری:

۱۳۹۹/۰۴/۲۲

شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.