



شرکت داروسازی ایران هورمون
IRAN HORMONE PHARMACEUTICAL Co.

تاریخچه شرکت داروسازی ایران هورمون

آرمان ما تلاش برای جامعه ای سالمتر

کارخانه داروسازی ایران هورمون در سال ۱۳۴۳ تحت نام "ایران اورگانون" در تهران

به ثبت رسید و در سال ۱۳۶۰ به "ایران هورمون" تغییر نام یافت.

ایران هورمون یکی از مهمترین کارخانجات تولیدکننده داروهای هورمونی از قبیل داروهای موثر بر غده تیروئید، داروهای ضد سرطان با منشاء هورمونی، هورمونهای جنسی، داروهای موثر در نازائی و همچنین داروهای قلبی و عروقی، داروهای موثر بر فشارخون، آنتی دیابتیک ها، کورتیکواستروئیدها، شل کننده های عضلات و ویتامین ها می باشد، تولیدات این کارخانه شامل انواع قرص و آمپول می باشد.

از بارزترین امتیازات شرکت ایران هورمون، وجود آزمایشگاه کنترل کیفی است که از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موفق به اخذ گواهینامه، آزمایشگاه مرجع گردیده است.

کیفیت مرغوب محصولات ایران هورمون سبب صادرات این محصولات به کشورهای متعددی گردیده است.

شرکت ایران هورمون در این راستا قادر به دریافت چندین گواهینامه معتبر از جمله: دریافت لوح سبز از سازمان حفاظت محیط زیست، گواهینامه ISO 9001: 2008 و گواهینامه اشتها به کیفیت از سازمان غذا و داروی کشور گردیده است.

فهرست محصولات

۹	آتراکورین (آتراکوریم بزیلات)
۱۰	بروموزیت - آی اچ ۲/۵ (بروموکریتین)
۱۱	درولوکسان (اکساندرولون)
۱۲	اپی نالین (اپی نفرین)
۱۳	اگزیمکس (اگزیمستان)
۱۴	لوپارین (انوکسپارین سدیم)
۱۵	اسلاکتون ۲۵ و ۱۰۰ (اسپیرونولاکتون)
۱۶	ماکساندولین ۵۰ (اکسی متانول)
۱۷	بیکاناکس - آی اچ (بیکالوتامید)
۱۸	آمپول بتازونکس (بتامتازون)
۱۹	آمپول بتازونکس ال.آ. (بتامتازون ال.آ.)
۲۰	قرص بتازونکس (بتامتازون)
۲۱	بروموکریتین (بروموزیت - آی اچ ۲/۵)
۲۲	پروژسترون (فموژکس - آی اچ)
۲۳	پرامی پکسول (پراسول)
۲۴	پروتامین سولفات (آتراکوریم بزیلات)
۲۵	پروپیل تیواوراسیل (پرواوراسیل ۵۰)
۲۶	پردنیزولون (نیزوپرد ۵ و ۵۰)
۲۷	تریامسینولون استوناید (کورتیران)
۲۸	تاموکسیفن سیترات (آتراکوریم بزیلات)
۲۹	تستوسترون انانتات ۱۰۰ و ۲۵۰ (آندوزیکس - آی اچ)
۳۰	تتراکوزاکتاید ال.آ. (سیناکران)
۳۱	دروسپیرنون + اتینیل استرادیول (کنتراسمین)
۳۲	داینوژست (اندورین - آی اچ)
۳۳	آمپول دگزامتازون سدیم فسفات (دکامزون)
۳۴	قرص دگزامتازون (دکامزون ۰/۵ و ۴)
۳۵	دیدروژسترون (دروژکس - آی اچ)
۳۶	داینوژست + اتینیل استرادیول (داینوژیل - آی اچ)
۳۷	رالوکسیفن هیدروکلراید (رالوکسن)
۳۸	رزوواستاتین کلسیم (رزویک - آی اچ)
۳۹	ریواروکسابان (آنکلات - آی اچ ۱۰-۱۵-۲۰)
۴۰	سیپروترون کامپاند (سیپروترون استات + اتینیل استرادیول) (اتیسترون)
۴۱	سیپروترون استات (آندروستین)
۴۲	سیس آتراکوریم بزیلات (سیس آتراکورین)
۴۳	سولیفناسین سوکسینات (سوفاسین - آی اچ)
۴۴	فلوتامید (فلوتاناکس)
۴۵	فیناستراید (فینازکس - آی اچ ۱)
۴۶	فیناستراید (فینازکس - آی اچ ۵)
۴۷	کابرگولین (کابرلین ۱)
۴۸	کابرگولین (کابرلین ۰/۵)

فهرست محصولات

۴۹	کنتراسپتیبو اچ دی (لوونورژسترل + اتینیل استرادیول) (اووستاپ-اچ)
۵۰	کنتراسپتیبو ال دی (لوونورژسترل + اتینیل استرادیول) (اووستاپ-ال)
۵۱	کنتراسپتیبو DE (دزوژسترل + اتینیل استرادیول) (دزوسپتیبو)
۵۲	کلومیفن سیترات (اوومید)
۵۳	کلسیم کربنات + ویتامین د۳ (ویتاکلسیک)
۵۴	کلسیم کربنات + منیزیم هیدروکساید + زینک سولفات + ویتامین د۳ (بن کر)
۵۵	کتورولاک ترومتامین (کلاتوزکس- آی اچ ۱۵ و ۳۰ آمپول)
۵۶	کتورولاک ترومتامین (کلاتوزکس- آی اچ قرص)
۵۷	گلی کلزید (کلازکس)
۵۸	لتروزول (لتروغم)
۵۹	لیدوکاین هیدروکلراید
۶۰	لوونورژسترل (لونژیل ۱/۵ و ۰/۵)
۶۱	لوزارتان پتاسیم (لیوترین)
۶۲	لووتیروکسین سدیم (لووکسین)
۶۳	مجستروول استات (جستیران)
۶۴	متفورمین هیدروکلراید (متگلیندین)
۶۵	متیل پردنیزولون استات (دپوکورتین)
۶۶	مدروکسی پروژسترون استات + استرادیول سیپیونات (دپوغم)
۶۷	مزالازین (مزینوکس- آی اچ ۱۲۰۰)
۶۸	مزالازین (مزینوکس- آی اچ ۵۰۰)
۶۹	متی مازول (تیرومت- آی اچ)
۷۰	ملوکسیکام (کاملوکس)
۷۱	مدروکسی پروژسترون استات (مدروغم)
۷۲	مدروکسی پروژسترون استات (دپوجسترون)
۷۳	ناندرولون دکانات (دکاندرولون)
۷۴	ناپروکسن سدیم (ناپرون ۲۵۰ و ۵۰۰)
۷۵	ویتامین ۳ (سان ویت)
۷۶	ویتامین ب ۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)
۷۷	ویتامین ب ۱۲ (بیتایون ۵۰۰ و ۱۰۰۰)
۷۸	ویتامین اچ (بیوتین) (ویتا اچ ۵ میلی گرم)
۷۹	ویتامین اچ (بیوتین) (ویتا اچ ۳۰۰ میکروگرم)
۸۰	ویتامین Vit.B1 + Vit.B6 + Vit.B12 (بنوروویت)
۸۱	ویتامین ب کمپلکس Dexpanthenol + Nicotinamide + Vit.B6 + Vit.B2 + Vit.B1
۸۲	والگاسیکلوویر (به صورت هیدروکلراید) (والگاسیت-آی اچ)
۸۳	والاسیکلوویر هیدروکلراید (ویراترکس-آی اچ)
۸۴	وریکونازول (وکوزیکس- آی اچ)
۸۵	هیدروکسی پروژسترون کاپروات (هیدروژکس- آی اچ ۲۵۰ و ۵۰۰)
۸۶	هپارین سدیم
۸۷	هیدروکورتیزون (سوکورتیز)

فهرست محصولات ایران هورمون به ترتیب حروف الفبا

نام ژنریک	نام تجاری	شکل دارویی	دوز	موارد مصرف
آتراکوریوم بزیلات	آتراکورین	آمپول		- همراه با داروهای بیهوش کننده ی عمومی برای شل کردن عضلات اسکلتی - برای تسهیل لوله گذاری تراشه و ونتیلاسیون مکانیکی - تسهیل ونتیلاسیون مکانیکی در بیماران آی سی یو
آیرون سوکروز		آمپول		آنمی کمبود آهن
اکساندرولون	درولوکسان	قرص		- افزایش توده و قدرت عضلانی افزایشده ی توان و قدرت بدنی در ورزشکاران - کمک به جبران کاهش وزن بعد از جراحی و ترومای شدید و عفونت های مزمن
ابی نفرین هیدروژن تارترات	ابی نالین	آمپول		تنگ کننده عروقی / گشاد کننده ی برونش / درمان آلرژی حاد و شوک آنافیلاکسی
اگزِمستان	اگزیمکس	قرص		موثر در سرطان متاستاتیک پستان در زنان بعد از یائسگی که در ریسک ابتلا به سرطان پستان هستند.
انوکساپارین سدیم	لوپارین	سرنگ آماده تزریق		ضد انعقاد تزریقی هیپارینی با وزن مولکولی کم پیشگیری و درمان ترومبوزیس وریدهای عمیقی
اسپیرونولاکتون	اسلاکتون	قرص		- درمان آکنه و ریزش مو / ضد فشار خون - درمان ادم-تارسایی قلبی-هیپوکالمی
اکسی متیلون	ماکساندولین	قرص		درمان آنمی آپلاستیک / افزایش توده و قدرت عضلانی در بدن سازی
بیکالوتامید	بیکاناکس-آی اچ	قرص		سرطان پروستان، متاستاتیک
بتامتازون سدیم فسفات	بتازونکس	آمپول		درمان طبق وسیع بیماری های وابسته به استروئید
بتامتازون ال.آ. (بتامتازون سدیم فسفات + بتامتازون استات)	بتازونکس ال.آ.	آمپول		استروئید تزریقی طولانی اثر که کاربردهای درمانی متعددی دارد. - فرمولاسیون دیوی یکنواخت و همگون از بتامتازون - تجمع شروع اثر سریع و تداوم اثر دارو - تزریق عضلانی - داخل مفصلی (سیوویال) - داخل پوستی - داخل ضایعه
بتامتازون	بتازونکس	قرص		گلوکوکورتیکوئید خوراکی که برای درمان طیف وسیعی از بیماری های وابسته به استروئید به کار می رود.
بروموکریپتین مزيلات	بروموزیت -آی اچ	قرص		درمان هایپرولاکتینمی / ضد پارکینسون / درمان آکرومگالی
پروژسترون	فموژکس - آی اچ	آمپول		تصحیح عدم تعادل هورمونی در زنان درمان آمنوره درمان خونریزی های غیر طبیعی رحم
پرامی پکسون	پراسول	قرص		- درمان پارکینسون به تنهایی یا همراه با لوودوبا - درمان علامتی سندرم پای بی قرار
پروتامین سولفات	پروسولفامین	آمپول		برای حثی کردن اثر ضد انعقادی هیپارین: - قبل از جراحی - بعد از دیالیز کلیوی - بعد از جراحی قلب باز - در Overdosing هیپارین
پروپیل تیواوراسیل	پرواوراسیل	قرص		هایپر تیروئیدیسم
پردنیزولون	نیزوپرد	قرص		درمان طیف وسیع بیماری های وابسته به کورتیکواستروئید /
پردنیزولون فورت	نیزوپرد فورت			آلرژی و آنافیلاکسی
تریامسینولون استوناید	کورتیران	آمپول		گلوکوکورتیکوئید تزریقی طولانی اثر تزریق عضانی برای طیف وسیع بیماری های وابسته به استروئید - تزریق داخلی مفصلی برای آرتریت - بورسیت - تنوسینوویت
تاموکسیفن سیترات	نولومون	قرص		درمان ادجوانت سرطان اولیه و متاستاتیک پستان و DCIS - تنها داروی FDA- approved برای پیشگیری از سرطان پستان در زنان high risk در سنین پیش از یائسگی - داروی FDA- approved برای پیشگیری از سرطان پستان در زنان (high risk chemoprevention)

فهرست محصولات ایران هورمون به ترتیب حروف الفبا

نام ژنریک	نام تجاری	شکل دارویی	دوز	موارد مصرف
تستوسترون انانتات	آندوزیکس - آی اچ	آمپول		- بهبود عملکرد جنسی و فیزیکی و Vitality در مردان ۶۵ سال با سطح سرمی کاهش یافته ی تستوسترون - افزایش توده و قدرت عضلانی و Performance - Enhancing در ورزشکاران
تتراکوزاکتاید استات آل-آ	سیناکران	آمپول		- آلترناتیو به درمان با کورتیکواستروئیدها/ جذب آهسته و اثرات پیوسته - خواص آنتی ژنیک ضعیف تر نسبت به ACTH طبیعی
دروسیپرون + اتینیل استرادیول	کنتراسمین	قرص		- کنتراسپتیو خوراکی/ درمان سندرم پیش از قاعدگی - درمان آکنه در زنان بالاتر از ۱۴ سال
داینوژست	اندورین - آی اچ	قرص		داروی انتخابی در زنان مبتلا به آندومتریوز
دگزامتازون سدیم فسفات	دکامزون	آمپول		استروئید پر قدرت و طولانی اثر با کاربردهای درمانی بی شمار
دگزامتازون	دکامزون	قرص		استروئید پر قدرت و طولانی اثر با کاربردهای درمانی بی شمار
دیدروژسترون	دروژکس - آی اچ	قرص		موثر در تمامی موارد کمبود پروژسترون آندوژن
داینوژست + اتینیل استرادیول	داینوژیل - آی اچ	قرص		- مهار کننده ی تخمک گذاری با اثربخشی مطمئن کنتراسپتیو - ضد آکنه و برطرف کننده ی پوست و موی چرب
رالوکسیفن هیدروکلراید	رالوکسن	قرص		پیشگیری و درمان استئوپروزیس در زنان بعد از سنین یائسگی کاهش ریسک سرطان مهاجم پستان در زنان بعد از سنین یائسگی
رزوواستاتین کلسیم	رزویل - آی اچ	قرص		- داروی انتخابی برای درمان هایپر لیپیدمی و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی - موثر ترین دارو در کاهش کلسترول LDL-
ریواروکسابان	آنکلات - آی اچ	قرص		پیشگیری و درمان ترمبوآمبولیسم وریدی تنها داروی ضد انعقاد خوراکی FDA - approved برای درمان ترمبوآمبولیسم حاد وریدی
سیپروترون کامپاند (سیپروترون استات + اتینیل استرادیول)	اتیسترون	قرص		- درمان آکنه شدید وابسته به آندروژن یا بدون سبوره آ در زنان - درمان هیرسوتیسم در زنان - پیشگیری از بارداری
سیپروترون استات	آندروستین	قرص		درمان ریزش مو - هیرسوتیسم و آکنه در زنان درمان سرطان پروستات در مردان
سیس آتراکوریوم بزیلات	سیس آتراکورین	آمپول		- همراه با داروهای بیهوش کننده ی عمومی برای تسهیل در لوله گذاری تراشه و شل کردن عضلات اسکلتی در طی جراحی با ونتیلاسیون مکانیکی در بیماران آی سی یو
سولیفناکسین سوکسینات	سوفاسین - آی اچ	قرص		درمان علامتی مثانه ی بیش فعال و بی اختیاری ادرار
فوتامید	فلوتاناکس	قرص		- پیشگیری از زبانه کشیدن بیماری در سرطان متاستاتیک پروستات تحت درمان با آنالوگ های GnRH - افزایش طول عمر بیماران با سرطان متاستاتیک پروستات
فیناستراید	فینازکس - آی اچ	قرص		- درمان انتخابی برای پیشگیری و درمان ریزش آنروژنیک مو در مردان - تنها داروی خوراکی برای پیشگیری و درمان ریزش مو و افزایش رشد مجدد موها - درمان طبعی و غیر تهاجمی هیپرتروفی خوش خیم پروستات - درمان بزرگی خوش خیم پروستات بدون برش جراحی - کاهش سایز پروستات - کاهش ریسک احتباس حاد ادراری
کارگولین	کابرلین	قرص		درمان هایپرپرولاکتینمی ضد پارکینسون
کنتراسپتیو آی اچ دی (لوونورژسترل + اتینیل استرادیول)	اووستاپ - آی اچ	قرص		پیشگیری از بارداری

فهرست محصولات ایران هورمون به ترتیب حروف الفبا

نام ژنریک	نام تجاری	شکل دارویی	دوز	موارد مصرف
کنتراسپتو ال دی (لوونورژسترل + اتینیل استرادیول)	اووستاپ - ال	قرص		پیشگیری از بارداری
کنتراسپتو DE (دزوژسترل + اتینیل استرادیول)	دزوسپتو	قرص		کنترل آکنه در زنان پیشگیری از بارداری
کلوپیدوگrel بی سولفات	پلاگرو	قرص		- سندروم های حاد کرونری - انفارکتوس میوکارد، استروک ایسکمیک، یا بیماری آترواسکلروتیک محیطی
کلومیفن سیترات	اوومید	قرص		محرك تخمک گذاری/ درمان اختلال تخمک گذاری/ درمان ناباروری
کلسیم کربنات + ویتامین د۳	ویتاکلسیک	قرص		مکمل غذایی/ درمان پایه ای استاندارد برای پوکی استخوان کاهش ریسک شکستگی در پوکی استخوان ناشی از یائسگی
کلسیم کربنات + منیزیم هیدروکساید + زینک سولفات + ویتامین د۳	بن کر	قرص		این فرآورده یک مکمل تغذیه ای بوده و شامل مقادیر مورد نیاز روزانه کلسیم، منیزیم، زینک و ویتامین د۳ می باشد که صرفاً جهت کمک به سلامت استخوان ها کاربرد دارد.
کتورولاک ترومتامین	کلاتوزکس - آی اچ	آمپول		داروی ضدالتهاب غیر استرویدی/ داروی ضد درد غیر مخدر/ درمان دردهای شدید بعد از عمل جراحی
		آمپول		
		قرص		
گلی کلازید	کلازکس	قرص		درمان دیابت نوع ۲/ کنترل مقاومت به انسولین
لنروزول	لنروقم	قرص		درمان ادجوانت سرطان پستان (وابسته به هورمون) اولیه در یائسگی ادامه ی درمان ادجوانت سرطان پستان اولیه بعد از تاموکسیفن در یائسگی درمان خط اول در سرطان متاستاتیک پستان (وابسته به هورمون) در یائسگی
لیدوکاین هیدروکلراید		قرص		بی حس کننده ی موضعی آمیدی/ ضد آریتمی قابلیت تزریق موضعی - ناحیه ای - اپیدورال درمان آریتمی های بطنی
لوونورژسترول	لونژیل	آمپول		پیشگیری فوری از بارداری
لوزارتان پتاسیم	لوتنسین	قرص		ضد فشار خون/ درمان هایپر تانسیون در بزرگسالان و کودکان/ درمان نفروپاتی دریاپتیک
لیوتیرونین سدیم	لیوترین	قرص		درمان کمای میکزادم در کودکان و بزرگسالان درمان نارسایی شدید و مزمن تیروئید و هیپوتیروئیدیسم ناشی از درمان تیروتوکسیکوزیس درای کمکی همراه با داروهای ضد تیروئید برای پیشگیری از هیپوتیروئیدیسم
لووتیرکسین سدیم	لووکسین	قرص		درمان انتخابی و استاندارد طلایی برای درمان جایگزینی در هیپوتیروئیدیسم
مجسترو ل استات	جستیران	قرص		درمان پالپاتیو سرطان پیشرفته ی پستان و آندرومتر
متفورمین هیدروکلراید	متگلیندین	قرص		درمان انتخاب اول برای شروع درمان دیابت نوع ۲ - موثرترین دارو در رساندن HbA1c % - پیشگیری از پیشرفت وضعیت پیش دیابتیک به دیابت
متیل پردنیزولون استات	دپوکورتین	آمپول		گلوکوکورتیکوئید تزریقی طولانی اثر که برای درمان طیف وسیع بیماری های وابسته به استروئید به کار می رود.
مدروکسی پروژسترون استات + استرادیول سیپیونات	دپوفم	آمپول		پیشگیری از بارداری

فهرست محصولات ایران هورمون به ترتیب حروف الفبا

نام ژنریک	نام تجاری	شکل دارویی	دوز	موارد مصرف
مزالازین	مزینوکس - آی اچ	قرص انتریک کوتد قرص پیوسته رهش در سراسر کولون		درمان خط اول برای درمان کولیت اولسراتیو خفیف تا متوسط
متی مازول	تیرومت - آی اچ	قرص		درمان هایپر تیروییدیسم / آمادگی برای تیروییدکتومی در هایپر تیروییدیسم / درمان قبل و بعد از تجویز ید رادیواکتیو
ملوکسیکام	کاملوکس	قرص		داروی ضد التهاب غیر استرویدی / داروی ضد درد غیر مخدر / درمان علامتی آرتروز درمان علامتی آرتريت روماتوئید و اسپوندیلیت آنکیلوزان
مدروکسی پروژسترون استات	مدروفم دیوجسترون	قرص آمپول		درمان آمنوره ی ثانویه / پیشگیری از هایپرپلازی آندومتر / درمان خونریزی های غیر طبیعی رحم پیشگیری از بارداری
ناندرولون دکانات	دکاندرولون	آمپول		درمان پوکی استخوان در یائسگی / دمان سندرم های تحلیل عضله / افزایش توده و قدرت عضلانی در بدن سازی
ناپروکسن سدیم	ناپرون	قرص انتریک کوتد		داروی ضد التهاب غیر استرویدی / داروی ضد درد غیر مخدر استئوآرتریت، آرتريت روماتوئید / تسکین درد خفیف تا متوسط و درمان دیسمنوره اولیه
ویتامین د۳	سان ویت	آمپول		پیشگیری و درمان کمبود ویتامین D / داروی کمکی در درمان پوکی استخوان
ویتامین ب۶ (پیریدوکسین هیدروکلراید)		قرص		درمان بیماری های ناش از کمبود ویتامین ب۶ نوریت ناشی از مصرف ایزونیازید آنمی سیدروبلاستیک اییوپاتیک
ویتامین ب۱۲	بیتاویون	آمپول		درمان کمبود ویتامین ب۱۲ / درمان کم خونی / درمان نورپاتی محیطی
ویتامین اچ (بیوتین)	ویتا اچ	قرص		ویتامین / مکمل غذایی حمایت از سلامت پوست، ناخن و مو
ویتامین ب۱+ب۶+ب۱۲	بنورویت	آمپول		بهبود کیفیت زندگی در بیماران با دردهای نورپاتیک
ویتامین ب کمپلکس Vit. B۱ + Vit. B۲ + Vit. B۶ + Dexpantenol + Nicotinaide		آمپول		پیشگیری و درمان وضعیت های ناشی از کمبود ویتامین های گروه B
والگاسیکلوویر (به صورت هیدروکلراید)	والگاسیت - آی اچ	قرص		پیشگیری و درمان بیماری سایتومگالوویروس در بیماران پیوند کلیه قلب - مغز استخوان و پانکراس
والاسیکلوویر هیدروکلراید	ویراترکس - آی اچ	قرص		درمان عفونت های ویروس واریسلا زوستر - هرپس زوستر درمان عفونت های ویروس هرپس سیمپلکس
وریکونازول	وکوزیکس - آی اچ	قرص		- درمان آسپرژیلوزیس مهاجم - کاندیدمیا (غیر نوتروپنیک) و کاندیدبازیس منتشر در پوست - شکم - کلیه - دیواره ی مثانه و زخم ها کاندیدبازیس مری - عفونت های شدید ناشی از Scedosporium apiospermum و Fusarium species شامل Fusarium solani در بیمارانی که به سایر درمان ها مقاوم هستند یا عدم تحمل دارند.
هیدروکسی پروژسترون کاپروات	هیدروژکس - آی اچ	آمپول		اولین داروی تصویب شده توسط FDA برای پیشگیری از زایمان زودرس
هپارین سدیم		آمپول		ضد انعقاد تزریقی
هیدروکورتیزون	سوکورتیز	قرص		- درمان جایگزینی در نارسایی آدرنال و هیپرپلازی مادر زادی آدرنال در کودکان - تجویز پیش از عمل جراحی و در طی وضعیت های تروماتیک در بیماران با نارسایی آدرنال

آتراکورین (آتراکوریم بزیلات)

آتراکوریم بزیلات ۲۵ و ۵۰	Atracurium besylate 25&50
آتراکورین	Atracurin
آتراکوریم بزیلات ۵۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر آتراکوریم بزیلات ۲۵ میلی گرم در ۲/۵ میلی لیتر	Atracurium besylate 50 mg/ 5ml Atracurium besylate 25 mg/ 2.5ml
محلول قابل تزریق	Injectable Solution

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو فقط در بیمارستان و طبق نظر پزشک تجویز گردد.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

حساسیت به آتراکوریم بزیلات یا سایر اجزا، فرمولاسیون، بارداری، شیردهی، سالمندان، حساسیت به داروهای مسدود کننده عصب-عضله، سوختگی ها، بیماری قلبی، فشار خون پایین، اختلالات مایع و الکترولیت، هایپوترمی، میاستنی گراویس و اختلالات عصب-عضله، بیماران بدون حرکت، اسیدوز و آلکالوز متابولیک، اسیدوز و آلکالوز تنفسی، سندرم ایتون-لامبرت، ضایعات آسیب میلین، نوروپاتی محیطی، فقدان ساختمان عصبی، ترومای عضله و بیماران با سابقه قبلی واکنش های آنافیلاکتیک.

مقدار و موارد مصرف:

این دارو به عنوان کمک کننده به بیهوشی عمومی، تسهیل انتوباسیون داخل تراشه و فراهم کردن شلی عضلانی طی جراحی یا تهویه مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو اثر تسکین درد یا القا، خواب ندارد.

دوزهای یک جا (bolus) جهت انتوباسیون و نگه داشتن اثر انسداد عصبی-عضلانی: - بزرگسالان:

دوز ابتدایی دارو 0.4-0.5 mg/kg به صورت بولوس داخل وریدی می باشد. این دوز ممکن است در بیماران مبتلا به بیماری جدی قلبی-عروقی یا سابقه افزایش ریسک ناشی از ترشح هیستامین مانند واکنش های آنافیلاکتوئید شدید یا آسم به 0.3-0.4 mg/kg کاهش و با سرعت کمتر (طی ۱ تا ۲ دقیقه) تجویز شود. این دوز بعد از سوگسیپنیل کولین برای انتوباسیون (بیهوشی متعادل) 0.3-0.4 mg/kg می باشد.

پیش درمان/ آتازگر: ۱۰ درصد دوز انتوباسیون داده شده برای مثال 0.04-0.05 mg/kg تا ۲ تا ۴ دقیقه قبل از دوز ثانویه اصلی (بیشتر). توجه شود این مورد ممکن است برای بعضی کمک کننده و برای بعضی نامناسب باشد و ریسک آسپیراسیون و دشواری بلع را افزایش دهد. همچنین ممکن است شرایط انتوباسیون بعد از این مورد به خوبی سوگسیپنیل کولین نباشد. دوز نگهدارنده ۲ تا ۴۵ دقیقه بعد از دوز ابتدایی به مقدار 0.08-0.1 mg/kg برای نگهداری اثر انسداد عصبی-عضلانی داده می شود و در صورت نیاز در بازه های زمانی ۱۵ تا ۲۵ دقیقه ای دوز تکرار شود. - اطفال ۲ سال و بزرگتر از ۲ سال: دوز دارو مانند بالغین تعیین شود.

انفوزیون نگهدارنده برای حفظ اثر شل کنندگی طی پروسه های طولانی جراحی: بزرگسالان: هنگام شروع علایم ریکاوری بعد از دوز بولوس ممکن است یک دوز انفوزیون ادامه دار با سرعت 9-10 mcg/kg/min آغاز شود. اثر شل کنندگی معمولاً با سرعت انفوزیون 5-9 mcg/kg/min (در محدوده 2-15 mcg/kg/min) تحت بی حسی بالانس شده نگه داشته می شود.

کمک به بی حسی جراحی:

اطفال ۱ ماه تا ۲ سال: دوز ابتدایی 0.3-0.4 mg/kg می باشد.

ممکن است دوز نگهدارنده در کودکان یا نوزادان در مقایسه با بزرگسالان در فواصل کمتری تجویز شود.

دوز تایید نشده:

از این دارو در بزرگسالان برای فلج ICU (برای مثال تسهیل تهویه مکانیکی) در بیماران انتخابی که به مقدار کافی آرام بخش دریافت کرده اند با دوز ابتدایی 0.4-0.5 mg/kg به صورت بولوس داخل وریدی و دوز نگهدارنده 4-20 mcg/kg/min استفاده می شود.

- شروع اثر این دارو وابسته به دوز بوده و ۲ تا ۳ دقیقه به طول می انجامد، حداکثر اثر این دارو ۳ تا ۵ دقیقه زمان برده و ریکاوری ۲۰ تا ۳۵ دقیقه بعد از دوز ابتدایی 0.4-0.5 mg/kg تحت بیوشی بالانس شده، آغاز می شود. ریکاوری ۹۵٪، ۶۰ تا ۷۰ دقیقه زمان می برد.

در صورت تجویز هم زمان با عوامل بیهوشی عمومی قوی مانند انفلوران، اترا، ایزوفلوران، متوکسی فلوران یا سیکلوپروپان دوز باید ۲۳ تا ۵۵٪ کاهش یابد یا از یک محرک عصب محیطی به عنوان شاخص استفاده شود. هالوتان نسبت به انفلوران یا ایزوفلوران، کمتر باعث تقویت انسداد عصب - عضله می شود. بنابراین کاهش دوز کمتری ممکن است در نظر گرفته شود.

- در اعمال جراحی پای پس قلبی ریوی که هایپوترمی القا می شود، سرعت مورد نیاز انفوزیون ممکن است تقریباً ۵۰٪ کاهش یابد.

موارد منع مصرف و احتیاط:

- به صورت عضلانی تزریق نگردد.

- این دارو بیمارستانی است.

- مصرف این دارو در افرادی که به آتراکوریم بزیلات یا سایر اجزا، فرمولاسیون حساسیت دارند منع مصرف دارد.

- مصرف این دارو در بارداری، شیردهی، سالمندان، سوختگی ها، حساسیت به داروهای مسدود کننده عصب - عضله، بیماری قلبی، فشار خون پایین، اختلالات مایع و الکترولیت، سرطان، هایپوترمی، میاستنی گراویس و اختلالات عصب-عضله، بیماران بدون حرکت، اسیدوز و آلکالوز متابولیک، اسیدوز و آلکالوز تنفسی، سندرم ایتون لامبرت (بیماری خود ایمنی)، ضایعات آسیب میلین، نوروپاتی محیطی، فقدان ساختمان عصبی، ترومای عضله و بیماران با سابقه قبلی واکنش های آنافیلاکتیک با احتیاط مصرف شود.

- ممکن است عارضه کاهش تعداد ضربان قلب (برادی کاردی) با آتراکوریم از سایر شل کننده های عضلانی رایج تر باشد.

- این دارو نباید قبل از القا، بیهوشی تجویز شود.

- برای به حداقل رساندن اثرات مربوط به آرادسازی هیستامین (مانند برونکواسپاسم، هایپوتنشن و...)، تزریق این دارو در بیماران مبتلا به بیماری قلبی-عروقی یا حساس به فشار خون پایین، در مدت زمان بیش از یک دقیقه انجام شود.

- زمانی که این دارو بر اساس وزن بدن تنظیم دوز شود، دوره اثر در بیماران چاق طولانی می شود. برای اجتناب از دوز اضافی در بیماران چاق، دوز باید بر اساس وزن ایده آل محاسبه شود.

- شیرخواران کمتر از یک ماه ممکن است نسبت به اثرات این گروه دارویی بیشتر حساس باشند. در مقایسه، شیرخواران بیشتر از یک ماه نیز از کودکان حساس تر می باشند.

- برای ارزیابی مهار و ریکاوری از یک تحرک کننده عصب محیطی استفاده نمایید. - تداخلات مهم دارویی:

ضد دردهای مخدر، مهار کننده های استیل کولین استراز، آمینوگلیکوزیدها، مهار کننده های کانال کلسیمی، کاپرئومایسین، کلیکوزیدهای قلبی، کلیندامایسین، کلیستیمات، کورتیکواستروئیدها، سیکلوسپورین، بیهوشی استنشاقی، کتورولاک، آنتی بیوتیک های لینکوزامید، لینتیم، دیورتیک های لوپ، نمک های منیزیم و منیزیم وریدی، پلی میکسین B، پروکائین آمید، کینیدین، کینین، اسپیرولکتون، مشتقات تتراسایکلین، ونگوماپسین، داروهای ضد سرع (کاربامازپین و فنی توبین)، ابریوتکان، متوکلوپرامید، پنی سیلین ها، مهارکننده های انتخابی سروتونین، کامپین و تتانیتل.

عوارض دارویی:

گر گرفتگی، اشکال در تنفس، واکنش های آلرژیک (پاسخ آنافیلاکتیک یا آنافیلاکتوئید)، تاکی کاردی، برادی کاردی، هیپوتانسیون، افزایش ترشحات برونش، اریتم، واکنش های پوستی (مانند قرمزی، خارش، کهیر)، برونکواسپاسم، افزایش یا کاهش فشار متوسط شریانی، تشنج، واکنش در ناحیه تزریق، انسداد ناکافی یا طولانی، تنگی نفس، لارینگواسپاسم و حمله قلبی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی و کنترل شده در انسان برای این دارو انجام نشده است. مقادیر کمی از این دارو زمانی که به زنان باردار طی جراحی سزارین داده شده است، از جفت عبور می کند.

وجود دارو در شیر مادر نامشخص است. تجویز این دارو در زنان شیرده باید با احتیاط صورت گیرد.

شرایط نگهداری:

- دارو در یخچال (در دمای بین ۸ - ۲ درجه سانتی گراد)، درون جعبه، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

- پس از خراج دارو از یخچال، دارو را ظرف مدت ۱۴ روز استفاده نمایید حتی اگر مجدد در یخچال قرار دهید.

- این دارو هر سال حدود ۶٪ دچار تخریب می شود.

- محلول های 0.2 mg/ml و 0.5 mg/ml در سدیم کلراید ۰/۹٪، دکستروز ۵٪ در آب یا دکستروز ۵٪ در سدیم کلراید ۰/۹٪ به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق یا یخچال پایدار می باشد.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن مصادی مشتری: ۹-۱۷۰۵۵۱۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PNI 17- 01/ 03

آیرون سوکروز

Iron Sucrose 100 20 mg/ml

آیرون سوکروز ۱۰۰

۲۰ میلی گرم در میلی لیتر

دسته دارویی:

کمپلکس هیدروکسید آهن III با سوکروز - هماتینیک

موارد و مقدار مصرف دارو:

آنمی کمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی که همو دیالیز می شوند:

بزرگسالان: ۱۰۰ میلی گرم در هر جلسه همودیالیز به طور متوالی تجویز می شود تا به مقدار نهایی ۱۰۰۰ میلی گرم برسد. این دارو به صورت محلول رقیق نشده از طریق تزریق وریدی آهسته (طی ۲ تا ۵ دقیقه) و یا از طریق رقیق کردن دارو در حداکثر ۱۰۰ میلی لیتر سدیم کلراید ۰/۹٪ به صورت انفوزیون وریدی طی ۱۵ دقیقه تجویز می شود. (۱)

آنمی کمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی که دیالیز نمی شوند:

بزرگسالان: تجویز به صورت ۲۰۰ میلی گرم (محلول رقیق نشده) از طریق وریدی آهسته در طول ۵-۲ دقیقه صورت می گیرد. دوره درمان به صورت ۵ بار طی ۱۴ روز ادامه می یابد تا به حداکثر دوز ۱۰۰۰ میلی گرم در ۱۴ روز برسد. (۱)

آنمی کمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی که دیالیز صفافی می شوند:

در مجموع ۱۰۰۰ میلی گرم از دارو در ۳ دوز منقسم طی ۲۸ روز تجویز می شود بدین صورت که ابتدا ۳۰۰ میلی گرم در طول ۱/۵ ساعت به صورت انفوزیون وریدی تجویز می شود. سپس ۱۴ روز بعد مجدداً ۳۰۰ میلی گرم از دارو به صورت انفوزیون وریدی تجویز می شود و ۱۴ روز بعد ۴۰۰ میلی گرم طی ۲/۵ ساعت انفوزیون وریدی می شود. دارو می بایست حداکثر در ۲۵۰ میلی لیتر سدیم کلراید ۰/۹٪ رقیق شود. (۱) نکته: دارو فقط به صورت آهسته وریدی و یا انفوزیون وریدی می بایست تجویز شود. (۱)

راهنمایهای عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده لذا از مصرف این دارو در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری کنید.

- مطالعات کافی در مصرف این دارو برای کودکان زیر دو سال انجام نشده است.

موارد منع مصرف:

این دارو در موارد تجمع بیش از حد آهن، حساسیت به دارو و هر یک از مواد جانبی آن و در آنمی غیراز کمبود آهن منع مصرف دارد. (۱)

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در رده B قرار دارد. از آنجائیکه مطالعات جامع و کنترل شده ای در این زمینه صورت نگرفته است لذا تنها در صورت لزوم، تجویز این دارو توسط پزشک انجام می شود. (۱) در مورد ترشح این دارو در شیر انسان اطلاعات کافی در دسترس نیست ولی از آنجائیکه بسیاری داروها وارد شیر انسان می گردند لذا مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت بگیرد. (۱)

احتیاطات:

- با توجه به اینکه دفع آهن از بدن محدود است و تجمع آهن اضافی در بافتها خطرناک می باشد لذا از تجویز آهن در صورت وجود علائم ناشی از تجمع بیش از اندازه آهن در بافتها خودداری شود. تجویز آیرون سوکروز در مقادیر بیش از حد مورد نیاز، موجب تجمع آهن در بافتهای ذخیره ای و هموسیدروسیس می شود. (۱)

- در بیماران کلیوی مزمن به دنبال مصرف این دارو مواردی از کاهش فشار خون گزارش شده است. لذا استفاده از این دارو در این بیماران باید با احتیاط صورت بگیرد. سرعت تجویز دارو و میزان داروی تزریقی می تواند در ایجاد این عارضه نقش داشته باشد. (۱)

- بیماران دریافت کننده این دارو نیاز به آزمایشات دوره ای برای ارزیابی پارامترهای هماتولوژیک و هماتینیک (هموگلوبین، هماتوکریت، فریتین سرم و میزان اشباع ترنسفرین) دارند. (۱)

- از درمان با آهن در بیماران دارای علائم ناشی از تجمع بیش از حد آهن خودداری شود. در صورتی که میزان فریتین سرم برابر و یا بیشتر از میزان ذکر شده در منابع معتبر باشد مصرف دارو می بایست قطع شود. (۱)

- از آنجائیکه میزان اشباع ترنسفرین پس از تزریق وریدی آیرون سوکروز به سرعت بالا می رود لذا میزان قابل اطمینان آهن ۴۸ ساعت پس از تزریق وریدی بدست می آید. (۱)

مسمومیت:

عوارضی که در نتیجه مسمومیت با دارو و یا تزریق بسیار سریع آیرون سوکروز ایجاد می شود شامل موارد زیر است:

افت فشار خون، ادم، درد قفسه سینه، دردهای موضعی، سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، دردهای شکمی و ماهیچه ای، تنگی نفس، سرفه، اکثر علائم از طریق تزریق وریدی مایعات و هیدروکورتیزون و یا آنتی هیستامین ها با موفقیت از بین می رود. انفوزیون دارو بر طبق روش گفته شده و یا با سرعت کمتر می تواند موجب کم کردن علائم شود. (۱)

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر یا پزشک یا داروساز مشورت نمایند.

تهوع، استفراغ، راش، خارش، درد شکم، پیوست، اسهال، کاهش یا افزایش قند خون، گرفتگی و درد عضلات، سرفه، تنگی نفس، احتقان بینی، فارتیزیت، رینیت آلرژیک، سینوزیت، سرگیجه، خستگی، سردرد، کم حسی، درد قفسه سینه، افزایش یا کاهش فشار خون، تعریق، گر گرفتگی، تپش قلب، تکی کاردی، درد در محل تزریق، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، التهاب ملتحمه چشم، تقرس، گوش درد، ادم، نقص در حس پشایی، عفونت صفاقی، مثبت شدن تست خون در مدفوع، تب، عفونت ادراری. (۱) و (۲)

تداخلات:

انتظار می رود این فرآورده مانند سایر فرآورده های تزریقی آهن در صورت مصرف همزمان با فرم خوراکی موجب کاهش جذب آهن خوراکی گردد. (۱)

شرایط نگهداری:

دارو در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شده و از یخ زدگی محافظت شود.

منابع:

- 1- Drug Fact and Comparisons 2016 ;Vol I; page:62-63
- 2- British national formulary 2011

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون ایران-تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸

درولوکسان (اکساندرولون ۲/۵ و ۱۰)

درولوکسان ۲/۵ و ۱۰	اکساندرولون
Deroloxan 2.5 & 10	Oxandrolone
۱۰ میلی گرم: قرص خط دار مناطق	10 mg: Double Scored Tablet
۲/۵ میلی گرم: قرص خط دار	2.5 mg: Scored Tablet

پیش از شروع مصرف درولوکسان ۲/۵ یا ۱۰ میلی گرم و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

درولوکسان چیست و به چه منظور مصرف می شود:

درولوکسان (درو-لوک-سان) حاوی ماده موثره اکساندرولون با میزان ۲/۵ و ۱۰ میلی گرم می باشد که به گروه استروئیدهای آنبولیک، تعلق دارد. درولوکسان موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه به شما دارند استفاده می شود.

آنج که باید پیش از مصرف درولوکسان بدانید:

درولوکسان برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید:

– هرگونه واکنش حساسیتی غیر عادی به استروئیدهای آنبولیک یا آندروژن ها، حساسیت به هر ماده دیگر، سرطان پستان، دیابت ملیتوس، هایپرپاراتیروئید خیم پروستات، هایپرکلسمی، ابتلا یا سابقه ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی یا نارسایی های کلیوی و کبدی، نفروزیس و بارداری.
– به دلیل افزایش ریسک هایپرپاراتیروئید در سرطان پروستات در سالمندان با احتیاط مصرف شود.

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

– به طور منظم و دوره ای به پزشک خود مراجعه نمایید.
– برای دستیابی به حداکثر اثر درمانی هنگام مصرف این دارو، برقرار رژیم غذایی حاوی پروتئین و کالری کافی اهمیت دارد.
– در صورت بروز ویریلیسم متوسد در خانم ها (آکنه یا پوست چرب، کلفت شدن صدا، رویش و یا ریزش غیر عادی مو، بزرگ شدن کلیتوریس) به پزشک خود اطلاع دهید و به منظور پیشگیری از ویریلیسم غیر قابل بازگشت قطع مصرف دارو ضروری می باشد.
– در اطفال و نوجوانان (بیماران پیش از سن بلوغ) گرفتن X-ray هر ۶ ماه یک بار برای بررسی رشد استخوان ها و قد، ضروری می باشد.
– استروئید های آنبولیک ممکن است باعث کاهش غلظت قند خون شوند؛ انسولین و یا داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون نیاز به تنظیم دوز توسط پزشک دارند.
– به طور منظم تست های عملکرد کبدی، اندازه گیری لیپیدهای سرمی، HDL کلسترول، سطح آهن سرم و ظرفیت اتصال آهن، هموگلوبین و هماتوکریت (در صورت مصرف دوزهای بالا)، سطوح کلسیم سرمی و ادراری (برای زنان مبتلا به سرطان پستان یا جراحی برداشتن پستان) را به صورت دوره ای انجام دهید.
– چنانچه مبتلا به بیماری قلبی، کلیوی یا کبدی هستید، ادم می تواند نشان دهنده یک اختلال مهم باشد.
– در حالی که این دارو را هم زمان با وارفارین مصرف می کنید، نظارت دقیق توصیه می شود. نیاز است تنظیم دوز وارفارین تا ثابت شدن PT، INR صورت گیرد.
– اگر قرار است آزمایش تیروئید یا بد انجام دهید، به پزشک خود اطلاع دهید که این دارو را مصرف می کنید.

درولوکسان را چگونه مصرف کنید:

مقدار مصرف دارو شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

– بزرگسالان: ۲/۵ تا ۱۰ میلی گرم در روز، ۴ تا ۱۰ نوبت تقسیم شود.
– اطفال: مجموع دوز روزانه ۰/۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا کمتر می باشد.

چطور مصرف کنید:

هر دوز را بدون در نظر گرفتن زمان وعده غذایی مصرف کنید، اما در صورت ایجاد مشکلات گوارشی دارو را همراه با غذا میل نمایید.

برای چه مدت مصرف کنید:

مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.
دوره درمان با درولوکسان (اکساندرولون) به پاسخ فرد به درمان و احتمال بروز عوارض جانبی وابسته خواهد بود.

بزرگسالان: معمولاً دوره درمان ۲ تا ۴ هفته کافی می باشد. این دوره ممکن است به طور متناوب تکرار شود.
اطفال: دوز تجویز شده ممکن است به طور متناوب تکرار شود.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

به محض یادآوری، دوز فراموش شده را مصرف نمایید. اما چنانچه تا زمان مصرف دوز بعدی به خاطر نیاوردید، از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کنید و مصرف دارو را مطابق قبل ادامه دهید.

اگر دارو را بیش از حد تعیین شده مصرف کردید:

درمان Over dose (مصرف بیش از دوز تعیین شده):
درمان به صورت علامتی و حمایتی می باشد.
برای کاهش جذب در صورت مصرف بیش از حد دارو، درمان شامل القای تهوع و استفراغ و یا شستشوی معده می باشد.
در این شرایط عملکرد کبدی نیاز به بررسی دارد.
بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنید.
آیا می دانید ۱۹ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیردهی:

بارداری:
این دارو در بارداری، در رده X قرار دارد. مصرف آن طی بارداری ممنوع می باشد.
شیردهی:

ترشح این دارو در شیر انسان مشخص نیست. به علت توانایی ایجاد عوارض جانبی در نوزادان شیرخوار، با در نظر گرفتن اهمیت مصرف دارو در مادر، پزشک تصمیم می گیرد که مصرف اکساندرولون یا شیردهی قطع شود.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

– در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه نسخه مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. به ویژه اگر هریک از داروهای زیر را مصرف می کنید:
داروهای کاهش دهنده قند خون (سولفونیل اوره یا انسولین)، مهارکننده های C1، کورتیکواستروئیدها (سیستمیک)، سیکلوسپورین (سیستمیک)، ضد انعقادها، استامینوفن، آمپودارون، آندروژن ها، آنتی بیوتیک های خوراکی یا تزریقی، داروهای ضد تیروئید، گاربامازین، کارموسین، کلروکین، دانترون، دانوربیسین، دی سولفیرام، دیوالپروکس، استروژن ها، اترتینات، املاح طلا، هیدروکسی کلروکین، مرکاپتوپورین، متوترکسات، متیل دوبا، ناتروکسان، ضد بارداری های خوراکی، فنوتیازین ها، فنی تونین، پالیگاماسین، والپروئیک اسید، درد و ضد التهاب های غیر استروئیدی یا سالیسیلات ها، کورتیکوئیدها، استروئیدهای آدرنال یا ACTH، دارو ها یا غذا های حاوی سدیم، داروهای ایجاد کننده سمیت کبدی، سوماترین یا سوماتریتپتان.

عوارض جانبی احتمالی مصرف درولوکسان چه می باشد:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر عارضه ای به ویژه عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض شایع:

آکنه یا پوست چرب، رشد یا ریزش موی غیر طبیعی، گرفتگی و یا کلفت شدن صدا، قاعدگی نامنظم، بزرگی کلیتوریس (زنان)، بزرگی آلت تناسلی متسبب به مردان، افزایش تعداد دفعات تعویض، بزرگی پستان در آقایان، درد پستان، نیاز اورژانسی متناوب به ادرار کردن، عدم تحمل گلوکز.

عوارض غیر شایع:

آتمی فقر آهن، درد زبان، ادم (تورم پاها، افزایش سریع وزن)، مشکلات گوارشی (تهوع و استفراغ)، اختلال عملکرد کبدی (زرد شدن چشم ها و پوست)، درد استخوانی، خونریزی غیر طبیعی، هایپرکلسمی (با علامت افسردگی، خستگی غیر معمول)، تیرگی پوست، سختی ادرار یا تکرر ادرار، لرز، اسهال، احساس پر بودن معده و شکم، کرامپ های عضلانی، اختلال در خواب، تغییرات میل جنسی، کاهش توانایی جنسی، هایپرپاراتیروستات

عوارض نادر:

مدفوع با رنگ خیلی تیره یا روشن، احساس ناراحتی مداوم، سردرد مداوم، بوی تنفس نامطبوع مداوم، استفراغ خونی، درد شکم یا معده، کاهش وزن بدون دلیل، بی اشتها، مداوم ادرار تیره رنگ، کپیر، لکه های رنگی بنفش یا قرمز روی بدن یا داخل دهان یا بینی، گلودرد یا تب.

سایر عوارض:

بسته شدن اپی فیز (با علامت کندی رشد طبیعی در کودکان)، کاهش تحمل به گلوکز، احتباس بروموسولفونتانین، افزایش بیلی روبوبین سرم، عدم تعادل الکترولیت ها، مهار ترشح گنادوتروپین، سمیت کبدی، اختلال عملکرد کبد، نکروز یا کارسینومای کبدی، هپاتیت کلاستیک و زردی

آیا می دانید در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقا، گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است).

درولوکسان چگونه نگهداری می شود:

– دارو را دور از دید و دسترسی کودکان نگهداری کنید.
– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
– از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز از قرار دادن آن در خودرو خودداری کنید.
– از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری کنید.

توصیف محصول:

شکل ظاهری درولوکسان و نحوه عرضه آن چگونه است:
قرص درولوکسان ۱۰ میلی گرم: به صورت سفید، گرد و خط دار متقاطع می باشد که در چپه های ۵۰ عددی (حاوی ۵ بلیستر ۱۰ عددی) همراه برگه راهنما عرضه می گردد.
قرص ۲/۵ میلی گرم: قرص درولوکسان ۲/۵ میلی گرم به صورت سفید، گرد، می باشد که در چپه های ۱۰۰ عددی (حاوی ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی) همراه برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

درولوکسان، محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.
کیلوستر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران.
تلفن صدای مشتری: ۰۲۱-۹۸۲۱۴۴۹۰+۰۲۱-۳۵۸ (داخلی)

تاریخ بازنگری:

۹۹/۰۶/۱۹



اپی نالین (اپی نفرین)

اپی نفرین

Epinephrine

Epinaline 1mg/1ml

اپی نالین ۱ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

Injectable Solution

محلول قابل تزریق

پیش از شروع مصرف اپی نالین و هربار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک یا داروساز در مورد بیماری یا درمان آن نمی باشد.

اپی نالین چیست و به چه منظور استفاده می شود:

آمپول اپی نالین (اپی-نالین) حاوی ماده موثره اپی نفرین هیدروژن تارتارات به میزان ۱ میلی گرم می باشد که به گروه دارویی سمپاتومیمتیک ها تعلق دارد و برای درمان اضطرابی واکنش های آلرژیک نوع یک و همچنین افت فشار ناشی از شوک سپتیک استفاده می شود.

آن چه که باید پیش از مصرف اپی نالین بدانید:

اپی نالین برای بیماری فحلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.

این دارو در صورت وجود مشکلات زمینه ای زیر می بایست با احتیاط مصرف شود:

- در افراد با مشکل قلبی-عروقی (این دارو ممکن است به خصوص در بیماران با مشکل قلبی و یا افرادی که داروهای حساس کننده عهله قلب مصرف می کنند ایجاد آریتمی قلبی نماید). در افراد با بیماری عروق مغزی، ادم ریوی، هایپوولمی (کاهش حجم خون)، دیابت مایتوس، بیماری پارکینسون، در صورت مشکل کلیوی، در صورت مشکل مربوط به تیروئید، سالمندان، در صورت تشنج، فشار خون بالا، مشکلات روانی، جریان خون پایین به مغز و قلب.

مواردی که نباید اپی نالین را مصرف نمایید:

از مصرف داخل چشمی این دارو خودداری نمایید.

در طول مصرف اپی نالین باید بدانید:

- در صورت تزریق وریدی سریع ممکن است منجر به مرگ متعاقب خونریزی داخل جمجمه و یا آریتمی قلبی شود. - احتمال Extravasation و نگرش بافتی متعاقب انشوریزون وریدی وجود دارد. (آنتی دوت ایسکمی اکستراواژیشن: فتولامین می باشد.)

- تزریق اپی نفرین در افراد دیابتی ممکن است باعث افزایش قند خون شود که بررسی و در صورت نیاز افزایش دوز انسولین و یا داروهای کاهش قند خون ضروری می باشد.

اپی نالین را چگونه مصرف نمایید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند، تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

آنافیلاکسی:

بزرگسالان و اطفال با وزن ۳۰ کیلوگرم و یا بیشتر:

دوز معمول (0.3-0.5mg) 0.3-0.5ml به صورت رقیق شده از طریق تزریق عضلانی به قسمت قدامی ران، که هر ۵ الی ۱۰ دقیقه در صورت نیاز تکرار می شود. (ماکزیمم: 0.5mg در هر دوز)

در اطفال با وزن کمتر از ۳۰ کیلوگرم:

دوز معمول 0.01ml/kg به صورت رقیق شده از طریق تزریق عضلانی و یا زیرجلدی به قسمت قدامی ران، که هر ۵ الی ۱۰ دقیقه در صورت نیاز تکرار می شود. (ماکزیمم 0.3 mg در هر دوز)

هایپوتانسیون ناشی از شوک سپتیک:

دوز ابتدایی: قبل از انفوزیون، اپی نالین را در محلول دکستروز رقیق نمایید. سپس با غلظت 0.5 – 2 mcg/kg/min تا رسیدن به متوسط فشار شریانی مناسب به صورت داخل وریدی انفوزیون نمایید. (هر ۱۰ الی ۵ دقیقه با دوز 0.05-0.2 mcg/kg/min به صورت داخل وریدی تا رسیدن به فشار خون هدف تیتیر نمایید.)

قطع درمان: پس از پایداری هودینامیک، ممکن است دوز را به تدریج هر ۳۰ دقیقه در طی ۱۲ الی ۲۴ ساعت کاهش دهید.

چطور مصرف کنید:

- محلول 1 mg/ml اپی نفرین می بایست قبل از تزریق وریدی رقیق شود.

-برای رقیق سازی اپی نالین در تزریق وریدی توصیه می شود از محلول دکستروز (برای جلوگیری از اکسید شدن و از بین رفتن قدرت اثر دارو) استفاده شود.

- اصطلاح 1:۱۰۰۰ برابر است با غلظت 1 mg/ml و اصطلاح ۱:۱۰۰۰۰ برابر است با 0.1 mg/ml.

- تجویز داخل عضلانی در قسمت قدامی یک سوم میانی ران در زمان آنافیلاکسی ارجح می باشد و بهتر است از تزریق به عضله باسن، انگشت دست یا پا پرهیز شود.

مصرف در دوران بارداری:

این دارو در بارداری در رده C قرار دارد. مطالعات نشان داده است که مصرف اپی نفرین در زنان باردار باعث ایجاد نقص در جنین می گردد. اگرچه مصرف این دارو در صورت نیاز در طی واکنش های آلرژیک که برای مادر مخاطره آمیز است ممکن است استفاده شود.

مصرف در دوران شیردهی:

اپی نفرین در شیر مادر ترشح می شود و ممکن است باعث اثرات جانبی ناخواسته در کودک شیرخوار گردد. بنابراین می بایست با احتیاط مصرف شود.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

اگر داروی دیگری با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید به خصوص:

داروهای آنتیاسیتی، مکمل های غذایی و یا رژیمی، داروهای مربوط به سرماخوردگی و مشکلات سینوسی، داروی کاهنده تب یا داروهای که برای آلرژی استفاده می شود، داروهای مربوط به آسم و یا سایر مشکلات تنفسی، داروهای مهارکننده گیرنده های بتا به فرم های خوراکی، تزریقی، قطره های چشمی، داروهای دیورتال (مثل لانوکسین)، کینیدین ها، مهار کننده های MAO، هورمون های تیروئیدی، ضد اسیدگی های سه حلقه ای، داروهای مسدود کننده ۵1 ، داروهای ضد دیابت، آتوموکستین، بنزیل پنی سیلین پلی ایزین، بتابلاکرها، پلوناتسیرین، کانابینوئیدها، مهار کننده های COMT، دوسوفیلیان، مشتقات ارگوت، هیالورونیداز، بی حس کننده های استنشاقی، لیزنولید، لورازیدون، پرومتازین، مهارکننده های بازجذب سروتونین و اپی نفرین، اسپیرونولاکتون، سمپاتومیمتیک ها، تندیروئید.

عوارض جانبی احتمالی مصرف اپی نالین چه می باشد:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارضی که باید سریعاً با پزشک مطرح گردد:

عوارض نادر:

- ایجاد واکنش حساسیتی، برجستگی های ملتهب بر روی پوست و یا پلک ها و یا صورت، ناحیه تناسلی، دست ها یا پاها، لب ها، گلو، زبان / مشکل ناگهانی در تنفس یا بلع / احساس تنگی مجرای گلو.

عوارضی که نیاز به توجهات پزشکی دارند:

- شایع: ضربان قلب سریع و یا نامنظم

- نادر: درد قفسه سینه، تشنج، غش کردن، برآمدگی های پوستی، افزایش فشار خون، مشکلات روانی، گرفتگی یا درد عضلانی، تهوع و استفراغ، مشکل در دفع ادرار، خستگی یا ضعف غیر عادی.

عوارض گذرا که نیاز به توجهات پزشکی ندارند:

- شایع: هیجان، سردرد، عصبی شدن، لرزش

- نادر: گیجی و منگی، سرگیجه، تهریق، مشکل در به خواب رفتن.

اپی نالین بطور نگهداری می شود:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

- دارو را درون جعبه، دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را تا زمان مصرف در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده روی بسته بندی خودداری نمایید.

اپی نالین چگونه عرضه می گردد:

توسیف محصول: اپی نالین محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد که به صورت آمپول های قهوه ای رنگ یک میلی لیتری، در بسته های ۱۰ عددی به همراه یک برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

اپی نالین محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.

کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران

تلفن ممدی مشتری: ۰۹-۹۸۲۱۴۴۹۵۵۱۷ + (داخلی ۳۵۸)



BRC P- PK22- 01/ 04

اگزیمکس (اگز مستان)

Eximex 25

Exemestane

F.C. Tablet

اگزیمکس ۲۵

اگز مستان

قرص روکش دار

داروهای گیاهی شامل علف چای (St. John 's Wort)

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:
۲۵ میلی گرم در روز همراه یا بلافاصله بعد از غذا.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید. مشکلات تنفسی، احساس سنگینی بر روی قفسه سینه، گلودرد، سرفه، گرفتگی صدا، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، برونشیت، سینوزیت، سردرد، سرگیجه، درد مفصلی، کمردرد، شکم درد، علایم شبه آنفلوآنزا، تب، لرز، افزایش تعریق، لنفوسایتوپنی، ادم دست و پا و زانو، افزایش یا کاهش اشتها، اسهال، یبوست، تهوع، استفراغ، سوءهاضمه، آبریزش بینی، خارش، مور مور شدن، راش پوستی، ریزش مو، اضطراب، افسردگی، ضعف و خستگی، بی خوابی، گر گرفتگی، احتمال شکستگی استخوان، عفونت مجاری ادرار، احساس درد و یا سوزش هنگام دفع ادرار.

در صورت مصرف بیش از حد و یا اتفاقی دارو و بروز مسمومیت سریعاً به مرکز درمانی مراجعه نمایید. علانم مسمومیت دارو عبارتند از: لرز شدید، سرفه، درد چشم، تب، احساس عمومی بیمار بودن، سردرد، گلودرد و احساس خستگی غیر معمول.
درمان مسمومیت با دارو به صورت علامتی و حمایتی است و آنتی دوت خاصی ندارد.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن مدای مشتری: ۰۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SG66- 01/ 06

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

– دارو را به اندازه تجویز شده و در زمان درست مصرف کنید و از مصرف دارو بیشتر از مقدار تجویز شده جدا خودداری نمایید.

– دارو را همراه یا بلافاصله بعد از غذا میل نمایید.

– در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی دارو نزدیک شده باشد آن را مصرف نکنید و از دو برابر کردن دوز دارو در نوبت بعدی خودداری نمایید.

– مراجعه منظم به پزشک معالج جهت بررسی پیشرفت درمان دارویی ضروری است.

– پزشک معالج را از سایر داروهای مصرفی خود مطلع سازید.

موارد منع مصرف:

– در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو و یا سایر مواد جانبی با پزشک خود مشورت کنید.

– این دارو نباید در زمانی که یانسه نشده اند مصرف شود.

– این دارو نباید همزمان با داروهای استروئیدی به دلیل تداخلات فارماکولوژیکی مصرف شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در زنان یانسه تجویز می شود، بنابراین هیچ گونه مصرفی برای زنان باردار و یا شیرده ندارد. در صورت مصرف اشتباه دارو در دوران بارداری و یا شیردهی، بدلیل عوارض احتمالی بر روی جنین یا نوزاد، حتماً با پزشک مشورت نمایید.

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است.

احتیاطات:

– در صورت ابتلا به نارسایی خفیف تا شدید کلیوی و یا کبدی پزشک معالج را مطلع سازید.

– احتمال افزایش تعداد لنفوسیت ها و بروز لنفوسایتوپنی و احتمال افزایش میزان شاخص های عملکردی کبد در نتایج تست های آزمایشگاهی وجود دارد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

کاربامازپین، فنوباریتال، فنی تونین، ریقامپین، داروهای استروئیدی و یا

لوپارین (انوکسپارین سدیم)

انوکسپارین سدیم لوپارین

Enoxaparin Sodium Loparin

(4000 IU / 0.4 ml)
(6000 IU / 0.6 ml)
Pre-Filled Syringe

(۴۰۰۰ IU / ۰/۴ ml)
(۶۰۰۰ IU / ۰/۶ ml)
سرنگ آماده تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- وجود هر نوع سابقه حساسیت به این دارو یا سایر داروها، مواد جانبی داروها، رنگها و غذاها
- سابقه بیماری خونی و یا اختلالات خونریزی دهنده، مشکلات عروقی، عفونت های دریچه ای قلب، پرفشاری خون، بیماری های کلیوی، بیماری های کبدی، شوک سپتیک (عفونت خونی)، زخم معده فعال
- اعمال دندانپزشکی اخیر، ضربه شدید به سر یا بدن و یا سقط جنین
- بعد از مصرف دارو هر گونه علایم خون مردگی و خونریزی، مخصوصاً خونریزی هایی که به سختی بند بیایند (خونریزی های داخلی در برخی موارد دارای علایمی نظیر مدفوع خونی یا سیاه رنگ و یا احساس سستی و خستگی غیر معمول هستند که باید به آنها توجه نمود)
- علایمی نظیر کمردرد، احساس سوزش و خارش و قلقلک، ضعف یا، بی حسی، فلج، مشکلات روده ای یا مثانه ای ایجاد شده

موارد مصرف:

- پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) در جراحی شکم، جراحی تعویض لگن و زانو و بیماران بدحال دچار کم تحرکی شدید.
- درمان ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) حاد در بیماران بستری همراه یا بدون آمبولی ریوی.
- درمان ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) حاد در بیماران غیر بستری.
- پیشگیری از عوارض ایسکمیک در آتروین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد غیر وابسته به موج Q (Non-Q-Wave MI)
- درمان انفارکتوس میوکارد حاد با بلندی بخش ST (STEMI) [ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI)] که به صورت دارویی یا متعاقب (Percutaneous Coronary Intervention) PCI درمان می شوند.
- پیشگیری از تشکیل لخته در جریان خون خارج بدنی در حین همدیالیز.

موارد منع مصرف:

- حساسیت شناخته شده بیمار به انوکسپارین و یا هپارین.
- در صورت وجود خونریزی های بزرگ و فعال در بیمار.
- تست ترومبوسیتوپنی مثبت برای آنتی بادی ضد پلاکتی در حضور انوکسپارین.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری در رده B قرار دارد و در صورت ضرورت مصرف دارو، با ارزیابی فواید مصرف دارو بر مضرات احتمالی آن توسط پزشک تجویز می شود.

اطلاعات کافی در مورد بی ضرر بودن مصرف دارو در دوران شیردهی وجود ندارد، بنابراین مصرف آن توصیه نمی شود، در صورت ضرورت مصرف دارو، با ارزیابی فواید مصرف دارو بر مضرات احتمالی آن توسط پزشک تجویز می شود.

احتیاطات:

هشدار: احتمال بروز هماتوم اپیدورال یا نخاعی در بیماران که هم زمان با دارو تحت عمل بی حسی نوراکسیال و یا پانچ نخاعی قرار می گیرند وجود دارد که می تواند باعث فلج طولانی مدت و یا دائمی شود. جهت پیشگیری توصیه می شود از کاتترهای اپیدورال با گذاری شونده استفاده شود و همچنین از مصرف هم زمان داروهای مهار کننده پلاکتی، ضد التهاب های غیر استروئیدی (NSAIDs) و سایر داروهای ضد انعقاد اجتناب شود.

- توصیه می شود کلیه بیماران قبل از مصرف این دارو، از نظر وجود بیماری های خونریزی دهنده بررسی شوند.
- در بیماران با نارسایی کلیوی و یا بیماران با وزن پایین (زنان کمتر از ۴۵ کیلوگرم و مردان کمتر از ۵۷ کیلوگرم)، مقدار دارو باید تعدیل شود و بیمار به طور دائم از لحاظ بروز خونریزی پایش شود.

- در بیماران با سابقه ترومبوسیتوپنی باید احتیاط نمود.

- سلامت مصرف این دارو در کودکان مطالعه نشده است.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:
داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین، کلوپیدوگرل، دی پیریدامول، دالتپارین، هپارین، مهارکننده های پلاکتی مانند آسپیرین، سالیسیلات ها، داروهای NSAID مانند ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، ایندومتاسین، تولمتین، کتورولاک، متفنامیک اسید، ملوکسیکام.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

- پیشگیری از (DVT) در جراحی های شکم:

۴۰ میلی گرم یک بار در روز، تزریق زیرجلدی به مدت ۷ تا ۱۰ روز.

- پیشگیری از (DVT) در جراحی تعویض زانو:

۳۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت، تزریق زیرجلدی به مدت ۷ تا ۱۰ روز.

- پیشگیری از (DVT) در جراحی تعویض لگن:

۳۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت یا ۴۰ میلی گرم یک بار در روز، تزریق زیرجلدی به مدت ۷ تا ۱۰ روز، در جراحی های تعویض لگن ممکن است ۴۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۳ هفته به صورت تزریق زیرجلدی ادامه پیدا کند.

- پیشگیری از (DVT) در بیماران بدحال دچار کم تحرکی شدید:

۴۰ میلی گرم یک بار در روز، تزریق زیرجلدی به مدت ۶ تا ۱۱ روز.

- درمان (DVT) حاد همراه یا بدون آمبولی ریوی در بیماران بستری:

۱ mg / kg ساعت تزریق زیرجلدی، یا ۱/۵ mg / kg یک بار در روز تزریق زیرجلدی به مدت ۷ روز.

- درمان (DVT) حاد بدون آمبولی ریوی در بیماران غیر بستری:

۱ mg / kg هر ۱۲ ساعت، تزریق زیرجلدی به مدت ۷ روز.

- آتروین ناپایدار و انفارکتومی میوکارد غیر وابسته به موج Q:

۱ mg / kg هر ۱۲ ساعت، تزریق زیرجلدی همراه با آسپیرین به مدت ۲ تا ۸ روز.

- درمان STEMI حاد در بیماران زیر ۷۵ سال:

۳۰ میلی گرم تک دوز تزریق IV bolus به اضافه ۱ mg / kg تزریق زیرجلدی و به دنبال آن ۱ mg / kg هر ۱۲ ساعت، تزریق زیرجلدی (همراه با آسپیرین).

- برای پیشگیری از تشکیل لخته در جریان خون خارج بدنی در حین همدیالیز یک دوز معادل ۱ mg / kg (۱۰۰ IU / kg):
در ابتدای جلسه همدیالیز به کاتتر سرخرگی تزریق می شود که معمولاً برای یک جلسه همدیالیز ۴ ساعته کافی است، در صورت نیاز به تزریق مجدد، یک دوز دیگر ۱ mg / kg (۱۰۰ IU / kg) ۰/۵-۱ ممکن است استفاده شود. در بیماران با ریسک خونریزی بالا دوز بایستی به ۰/۵ mg / kg (۵۰ IU / kg) برای دسترسی عروق دو تایی یا ۰/۷۵ mg / kg (۷۵ IU / kg) برای دسترسی عروق تک گاهش بایسد.

جهت تزریق زیرجلدی باید بیمار در وضعیت درازکش قرار گرفته و دارو به صورت زیرجلدی عمیق تزریق شود. جهت منعایت از هدر رفتن دارو، حباب هوای سر سرنگ را پیش از تزریق خارج نسازید.

محلول دارویی باید کاملاً شفاف و بی رنگ و یا به رنگ زرد کم رنگ باشد.

این دارو نباید به صورت عضلانی تزریق شود.

از مالش دادن محل تزریق اجتناب نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

افزایش ریسک خونریزی، ترومبوسیتوپنی، تب، تهوع، کم خونی، ادم، افزایش سطح AST و ALT کبدی، عوارض موضعی در محل تزریق مانند تحریک، درد، خون مردگی و قرمزی، فیبریلاسیون دهلیزی، نارسایی قلبی، ادم ریوی، پنومونی، واکنش های حساسیتی، خارش، گهیر، راش پوستی، نکروز پوستی، مدفوع خونی یا سیاه و قییر، خونریزی بینی، سرفه خونی، مشاهده خون در ادرار، سردرد، التهاب، درد متوسط تا شدید در بازوها، پاها و یا دست ها، کوتاه شدن تنفس، ضعف و خستگی غیر معمول، سوزش و خارش و احساس قلقلک، بی حسی، بی نظمی ضربان قلب، مشکلات روده ای یا مثانه ای، افزایش حجم خونریزی قاعدگی، سرگیجه.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



BR/ P- P030-02/ 01

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران
تلفن سمدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۱۴۴۹ داخلی ۳۵۸

اسلاکتون ۲۵ و ۱۰۰ (اسپیرونولاکتون)

Slactone 100 & 25
Spironolactone
F. C. Tablet

اسلاکتون ۲۵ و ۱۰۰
اسپیرونولاکتون
قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- وجود هر نوع حساسیت به اسپیرونولاکتون و مواد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت داشتن سابقه ابتلا به دیابت ملیتوس، ناراحتی کبدی و کلیوی، مشکلات قاعدگی، تفرس، هایپرکالمی و اشکال در دفع ادرار.
- در صورت مصرف داروهای زیر:
- دیگوکسین، لیتیم، سیکلوسپورین، داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین و دیگر داروهای دیورتیک، باربیتورات ها، نازکوتیک ها، کورتیکواستروئیدها، NSAIDs، سالیسیلات ها، میتوتان، نوراپی نفرین، مسدودکننده های عصبی-عضلانی و غیر دیپولاریزان.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:
- این دارو برای بیماران مبتلا به آنوری (بی ادراری)، نارسایی حاد یا پیشرونده کلیوی و هایپرکالمی منع مصرف دارد.
- بدون تجویز پزشک معالج از مصرف داروهای دیگر خودداری نمایید.
- در طی مصرف طولانی مدت این دارو، باید تعادل الکترولیت ها و مایعات بدن تحت کنترل باشند.
- رعایت رژیم غذایی دارای اهمیت است. محدودیت مصرف سدیم و پتاسیم یا کاهش وزن ممکن است ضروری باشد.
- اگر در حین مصرف دچار تب، تهوع، اسهال و یا سرگیجه شدید فوراً به پزشک اطلاع دهید.
- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی و یا آزمایش پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.
- اگر دارو را یک بار در روز، به صورت دوز واحد مصرف می کنید برای اجتناب از افزایش دفعات دفع ادرار در طول شب، آن را صبح ها بعد از صبحانه مصرف نمایید و اگر دارو را بیش از یک بار در روز مصرف می نمایید آخرین دوز مصرف را با نظر پزشک معالج قبل از ساعت ۶ بعدازظهر تنظیم نمایید.
- دارو را با غذا یا شیر میل نمایید.

مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان:

- به عنوان مدر در خیز ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیروزکبدی یا سندرم نفروتیک
- دوز اولیه: ۲۵-۲۰۰ میلی گرم در روز در ۲-۴ دوز منقسم به مدت حداقل پنج روز مصرف می شود.
- در درمان افزایش فشار خون
- دوز اولیه: ۱۰۰-۵۰ میلی گرم در روز به صورت تک دوز و یا در ۲-۴ دوز منقسم به مدت حداقل دو هفته مصرف می شود. سپس هر دو هفته یک بار مقدار دارو بر حسب نیاز تنظیم می شود تا به ۲۰۰ میلی گرم در روز برسد.

در درمان افزایش آلدوسترون اولیه

- ۴۰۰-۱۰۰ میلی گرم در روز در ۲-۴ دوز منقسم، قبل از جراحی مصرف می شود. اگر جراحی به علت وضعیت نامناسب بیمار امکان نداشته باشد، مقادیر کمتر به مدت طولانی تجویز می شود.
- در درمان کاهش پتاسیم خون
- ۱۰۰-۲۵ میلی گرم در روز به صورت دوز واحد یا در ۲-۴ دوز منقسم مصرف می شود.

- در درمان نارسایی قلبی [NYHA class IIITo IV]

دوز اولیه ۲۵ میلی گرم یک بار در روز می باشد اگر پتاسیم سرم بیمار مساوی یا کمتر از ۵ mEq/L و کراتینین سرم مساوی یا کمتر از ۲/۵ mg/dl باشد. تنظیم دوز بسته به تحمل بیمار انجام می گیرد.

کودکان: در درمان ادم، آسیت یا افزایش فشار خون برای دوز اولیه، ۱-۳ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز به صورت دوز واحد یا در ۲-۴ دوز منقسم تجویز می شود. پس از پنج روز، مقدار مصرف دوباره تنظیم می گردد. مقدار مصرف را می توان تا سه برابر دوز اولیه افزایش داد.

در صورت فراموش کردن یک نوبت از دارو به محض به یادآوردن آن را مصرف نمایید ولی اگر تقریباً زمان مصرف قرص بعدی فرارسیده است آن را مصرف نکرده و بقیه را طبق روال مصرف نمایید و دوز دارو را دو برابر نکنید.

مصرف در دوران بارداری:

عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است. با این وجود فواید دارو در برابر مضرات آن باید سنجیده شود. مصرف مدرها در دوران بارداری توصیه نمی شود زیرا از جفت عبور می کند و مادر و جنین را در معرض خطر احتمالی قرار می دهد. مدرها از بروز توکسمی آبستنی پیشگیری نمی کنند و مدرکی دال بر اثر مفید آنها در درمان توکسمی آبستنی وجود ندارد. داروهای مدر در دوران بارداری تنها برای درمان خیز ناشی از عوامل پاتولوژیک یا درمان کوتاه مدت افزایش شدید حجم خون با نظر پزشک مصرف می شوند. به طور کلی مدرها در دوران بارداری توصیه نمی شوند مگر اینکه پزشک معالج تجویز نماید.

مصرف در دوران شیردهی:

عوارضی در مورد آن در انسان تایید نشده است، با این وجود باید فواید دارو در برابر مضرات آن سنجیده شود زیرا کانژون (متابولیت فعال اسپیرونولاکتون) در شیر ترشح می شود که ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی برای شیرخوار گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود:

سردرد، ضعف غیر عادی یا خستگی، خارش، بثورات پوستی، تب و لرز، بی نظمی قاعدگی، آمنوره، خونریزی پس از یائسگی، افزایش رشد مو، خشونت صدا (در خانم ها)، از دست دادن مهارت در انجام کارها (اثر بر روی سیستم عصبی مرکزی)، کاهش فعالیت جنسی، حساس شدن پستان ها (در خانم ها) و بزرگ شدن پستان ها در آقایان، تهوع، استفراغ، گاستریت، خونریزی معده، اسهال، کهیر، واکنش های آنافیلاکتیک، آگرانولوسیتوز، هایپرکالمی و اختلالات کلیوی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۱۷۰۵۵۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/P-SB02-01/02

ماکساندولین ۵۰ (اکسی متولون)

ماکساندولین

اکسی متولون
قرص خط دار

Maxandolin

Oxymetholone
Scored Tablet

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- سرطان پروستات یا پستان در آقایان.
- سرطان پستان در خانم ها با کلسیم خون بالا.
- دیابت ملیتوس
- بیماری های قلبی- عروقی
- نارسایی شدید کبدی
- در صورت بارداری و شیردهی
- وجود هر نوع حساسیت به اکسی متولون.
- در صورت مصرف داروهای آنتی کواگولانت و داروهای پایین آورنده قند خون.

در هنگام مصرف این دارو رعایت موارد زیر توصیه می شود:

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف کرده و از مصرف مقادیر بیشتر دارو جداً خودداری نمایید.
- به منظور عدم ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع دارویی با پزشک خود مشورت نمایید.
- برای دستیابی به حداکثر اثر درمانی هنگام مصرف این دارو، استفاده از رژیم غذایی محتوی پروتئین و کالری کافی اهمیت دارد.
- از آنجاییکه پیدایش کیست های متعدد پر از خون در کبد (Peliosis hepatis) و ایجاد تومورهای کبدی خوش خیم وابسته به آندروژن از عوارض استروئیدهای آنابولیک می باشد و اغلب این عوارض تا زمان وخیم شدن بیماری تشخیص داده نمی شوند و هم چنین قطع دارو می تواند سبب بهبود بیماری گردد لذا پایش دوره ای و کامل عملکرد کبدی حین مصرف دارو می بایست انجام شود.
- با توجه به اینکه استروئیدهای آنابولیک سبب افزایش LDL، کاهش HDL و در نتیجه افزایش خطر آترواسکلروز می گردند لذا در بیماران با سابقه انفارکتوس میوکارد و بیماری های عروق کرونر می بایست با احتیاط مصرف شوند.
- در صورت مصرف در کودکان، توصیه می شود بررسی رشد استخوانی توسط X-ray هر ۶ ماه یک بار انجام شود.
- اندازه گیری کلسترول، آهن خون و ظرفیت اتصال آهن، هموگلوبین و هماتوکریت می بایست به صورت دوره ای انجام شود.
- در بیماران مبتلا به سرطان سینه، استروئیدهای آنابولیک ممکن است سبب افزایش کلسیم خون گردند که در این صورت می بایست درمان قطع شود.
- از آنجاییکه سالمندان مصرف کننده استروئیدهای آنابولیک در معرض خطر ابتلا به هایپرتروفی پروستات و سرطان پروستات می باشند لذا تنظیم دوز در این افراد می بایست با احتیاط صورت گیرد.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع می باشد.

مصرف در شیردهی:

از آنجاییکه اطلاعات دقیقی در ارتباط با ورود این دارو به داخل شیر مادر در دسترس نیست مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

درمان آتمی: بزرگسالان: ۵-۱ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز به صورت خوراکی.

توجه: مقدار موثر دارو ۲-۱ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز به صورت خوراکی می باشد اما ممکن است در بعضی از بیماران مقادیر بیشتری لازم باشد.

کودکان: ۵-۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به صورت خوراکی.

در نوزادان نارس و تازه متولد شده دوز دارو بر حسب وزن و سطح بدن آنها توسط پزشک تعیین می شود ولی دوز دارو به طور طبیعی ۰/۱۷۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.

بزرگ شدن آلت تناسلی، کلفت شدن صدا، پرپود نامنظم و افزایش یا کاهش غیرعادی مو در زنان، افزایش تعداد دفعات تعویض و رشد موها در مردان نابالغ، پریاپیسم، تحریک پذیری مثانه، کاهش حجم مایع منی، التهاب اپیدیدیم، ناتوانی جنسی، کاهش اسپرم (نقص در باروری)، آتروفی بیضه در مردان بالغ.

سایر عوارض جانبی عبارتند از: احساس سرما، اسهال، درد و نفخ معده، گرفتگی عضلات، اشکال در به خواب رفتن، افزایش یا کاهش غیرارادی تمایلات جنسی، تحریک پذیری، آکنه، تهوع، استفراغ، بزرگ شدن پستان، آتمی فقر آهن، یرقان کلسیاتیک، نئوپلاسم های هیپاتوسولار (Peliosis hepatis) (پیدایش کیست های متعدد پر از خون در کبد)، کاهش تحمل گلوکز، ادم، احتیاس الکترولیت های سرم مانند سدیم و پتاسیم، لرز، بسته شدن زودتر از موعد اپی فیز استخوانی در اطفال و لوسمی در بیماران مبتلا به آتمی آپلاستیک.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن مدای مشتری: ۰۹۱-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC/P-S401-01/03

بیکاناکس - آی اچ (بیگالوتامید)

Bicanax-IH 50

Bicalutamide

F.C. Tablet

بیکاناکس - آی اچ ۵۰

بیگالوتامید

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو بر حسب نیاز فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

در صورت داشتن سابقه حساسیت به بیگالوتامید، هر کدام از داروهای دسته آنتی آندروژن غیر استروئیدی، غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.

در صورت مصرف داروهایی مانند ضد انعقادها و مشتقات کومارین (وارفارین)، میدازولام، بوسوتینیب، ایبروتینیب، ایوابرادین، لومیتاپید، پیموزاید، سیمپرویر، آوانافیل، بوستان، بودزوناید، کلشی سین، دوفتیلید، ذوکسوروبیسین، اپلر تون، اورولیموس، فتانیل، هالوفانتین، ایماتینیب، ایواگافتور، لوراسیدون، پیمکرولیموس، اکسی کدون، پروپافنون، رانولازین، سالمترول، ساکساگلیپتین، تولوپتان، یولی پریستال، ویلازودون، آنتاگونیست ویتامین K، زوکلوپتیکسول، ایفسقامید.

در صورت وجود اختلالات خونی، بیماری های کبدی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از قطع مصرف و یا تغییر مقدار دارو بدون مشورت با پزشک، بپرهیزید. در صورتی که مصرف این دارو یک بار در روز است بهتر است این دارو در یک زمان مشخص در طول شبانه روز استفاده شود.

- این دارو می تواند همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.

- در صورت بروز استفراغ به فاصله کوتاهی از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید.

- مصرف این دارو به ندرت موجب مشکلات کبدی در طول درمان می شود. در صورت بروز علائمی مانند درد، حساسیت به لمس در قسمت بالا و راست شکم، زرد شدن رنگ پوست و یا چشم، خارش، تیره شدن رنگ ادرار به سرعت به پزشک خود اطلاع دهید.

- عوارضی مانند کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، سردرد، درد عضلانی و مفاصل، خستگی ممکن است در طول درمان با این دارو ایجاد شود در صورت بروز دو و یا تعداد بیشتری از این علائم به صورت همزمان و ادامه این علائم بیشتر از چند روز به پزشک خود اطلاع دهید.

- مصرف این دارو ممکن است موجب خواب آلودگی شود در صورت بروز این عارضه، در هنگام رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند احتیاط کنید.

از آنجایی که مواردی از افزایش قندخون در طول درمان با LHRH آگونیست ها در بیماران با سابقه قلی دیابت گزارش شده است لذا پایش قند خون در بیماران دریافت کننده بیگالوتامید به همراه LHRH آگونیست ها می بایست صورت گیرد.

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

سرطان پروستات

بزرگسالان: ۵۰ میلی گرم یک بار در روز (صبح یا شب)، درمان با این دارو می بایست به صورت همزمان با یک آنالوگ LHRH صورت گیرد.

مصرف این دارو در بیماران دچار اختلالات شدید تا متوسط کبدی می بایست

با احتیاط صورت گیرد.

در بیماران دچار اختلالات کلیوی و یا اختلالات کبدی خفیف نیاز به تنظیم دوز نمی باشد.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری:

استفاده از بیگالوتامید در خانم های باردار منع مصرف دارد و ممکن است رشد جنین را تحت تاثیر قرار دهد.

مصرف در دوران شیردهی:

استفاده از این دارو در دوران شیردهی ممنوع است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از این عوارض با پزشک مشورت نمایید.

عوارض جانبی شایع:

تهوع، اسهال، گرگرفتگی، ادرار خونی، افزایش آنزیم آمینوترانسفراز، ژینکوماستی، درد پستان، پنومونی.

عوارض جانبی با شیوع کمتر:

نئوپلاسم، درد گردن، تب، لرز، سپسیس، فتق، کیست، آتروزین پکتوریس، نارسایی احتقانی قلب، انفارکتوس قلبی، ایست قلبی، اختلالات عروق کرونر، سنکوپ، مدفوع قیری رنگ، خونریزی مقعدی، خشکی دهان، اختلال در بلع، آبسه لثه، سرطان دستگاه گوارش، ادم، افزایش اوره و کراتینین، از دست دادن آب بدن، نقرس، افزایش کلسترول، درد، کرامپ پا، افزایش تونیسیتی، گیجی، خواب آلودگی، کاهش میل جنسی، نوروپاتی، عصبانیت، اختلالات ریه، آسم، خونریزی از بینی، سینوزیت، خشکی پوست، آلوپسی، خارش، زونا، سرطان پوست، اختلالات پوستی، آب مروارید، ادرار دردناک، تکرر ادرار، هیدرونفروز، اختلالات مجاری ادراری.

عوارض جانبی نادر:

واکنش های حساسیتی مانند ادم آنژیونورتیک و کبیر، بیماری بینایی ریه شامل پنومونی بینایی و فیبروز ریوی، کاهش تحمل گلوکز که به صورت دیابت و یا کاهش کنترل قند در افراد دارای سابقه دیابت بروز می کند.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن مدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SG85-01/02

آمپول بتازونکس (بتامتازون)

بتامتازون بتازونکس

Betamethasone
Betasonex
4 mg/ 1mg
Injectable Solution

۴ میلی گرم در ۱ میلی لیتر
محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیه قبل از دیگران خودداری نمایید.
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- وجود هر نوع حساسیت به کورتیکوئوپین یا آدرنوکورتیکوئیدها و مواد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر ایدز، عفونت های قارچی سیستمیک، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری های قلبی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری های کلیوی، دیابت، میاستنی گراویس و استنوپروز.
- در صورت حاملگی و شیردهی.
- نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:**
- بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان این دارو با داروهایی نظیر آنتی اسیدها، فرم تزریقی آموتریپسین ب، داروهای خوراکی ضد دیابت، گلیکوزیدهای دیورتال، دیورتیک ها، داروهای القا کننده آنزیم کبدی، منابع پتاسیم، داروهای حاوی سدیم، هورمون رشد انسانی، واکسن ها و فرآورده های حاوی الکل خودداری کنید.
- در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم، کالری و افزایش مصرف مکمل پتاسیم و پروتئین بیشتر مورد نیاز باشد.
- از مصرف بیش از مقدار و مدت تومیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.
- معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت به طور مرتب باید انجام شوند.
- پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است قطع تدریجی مصرف دارو لازم باشد.
- در صورت بروز عفونت ها یا ضایعات جدی باید احتیاط کرد.
- چنانچه در حین مصرف این دارو با افرادی که دچار سرخک یا آبله مرغان هستند مجاور شوید ممکن است اقدامات پیشگیرانه لازم باشد.
- این دارو ممکن است باعث اختلال در هوشیاری شود بنابراین در رانندگی یا کار با ماشین آلات می بایست احتیاطات لازم را رعایت کرد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار دوزاژ معمول این دارو به قرار زیر می باشد: در بزرگسالان: تا میزان ۹ میلی گرم بتامتازون در روز داخل فمیل، ضایعه و بافت نرم تزریق می گردد. از راه عضلانی، آهسته وریدی و انفوزیون وریدی نیز ۲-۴ میلی گرم تجویز می گردد که در ۲۴ ساعت می توان این مقدار را حداکثر ۴ مرتبه تکرار نمود.

در کودکان: دوز این دارو در کودکان بر اساس وزن و سطح بدن آنها طبق نظر پزشک محاسبه می گردد.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری تومیه نمی گردد. هرچند که مطالعات جامعی در مورد این دارو در انسان صورت نگرفته است.

در هر صورت مصرف طولانی مدت این دارو در دوران بارداری ممکن است مشکلاتی را برای نوزاد پس از تولد به وجود آورد.

مصرف در شیردهی:

کورتیکواستروئیدها از شیر مادر عبور می کنند و ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی رشد نوزاد داشته و یا باعث یک سری عوارض ناخواسته در نوزاد گردند که بستگی به مقدار داروی مصرفی در روز دارد. در این صورت ممکن است لازم باشد از داروهای دیگر استفاده گردد و یا شیردهی متوقف گردد که تشخیص این مسئله به عهده پزشک معالج می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود:

کاهش یا افزایش اشتها، سوزش، سوزناکی، بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، سرگیجه، برافروختگی، سردرد، افزایش درد مفاصل، افزایش تعریق، منگی، افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت، درد شکم و معده، آکنه، مدفوع خون آلود، ضربان نامنظم قلب، اختلالات قاعدگی، خستگی و ضعف غیر معمول، استفراغ، اختلال یا کاهش دید و تکرر ادرار، دیابت، سوزش و عفونت در محل محل تزریق، نارسایی احتقانی قلب، واکنش های آلرژیک، آنافیلاکسی، اختلالات رفتاری، مرع، اختلالات بینایی، احتباس آب و نمک، افزایش فشار خون، پوکی استخوان، پانکراتیت، افزایش وزن، تغییر رنگ پوست، خونریزی از بینی، نکروز آواسکولار استخوان، اختلالات گوارشی، مهار رشد در کودکان و سندرم کوشینگ.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRG/ P- PD08-02/02

آمپول بتازونکس ال.آ. (بتامتازون ال.آ.)

بتامتازون ال.آ. Betamethasone L.A. بتازونکس ال.آ. Betasonex L.A. سوسپانسیون تزریقی Injectable Suspension

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به کورتیکواستروئیدها و اجزای فرمولاسیون.
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر ایدز، آناستاموز روده، عفونت های قارچی سیستمیک، اختلالات گوارشی، بیماری های قلبی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری های کلیوی، دیابت، میاستنی گراویس، استنوپروز، آبله مرغان، سرخک، عفونت ویروسی چشم (هرپس سیمپلکس چشمی)، سایکوز حاد و آلودگی استروئیدی و سل.
- در صورت حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- از تزریق وریدی دارو خودداری نمایید.
- در افراد مسن این دارو بایستی با احتیاط مصرف شود زیرا خطر ابتلا به استنوپروز (پوکی استخوان) به ویژه در زنان بعد از سن یائسگی یا افزایش فشار خون وجود دارد.
- در مصرف طولانی مدت دارو:
ممکن است نیاز به مصرف مکمل های پتاسیم و افزایش مصرف پروتئین وجود داشته باشد.
ممکن است نیاز به کاهش مصرف سدیم و کالری باشد.
- از مصرف دارو بیش از مقدار و مدت زمان توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.
- معاینات چشم پزشکی در صورت درمان طولانی مدت باید به طور مرتب انجام شود.
- پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است نیاز به قطع تدریجی مصرف دارو باشد.
- در صورت بروز عفونت ها، احتمال تروما شدید، نیاز به جراحی و تست های پوستی بایستی احتیاط نمود.
- هنگام مصرف این دارو از مجاورت با افراد مبتلا به آبله مرغان یا سرخک (بخصوص در مورد کودکان) اجتناب نموده و در صورت مجاورت به پزشک مربوطه اطلاع داده شود.
- حین مصرف این دارو بایستی در مصرف واکسن و قرار گرفتن در مجاورت فردی که واکسن خوراکی فلج اطفال را دریافت نموده احتیاط نمود.
- قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
- این محصول را نباید حین تزریق یا به حس کننده های موضعی یا محصولات تزریقی دارای پارابن ها، فنل و دیگر نگهدارنده ها مخلوط نمود. در صورت نیاز ابتدا محصول را در سرنگ بکشید سپس بی حس کننده موضعی را اضافه نمایید.

تداخلات:

آنتی اسیدها، فرم تزریقی آمفوتریسین ب، داروهای خوراکی ضد دیابت و انسولین، گلیکوزیدهای دیژیتال، دیورتیک ها، القا کننده آنزیم های کبدی، مکمل های حاوی پتاسیم، غذاها و داروهای حاوی سدیم، هورمون رشد انسانی، واکسن ها، ویروس زنده یا سایر موارد ایجاد کننده ایمنی، آمینوگلوکوتئامیدها، ماکرولیدها، آنتی کولین استراز، سیکلوسپورین، مهارکننده آنزیم های کبدی، کتوکونازول، میتوتان، ریتودرین، سوماترم، سوماتروپین و فرآورده های حاوی الکل.

مقدار و نحوه مصرف صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار معمول مصرف این دارو به صورت زیر می باشد: براساس نحوه استفاده، شرایط بیمار و نوع بیماری دوز دارو متفاوت می باشد. به منظور استفاده طولانی مدت در کودکان به دلیل احتمال مهار رشد توصیه نمی شود. آرتريت و نقرس حاد، التهاب کیسول مفصلی، التهاب تاندون ها، ۱/۵-۶ میلی گرم هر ۳ تا ۷ روز بر حسب نیاز.

آرتريت روماتوئید و استنواآرتريت: ۱/۵-۱۲ میلی گرم و تکرار در صورت لزوم.

آسم و رینیت: ۶-۱۲ میلی گرم هر ۷ روز یک بار.

اختلالات پوستی به صورت تزریق داخل پوستی: ۱/۲ میلی گرم به ازای هر سانتی متر مربع از پوست درگیر بیماری هر ۳ تا ۷ روز.

بیماری لوپوس اریترماتوز سیستمیک در ابتدای درمان: ۱۲ میلی گرم.

مصرف در دوران بارداری:

کورتیکواستروئیدها در بارداری در رده C قرار دارند، بنابراین تجویز آنها در دوران بارداری مگر در شرایط لزوم منع می شود.

مصرف در دوران شیردهی:

کورتیکواستروئیدها در شیر مادر ترشح می شوند. مزایای مصرف آن برای مادر باید نسبت به مضرات آن برای نوزاد سنجیده شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

حس سوختگی، خارش، درد و بی حسی در محل تزریق و یا اطراف آن، نارسایی احتقانی قلب، واکنش های آلرژیک، شوک آنافیلاکسی، عفونت در محل تزریق، اختلالات رفتاری، کوری ناگهانی، آریتمی قلبی، برافروختگی صورت یا گونه ها، تشنج، آکنه، مهار آدرنال، نکرز آواسکولار، آب مروارید، سندرم کوشینگ، آتروفی بافت پوست، کیبوز غیر معمول، احتباس سدیم و مایعات، گلوکوما، مهار رشد کودکان، سندرم کاهش پتاسیم، اختلال در بهبود زخم، افزایش فشار داخل جمجمه، عفونت قارچی یا ویروسی یا چشم، پوکی استخوان، شکستگی استخوان، پانکراتیت، اختلالات گوارشی، به جا ماندن زخم در محل تزریق، میوپاتی، ضعف عضلانی، پارگی تاندون، نازک و شکننده شدن پوست، اختلال یا کاهش دید، تکرر ادرار در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، هیرسوتیسم (افزایش غیر طبیعی رشد مو در بدن و صورت)، افزایش فشار خون، اختلال قاعدگی، ضعف عضلانی، افزایش اشتها، اختلال در خواب، سو، هاضمه، عصبانیت، بی قراری، افزایش وزن، تغییر رنگ پوست، سرگیجه، افزایش درد مفصل، افزایش تهریق، خونریزی از بینی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور و در دمای بین ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران
تلفن صدای مشتری: ۰۹۶۹۵۵۱۷-۳۵۸ داخلی



BRC/ P- PD38 - 01 / 04

قرص بتازونکس (بتامتازون)

Betasonex 0.5

Betamethasone

Scored Tablet

بتازونکس ۰/۵

بتامتازون

قرص خط دار

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به کورتیکواستروئیدها و مواد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگ ها.

- در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر ایدز، عفونت‌های موضعی یا سیستمیک، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری‌های قلبی، میاستنی گراویس، اختلالات مربوط به غده تیروئید، بیماری‌های کبدی و بالا بودن کلسترول خون.

- در صورت حاملگی و شیردهی.

- در صورت مصرف داروهایی مانند آمینوگلوکوتتامید، آمفوتریسین B تزریقی، آنتی اسیدها، ضد دیابت‌های خوراکی، گلیکوزیدهای دی‌ژیتال، دیورتیک‌ها، کتوکونازول، مکمل‌های پتاسیم، واکسن‌ها و آنتی بیوتیک‌های ماکرولیدی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- به منظور عدم ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع داروی نسخه‌ای و بدون نسخه با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

- در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم، کالری و افزایش مصرف مکمل پتاسیم و پروتئین مورد نیاز باشد.

- در طول درمان با این دارو به طور مرتب به پزشک مراجعه کنید.

- از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به ترتیب زیر عمل نمایید:

در صورت مصرف یک روز در میان دارو، اگر صبح همان روز به یاد آوردید، دارو را مصرف کنید در غیر این صورت تا صبح روز بعد دارو را مصرف نکنید بنابراین یک روز مصرف دارو حذف می‌شود.

اگر دارو را یک بار در روز مصرف می‌کنید به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، دوز مربوط به همان نوبت را مصرف کرده و مقدار مصرف را دو برابر نکنید.

اگر دارو چند بار در روز تجویز شده است، هرچه زودتر آن را مصرف کنید و اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است آن را دو برابر

مصرف نمایید.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌گردد. هرچند که مطالعات جامعی در مورد این دارو در انسان صورت نگرفته است.

در هر صورت مصرف طولانی مدت این دارو در دوران بارداری ممکن است مشکلاتی را برای نوزاد پس از تولد به وجود آورد.

مصرف در شیردهی:

کورتیکواستروئیدها از شیر مادر عبور می‌کنند و ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی رشد نوزاد داشته و یا باعث یک سری عوارض ناخواسته در نوزاد گردند که بستگی به مقدار داروی مصرفی در روز دارد. در این صورت ممکن است لازم باشد از داروهای دیگر استفاده گردد و یا شیردهی متوقف گردد که تشخیص این مسئله به عهده پزشک معالج می‌باشد.

مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان: به میزان ۷/۲-۶ میلی‌گرم به صورت تک دوز و یا منقسم در روز مصرف می‌شود.

کودکان: میزان مصرف به وزن و یا سطح بدن کودک بستگی دارد که توسط پزشک معالج تعیین می‌گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود:

افزایش اشتها، سوءهاضمه، عصبانیت یا بی‌قراری، اشکال در به خواب رفتن، تیره یا کمرنگ شدن پوست، سرگیجه، سردرد و افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت از جمله عوارض این دارو می‌باشند. عوارض مصرف بیش از حد دارو به صورت تغییرات شبه کوشینگ شامل گردش در صورت، چاقی، پرموئی، آکنه، اکیموز (بثورات قرمز رنگ)، درد معده، افزایش فشار خون، اختلال در فعالیت جنسی، دیابت، افزایش چربی خون مشاهده می‌گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۵۱۷۰۵۵۹۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC P-SJ12-01/02

برومو کریپتین (بروموزیت – آی اچ ۵/۲)

بروموزیت – آی اچ

قرص خط دار خوراکی حاوی ۲/۵ میلی گرم بروموکریپتین

پیش از شروع مصرف بروموزیت – آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

بروموزیت – آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود:

قرص بروموزیت – آی اچ (ب-رو- موزیت-آی-اچ) حاوی ماده موثره بروموکریپتین (به صورت مزیتات) با میزان ۲/۵ میلی گرم می باشد، بروموکریپتین گیرنده های دوپامین در مغز را تحریک می کند و همچنین آزادسازی پرولاکتین توسط هیپوفیز را مهار می کند. بروموزیت – آی اچ جهت پیش گیری و مهار ترشح شیر و درمان هایپوگنادیسم، گالکتوره، ناباروری، آکرومگالی، افزایش پرولاکتین خون و بیماری پارکینسون استفاده می شود.

آنچه که باید پیش از مصرف بروموزیت – آی اچ بدانید:

بروموزیت – آی اچ برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید:

– اگر به بروموزیت – آی اچ و آگالونید های ارگوت یا سایر ترکیبات فرمولاسیون حساسیت دارید.
– این دارو در بیماران با مشکلات دریچه ای قلب، فشار خون پس از زایمان یا در دوره نفاس (۶ هفته پس از زایمان) و اختلالات فشار خون بالا در بارداری، ممنوعیت مصرف دارد.
– اگر فشارخون، سردرد بی وقفه یا علایم سمیت سیستم عصبی مرکزی (CNS) گسترش یافت سریعاً مصرف دارو قطع گردد.

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

در طول مصرف بروموزیت – آی اچ بیماران باید از نظر موارد زیر تحت نظر قرار بگیرند:
بیماری های قلبی و عروقی، فیبروز خلف صفافی، ملانوما، اختلالات سایکوتیک، زوال عقل، توهم، اختلال کنترل تکانه، اختلالات بینایی، پیشرفت تومور در بیماران آکرومگال، فیبروز دریچه قلبی، زخم و خونریزی معده، آدنوما ترشح کننده پرولاکتین و اختلال عملکرد کبد.
– در بیماران هائپرپرولاکتینمی علت افزایش سطح پرولاکتین خون باید مشخص شود.
– به دلیل ایجاد خواب آلودگی در طول روز هنگام انجام کارهایی مانند رانندگی یا کار با ماشین آلات احتیاط شود.

بروموزیت – آی اچ را چگونه مصرف کنید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورالعمل پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

– پیش گیری از ترشح شیر: ۲/۵ میلی گرم روز اول، سپس ۲/۵ میلی گرم دوبار در روز به مدت ۱۴ روز.
– مهار ترشح شیر: ابتدا ۲/۵ میلی گرم روزانه برای ۲ تا ۳ روز سپس ۲/۵ میلی گرم دوبار در روز برای ۱۴ روز.
– آکرومگالی: ابتدا ۱ تا ۱/۲۵ میلی گرم روزانه، دارو در زمان خواب مصرف شود. سپس دوز دارو به صورت تدریجی تا ۵ میلی گرم هر ۶ ساعت افزایش می یابد.
– اختلالات افزایش پرولاکتین خون: ابتدا ۱ تا ۱/۲۵ میلی گرم روزانه، دارو در زمان خواب مصرف شود. سپس دوز دارو به صورت تدریجی تا ۵ میلی گرم هر ۶ ساعت افزایش می یابد.

چطور مصرف کنید:

قرص به طور کامل با یک لیوان آب بلعیده شود.

چه زمانی مصرف کنید:

برای کاهش عوارض گوارشی دارو را همراه غذا مصرف کنید.

برای چه مدت مصرف کنید:

مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.
به قسمت چه مقدار مصرف کنید مراجعه کنید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

در صورت فراموشی قرص برای کسب اطلاعات با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

• بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنید.
آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیردهی:

بارداری: این دارو در گروه B بارداری قرار می گیرد. بروموکریپتین از جفت عبور می کند، مصرف بروموکریپتین در طول دوره بارداری به جز در موارد درمان بیماری ماکروآدنوما پیش رونده باید قطع شود، در صورت نیاز به مصرف بروموکریپتین در دوره بارداری بیمار باید از نظر اختلال افزایش فشارخون و زایمان زودرس تحت نظر قرار بگیرد. شیر دهی: مصرف این دارو در خانم های شیرده جهت درمان دیابت نوع ۲ و یا افراد با سابقه بیماری شریان کرونر یا دیگر مشکلات قلبی و عروقی ممنوعیت مصرف دارد.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

– در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. به ویژه اگر هریک از داروهای زیر را مصرف می کنید می بایست با پزشک خود مشورت نمایید:
اتیل الکل، آلفا بتا آگونیست ها، مسکن ها (اوپیوئید)، آندروژن ها، متوکلوپرامید، اندانسترون، مهارکننده مونوآمینو اکسیداز (مانند سزالین)، داروهای ضد سایکوز، باریتورات ها، بتا بلکرها، داروهای کاهنده فشار خون، ریمونیدین، کوئی واپتان، سیکلوسپورین، داروهای مهار کننده CYP3A4، دیابوکستین، دیازوکساید، دولوکستین، فوس اپریپانت، فورتیدیک اسید، لودویا، لینزولاید، متاکسالون، متیل فنیدات، نیکوراندیل، نیتروگلیسرین، پتوکسی فیلین، سلیدناتیل، تادالافیل، آتالوگ های پروستاگلین، آنتی بیوتیک های کینولونی (مانند سیپروفلوکساسین)، سالیسیلات ها، داروهای ضد افسردگی، دیورتیک های تیازیدی (مانند هیدروکلروتیازید)، تیزانیدین، ترامادول، ضد قارح های آرولی، دیلتیازم، وراپامیل، دومپریدون، ارگوتامین، ایبانتینیب، آنتی بیوتیک های ماکرولیدی (مانند کلاریترومایسین) مماتین، مهار کننده های HIV-protease.

عوارض جانبی احتمالی مصرف بروموزیت – آی اچ چه می باشد:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
شایع: بیوست، خواب آلودگی، سردرد، گرفتگی بینی، تهوع.
غیر شایع: درماتیت آلرژیک، ریزش مو، گیجی، سرگیجه، خشکی دهان، خستگی، توهم، افت فشار، کرامپ پا، اختلالات حرکتی، استفراغ.
نادر: درد شکم، آریتمی، بیماری دریچه قلب، اسهال، تنگی نفس، اختلالات دستگاه گوارش، خونریزی دستگاه گوارش، سندرم تورولیتیک بدخیم، رنگ پریدگی، بیهوشی، پریکاریت، ادم محیطی، اختلال روان پریشی، اختلالات تنفسی، اختلالات خواب، وزوز گوش، اختلالات بینایی.

آیا می دانید در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی میتوان از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقا، گزارشدهی عوارض دارویی تهیه شده است.)

بروموزیت – آی اچ چگونه نگهداری می شود:

– دارو را دور از دید و دسترسی کودکان نگهداری کنید.
– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
– در طول مدتی که قرص های خود را مصرف می کنید آنها را در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
– از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری کنید.
– از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

توصیه مهم:

شکل ظاهری بروموزیت – آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص بروموزیت – آی اچ به صورت سفید، گرد و خط دار می باشد که در جعبه های ۳۰ عددی (حاوی ۳ پلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده

بروموزیت – آی اچ، محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.
کیلوستر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران.
تلفن مداخل مشتری: ۹-۵۵۱۷۰۵۱۴۴۹۰ +۹۸۲۱۴۴۹۰ (داخلی ۳۵۸)

تاریخ بازنگری:

۱۳۹۹/۱۱/۱۴



پروژسترون ۲۵ و ۵۰ (فموژکس-آی اچ)

پروژسترون ۲۵ و ۵۰
Femogex-IH
25 & 50 mg/1ml
Injectable Solution

فموژکس-آی اچ

۲۵ و ۵۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو بر حسب نیاز فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به پروژستین ها، روغن کنجد، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

- در صورت داشتن هر نوع رژیم غذایی مانند رژیم غذایی کم نمک و یا رژیم غذایی دارای قند پایین.

- در صورت حاملگی و شیردهی.

- در صورت مصرف داروهای زیر:

آمینوگلوکوتامید، کاربامازپین، فنوباریتال، فنی تونین، ریفامپین و ریفاپتین.

- در صورت داشتن سابقه ابتلا، به بیماری های زیر:

آسم، صرع، مشکلات قلبی، ناراحتی های کلیوی، سردردهای میگرنی، خونریزی های غیر طبیعی مانند وجود خون در ادرار و یا خونریزی غیر طبیعی از واژن، لخته شدن خون، سکت، واریس وریدها، بیماری های پستان، مشکلات سیستم عصبی مرکزی، بالا بودن سطح کلسترول خون، دیابت ملیتوس، بیماری های کبدی و بیماری هایی که احتمال ابتلا به پوکی استخوان را تشدید می کنند.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- به علت وجود بنزیل الکل، این دارو نباید در نوزادان نارس یا رسیده بکار رود.

- این دارو را فقط طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

- این دارو را در زمان های معین مصرف کنید تا عوارض آن کمتر و اثربخشی آن بهتر شود.

- اگر مصرف یک دوز این دارو را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید ولی چنانچه زمان به یاد آوردن شما هم زمان با مصرف دوز بعدی بود فقط یک دوز مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوز خودداری کنید و بقیه را طبق روال مصرف نمایید.

- در حین مصرف این دارو بهتر است بطور مرتب تحت نظر پزشک باشید تا وضعیت بهبودی شما مورد بررسی قرار گیرد.

- این دارو ممکن است باعث سرگیجه و خواب آلودگی شود. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

- چنانچه خونریزی غیر منتظره از واژن برای مدت طولانی رخ داد با پزشک خود مشورت نمایید.

- چنانچه سیکل ماهیانه شما برای مدت ۴۵ روز از آخرین دفعه قاعدگی تکرار نشد با پزشک خود مشورت نمایید.

- چنانچه احتمال می دهید به تاخیر افتادن قاعدگی شما به علت بارداری می باشد باید فوراً مصرف این دارو را قطع کنید و به پزشک خود اطلاع دهید.

- چنانچه می خواهید یک آزمایش طبی انجام دهید مصرف کردن پروژسترون را به پزشک معالج اطلاع دهید.

- در بعضی از بیماران ممکن است این دارو باعث خونریزی از لثه شود بنابراین توصیه

می شود که دندان هایتان را مرتب مسواک نمایید و لثه هایتان را ماساژ دهید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می کند. ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

برای کنترل خونریزی غیر معمولی و شدید از رحم و درمان متوقف شدن سیکل ماهیانه، در بزرگسالان و نوجوانان مقدار ۱۰-۵ میلی گرم روزانه به مدت ۱۰-۶ روز.

ممکن است پزشک شما مقدار ۱۵۰-۱۰۰ میلی گرم از این دارو را در یک تک دوز برای شما تجویز نماید.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران حاملگی توصیه نمی شود.

مصرف در شیردهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می شود ولی اثرات آن بر روی شیر خوار مشخص نشده است.

عوارض جانبی:

هردارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

لخته شدن خون، حمله قلبی، سکت، مشکلات کبدی و چشمی، سردرد میگرنی، درد سینه، تغییر در تن صدا، تغییر در بینایی، کوتاه شدن تنفس، افزایش دفعات خونریزی ماهیانه، افزایش و یا کاهش حجم خون در دوره قاعدگی، توقف سیکل ماهیانه، تکرر ادرار، کاهش اشتها، افسردگی، افزایش ترشح شیر، راش پوستی، تورم صورت و پاها، مشکل در به خواب رفتن، آکنه، کاهش یا افزایش مو، کاهش میل جنسی، سفتی و درد پستان، درد در محل تزریق و کاهش یا افزایش وزن.

شرایط نگهداری:

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران
تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۱۷۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PJ 15-01/ 02

پرامی پکسول (پراسول)

پراسول ۰/۷ و ۰/۱۸ Prasol 0.7 & 0.18

Pramipexole

Scored Tablet

پرامی پکسول

قرص خطدار

می‌توان هر ۴ تا ۷ روز مقدار دوز دارو را تا ۰/۵ میلی‌گرم روزانه افزایش داد. کودکان: ایمنی و اثربخشی دارو در کودکان به اثبات نرسیده است. در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل نمایید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری:

از آنجایی که مطالعات کافی بر روی زنان باردار انجام نشده است لذا مصرف این دارو در دوران بارداری تنها در صورت لزوم و با احتیاط فراوان می‌بایست انجام گیرد.

مصرف در دوران شیردهی:

در ارتباط با ورود این دارو به داخل شیر مادر اطلاعات دقیقی در دسترس نیست لذا توصیه می‌شود که در صورت لزوم مصرف این دارو، شیردهی متوقف گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

هایپوتانسیون وضعیتی، دیس کاینزی (پرش ناگهانی و حرکات غیر طبیعی بدن)، توهیم، تهوع، گیجی، از دست دادن حافظه، بی‌خوابی، بی‌قراری حرکتی، خواب‌آشفته، اختلال تفکر، اختلالات بینایی، غش کردن (بخصوص در حالت ایستاده)، اختلال در بلع، ادم محیطی، تب، تکرر ادرار، درد عضلات و مفاصل، ضعف عضلانی، رابدومیولیز، تغییرات در خلق و خو، سو، ظن و بدگمانی، پنومونی (سرفه، تنگی نفس)، درد سینه، عفونت ادراری، پیوست، خشکی دهان، بی‌اشتهایی، کاهش میل جنسی، افزایش تعریق، آبریزش بینی، مشکلات پوستی مانند راش و خارش، کاهش وزن، سردرد، خستگی، آنفولانزا، لرزش، آرتريت.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

– دارو را از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC P- SE65-01/03

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– در صورت داشتن سابقه حساسیت به پرامی پکسول، غذاها، رنگ‌ها و مواد محافظ.

– در صورت مصرف داروهایی مانند لوودوپا، کربی دوپا/ لوودوپا، سایمتیدین، رانیتیدین، دیلتیازم، تریامترن، وراپامیل، هالوپریدول، متوکلوپرامید، کینیدین و کینین.

– در صورت وجود اختلالاتی نظیر مشکلات چشمی بخصوص در قسمت شبکیه، توهیم، هایپوتانسیون و هایپوتانسیون وضعیتی (سرگیجه، گیجی و یا غش کردن بخصوص وقتی شخص از حالت خوابیده یا نشسته به ایستاده در حال تغییر وضعیت است). – مشکلات کلیوی.

– در صورت مصرف در سالمندان.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– دارو را مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از قطع مصرف و یا تغییر مقدار دارو بدون مشورت با پزشک بپرهیزید. پزشک ممکن است در نظر داشته باشد که مقدار داروی مصرفی را پیش از قطع کامل به تدریج کم نماید.

– این دارو ممکن است در بعضی افراد سبب خواب‌آلودگی و یا گیجی گردد و یا موجب بوجود آمدن مشکلات بینایی، ضعف، خستگی و عدم هماهنگی در حرکات عضلات شود. بنابراین از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند بعلت عدم توانایی تطابق و دید نامناسب خودداری نمایید.

– زمانی که از حالت نشسته یا دراز کشیده به حالت ایستاده تغییر وضعیت می‌دهید ممکن است افت وضعیتی فشار خون رخ دهد لذا توصیه می‌گردد که به‌طور ناگهانی از حالت نشسته یا خوابیده به حالت ایستاده تغییر وضعیت ندهید.

– توهیمات (دیدن، شنیدن یا احساس چیزهایی که وجود ندارد) در بعضی بیماران به خصوص سالمندان ممکن است مشاهده گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

– پارکینسون:

بزرگسالان: دوز اولیه ۰/۱۲۵ میلی‌گرم سه بار در روز می‌باشد که به تدریج مقدار دارو با نظر پزشک و در فواصل ۵ تا ۷ روز افزایش می‌یابد.

محدوده دوز نگهدارنده ۰/۵ تا ۱/۵ میلی‌گرم به صورت ۳ بار در روز می‌باشد. در بیماران دچار اختلال کلیوی مانند سالمندان ممکن است به تنظیم دوز دارو نیاز باشد.

– سندرم پاهای بی‌قرار (Restless Legs Syndrome):

۰/۱۲۵ میلی‌گرم یک بار در روز ۲ تا ۳ ساعت پیش از خواب که در صورت نیاز

پروتامین سولفات (پروسولفامین)

پروتامین سولفات پروسولفامین

Protamine Sulfate
Prosulfamin

5000 UAH/ 5ml
Injectable Solution

۵۰۰۰ واحد در ۵ میلی گرم
محلول قابل تزریق

راهنمایی عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف:

– حساسیت به دارو و عدم تحمل دارو.

– اگر خونریزی به دلیل غیر از مسمومیت با هیپارین و انوکسپارین باشد، از مصرف دارو خودداری شود.

احتیاط مصرف:

– در مردان نابارور و مردانی که قبلاً واکتومی شده اند، در افرادی که حساسیت به ماهی دارند، بیماران دیابتی که انسولین حاوی پروتامین مصرف کرده اند و افرادی که قبلاً پروتامین دریافت کرده اند به دلیل احتمال واکنش های آنافیلاکتیک شدید دارو را با احتیاط مصرف کنید.

– در افرادی که قبلاً آنژیوپلاستی و یا بای پس کرونری شده و روی دستگاه قلب و ریه بوده اند، به علت اینکه پروتامین دریافت کرده اند، احتمال بروز واکنش های آنافیلاکتیک کشنده و همچنین ادم ریوی غیر کاردیوژنیک وجود دارد.

مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان:

در مسمومیت با هیپارین، دوز معمول ۵۰ میلی گرم به صورت تزریق وریدی است.

نکته: از آنجا که هیپارین به سرعت از جریان خون حذف می شود، به تبع آن میزان پروتامین مورد نیاز نیز به سرعت با گذشت زمان کاهش پیدا می کند. به عنوان نمونه اگر پروتامین ۳۰ دقیقه بعد از تزریق هیپارین مصرف شود، نصف میزان دوز معمول می تواند کافی باشد.

ماکزیمم دوز مصرف: ۵۰۰ میلی گرم.

کودکان:

دوز تجویزی پروتامین در بچه ها در شرایط مسمومیت با هیپارین	
مدت زمان از آخرین دریافت هیپارین	مقدار دوز پروتامین
کمتر از ۳۰ دقیقه	۱ میلی گرم به ازای هر ۱۰۰ واحد هیپارین
بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه	۰/۵ تا ۰/۷۵ میلی گرم به ازای هر ۱۰۰ واحد هیپارین
بین ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه	۰/۳۷۵ تا ۰/۵ میلی گرم به ازای هر ۱۰۰ واحد هیپارین
بیشتر از ۱۲۰ دقیقه	۰/۲۵ تا ۰/۳۷۵ میلی گرم به ازای هر ۱۰۰ واحد هیپارین

دوز تجویزی پروتامین در بچه ها در شرایط مسمومیت با انوکسپارین	
مدت زمان از آخرین دریافت انوکسپارین	مقدار دوز پروتامین
کمتر از ۸ ساعت	۱ میلی گرم به ازای هر ۱ میلی گرم انوکسپارین
بین ۸ تا ۱۲ ساعت	۰/۵ میلی گرم به ازای هر ۱ میلی گرم انوکسپارین
بیشتر از ۱۲ ساعت	نیاز به تجویز پروتامین نیست

نحوه آماده سازی:

معمولاً برای تزریق پروتامین نیاز به رقیق کردن نیست ولی در صورت لزوم فقط در دکستروز ۵ درصد یا نرمال سالین تزریقی رقیق گردد.

نحوه تزریق:

پروتامین حتماً باید به صورت تزریق آهسته وریدی (طی مدت ۱۰ دقیقه)

مصرف شود. در صورت تزریق سریع می تواند منجر به برادی کاردی، دیس پنه، احساس گرما و گرگرفتگی، افت شدید فشار خون یا حتی افزایش فشار خون شود.

تداخلات دارویی:

به دلیل احتمال بروز ناسازگاری دارویی، پروتامین نباید با فرآورده های تزریقی دیگر از جمله آنتی بیوتیک ها (مخصوصاً سفالوسپورین ها و پنی سیلین ها) مخلوط شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود و لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.

تهوع، استفراغ، سستی، افزایش یا کاهش ناگهانی فشار خون، برادی کاردی، گرگرفتگی، تنگی نفس، خونریزی برگشتی، کمردرد، واکنش های آلرژیک مثل آنژیوادم و آنافیلاکسی، ادم ریوی و افزایش فشار خون ریوی.

توجهات ویژه:

– مصرف پروتامین می تواند سبب بروز کلاپس گردش خون شدید و غیر قابل برگشت و در نهایت منجر به کاهش برون ده قلبی و انفارکتوس میوکاردا شود.

– مصرف پروتامین می تواند سبب بروز شوک آنافیلاکسی شدید شده و مشکلات ثانویه مثل دیسترس تنفسی، کلاپس گردش خون و خونریزی مویرگی ایجاد کند.

مسمومیت و درمان مسمومیت:

به دلیل خاصیت ضد انعقادی دارو، در صورت مسمومیت، علایم خونریزی شدید مشاهده می شود. چون نیمه عمر پروتامین از هیپارین بیشتر است، ممکن است به دلیل اثر برگشتی پروتامین، ۳۰ دقیقه الی ۱۸ ساعت بعد از تزریق دارو علایم ضد انعقادی دارو عود کند.

جهت درمان موارد مسمومیت، اقدام سریع در جبران حجم خون با انجام انتقال خون یا تزریق پلاسمای تازه منجمد ضروری است. اگر بیمار دچار افت فشار خون شود، مایعات وریدی، اپی نفرین، دوپامین و یا دوبوتامین استفاده می شود.

مصرف در بارداری:

از لحاظ FDA این دارو در گروه C قرار دارد و بدین معنی است که مطالعات حیوانی خطری را نشان نداده است و مطالعات انسانی نیز انجام نشده است. بنابراین در صورت لزوم باید فواید مصرف دارو نسبت به مضرات آن توسط پزشک معالج سنجیده شود.

مصرف در شیردهی:

دلایلی از ترشح این دارو در شیر وجود ندارد ولی در صورت نیاز باید احتیاط کرد.

شرایط نگهداری:

– در را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

– در ضمن محلول رقیق شده دارو قابل نگهداری نیست.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن سمدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۹۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PO25- 01/ 02

پروپیل تیواوراسیل (پرواوراسیل ۵۰)

Prouracil 50

Propylthiouracil

Scored F.C. Tablet

پرواوراسیل ۵۰

پروپیل تیواوراسیل

قرص روکش دار خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به داروهای ضدتیروئید تیواامیدی و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت مصرف بیش از یک سال این دارو.
- در صورت حاملگی و شیردهی.
- در صورت وجود یا بروز بیماری های دندان و لثه، اختلال در عملکرد کبد، دیابت، کاهش فشار خون و بیماری های قلبی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف کنید و دارو را همواره در زمان معینی از روز مصرف نمایید.
- دارو را کمتر یا بیشتر از میزان تجویز شده مصرف نکنید.
- پیش از قطع دارو به پزشک اطلاع دهید.
- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید و اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، مقدار مصرف بعدی را دو برابر کنید. در صورتی که دو یا سه نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به پزشک خود مراجعه کنید.
- طی مصرف دارو به منظور بررسی پیشرفت عملکرد دارو، به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.
- بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان پروپیل تیواوراسیل با داروهایی نظیر آمینوفیلین، تنوفیلین، آمیودارون، گلیسیرین ید، یدید پتاسیم، داروهای یددار، ضد انعقادها، بتالاکرها، گلیکوزیدهای دیرتال، کومارین و ید رادیواکتیو خودداری فرمایید.
- در صورت هر نوع ضعف، مدهمه، عفونت و جراحی یا پزشک مشورت کنید.
- در صورت مصرف دوز بالا و یا طولانی مدت دارو، غده تیروئید و عملکرد آن را تحت نظر داشته باشید.
- در حین مصرف دارو و پس از قطع آن، در صورت نیاز به انجام واکسیناسیون حتماً با پزشک خود مشورت نمایید.
- جهت پیشگیری از عوارض خونی، آزمون CBC را مرتباً انجام دهید.
- از آنجایی که این دارو ممکن است هایپوپروترومبینی و خونریزی ایجاد نماید، لذا بررسی PT به خصوص قبل از اعمال جراحی توصیه می گردد.

مقدار مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
- جهت درمان هیپرتیروئیدیسم از راه خوراکی در جوانان و بزرگسالان:
- ابتدا ۳۰۰-۹۰۰ میلی گرم در روز در ۱ تا ۴ دوز منقسم تجویز می گردد تا عملکرد تیروئید به حالت طبیعی باز گردد.
- توجه: بیماران با هیپرتیروئیدیسم شدید ممکن است تا ۱/۲ گرم در روز نیز مصرف نمایند.
- جهت درمان نگهدارنده ۶۰۰-۵۰ میلی گرم در روز در ۱ تا ۴ دوز منقسم استفاده می شود.
- در تیروئیتیکوز (طوفان تیروئیدی) ۴۰۰-۲۰۰ میلی گرم هر ۴ ساعت طی یک روز اول تجویز می گردد و پس از آن با دوز کمتر درمان ادامه می یابد.

- درمان هیپرتیروئیدیسم در اطفال:

در اطفال ۱۰-۶ سال ابتدا ۱۵۰-۵۰ میلی گرم در روز در ۱ تا ۴ دوز منقسم به صورت خوراکی تجویز می شود. در اطفال ۱۰ سال و بالاتر از آن ابتدا ۳۰۰-۵۰ میلی گرم در روز در ۱ تا ۴ دوز منقسم به صورت خوراکی مصرف می گردد.

دوز نگهدارنده خوراکی از روی میزان پاسخ ایجاد شده محاسبه می گردد.

در تیروئیتیکوز نوزادان ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به صورت دوزهای منقسم مصرف می شود.

مصرف در بارداری:

این دارو از جفت عبور می کند، با این حال مضرات آن در مقابل فواید دارو باید قبل از مصرف سنجیده شده و پیگیری فعالیت های تیروئیدی طی مصرف دارو لازم می باشد.

مصرف در شیردهی:

این دارو در شیر ترشح می شود. تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود.

اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.

بیشتر عوارض جانبی این دارو وابسته به دوز بوده و طی ۴ تا ۸ هفته اول ایجاد می شوند.

عوارضی که نیازمند مراقبت پزشکی می باشند:

- عوارض یا شیوع فراوان: تب ملایم و گذرا، لوکوپنی و التهاب یا خارش پوست.
- عوارض با شیوع کمتر: آگرانولوسیتوز، التهاب یا درد مفاصل، سندرم شبه بوبوس و دردهای عصبی محیطی.
- عوارض نادر: آنمی آپلاستیک، هایپوپروترومبینی، ترومبوسیتوپنی، نکروز کبدی، سرفه و تنفس کوتاه، تورم غدد لنفاوی و بزاقی و واسکولیت.

عوارضی که در صورت تداوم و بدتر شدن نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

- سرگیجه و درد معده.

عوارض مربوط به مصرف بیش از حد دارو (هیپوتیروئیدیسم):

- تغییر در دوران پریرود زنان، احساس سردی، یبوست، پوست متورم و خشک، پواتر، سردرد، خواب آلودگی، درد عضلانی، تهوع، استفراغ، خستگی، ضعف غیرعادی و افزایش غیر عادی وزن.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

تولید کننده:

پرواوراسیل ۵۰ محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.
کیلوستر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران
تلفن صدای مشتری: ۹۰۵۵۱۷-۹۸۲۱۴۴۹۰ + (داخلی ۳۵۸)



پردنیزولون (نیزوپرد ۵ و ۵۰)

Nisopred 5 & 50
Prednisolone
Double Scored Tablet

نیزوپرد ۵ و ۵۰
پردنیزولون
قرص خط دار متقاطع

پیش از شروع مصرف نیزوپرد و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک یا داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

نیزوپرد چیست و به چه منظور استفاده می شود:

نیزوپرد (نیزوپرد ۵ و ۵۰) حاوی ۵ و ۵۰ میلی گرم ماده مؤثره پردنیزولون است. این دارو به خانواده کورتیکواستروئیدها (گلوکوکورتیکوئیدها) تعلق دارد و به عنوان یک ضد التهاب با عمل سرکوب کننده سیستم ایمنی در مواقع واکنش حساسیتی، بیماری های پوستی، اختلالات غدد درون ریز، بیماری های گوارشی، اختلالات خونی، بیماری تنوبلیستیک، آسیب سیستم عصبی، بیماری های چشمی، اختلالات کلیوی، بیماری های تنفسی، اختلالات روماتوئیدی و پس زدن عضو پیوندی کاربرد دارد.

آنچه که باید پیش از مصرف نیزوپرد بدانید:

نیزوپرد برای بیماری های فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید:

– در صورت وجود حساسیت به پردنیزولون و یا هر کدام از اجزای فرمولاسیون نباید دارو را مصرف کنید.

– در صورت فشارخون بالا، نارسایی احتقانی قلب، نارسایی کلیوی، دیابت شیرین، اختلال عملکرد کبدی، نارسایی حاد قلبی، بیماری مرع، پوکی استخوان، میاستنی گراویس، بیماری تیروئید و بیماری ایدز (HIV) به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت مصرف داروی پروپرانولول به پزشک خود اطلاع دهید.

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

– در طی دوره درمان به طور مرتب جهت بررسی پیشرفت درمان به پزشک خود مراجعه نمایید.

– قبل از قطع درمان با پزشک خود مشورت نمایید: ممکن است کاهش تدریجی دوز نیاز باشد.

– در صورتی که کاتاراکت، هرپس سیمپلکس، گلوکوم و یا سایر بیماری های چشمی را دارید این دارو را با احتیاط مصرف نمایید.

– اگر قرار است این دارو را برای مدت طولانی مصرف نمایید ممکن است پزشک شما بخواهد از رژیم پروبیوتیک که نمک آن کم و میزان پتاسیم در آن غنی باشد و یا میزان کالری دریافتی خود را کنترل و پروتئین مازاد به رژیم خود اضافه نمایید.

– اگر علایم شما پس از کاهش دوز و یا قطع دارو عود کرد یا بدتر شد با پزشک خود در میان بگذارید.

– قبل از انجام آزمایشات پوستی یا قبل از انجام هر نوع جراحی (از جمله جراحی دندان) یا درمان اورژانسی، به پزشک مسئول خود درباره استفاده از این دارو اطلاع دهید.

– در صورت ابتلا به عفونت یا جراحات جدی به پزشک خود اطلاع دهید.

– از تماس نزدیک با کسی که آلوده مرغان یا سرخک دارد اجتناب کنید. اگر فکر می کنید در معرض آلوده مرغان یا سرخک قرار گرفته اید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

– در زمانی که تحت درمان با این دارو هستید و پس از قطع مصرف آن، بدون تأیید پزشک خود هیچگونه ایمن سازی (واکسیناسیون) انجام ندهید. همچنین سایر افرادی که در خانه با شما زندگی می کنند نباید واکسن فلج اطفال خوراکی دریافت کنند.

– این دارو ممکن است بر سطح کلوتر خون تأثیر بگذارد. اگر متوجه تغییر در نتایج آزمایش قند خون یا ادرار شده اید یا پزشک خود مشورت کنید.

نیزوپرد را چگونه مصرف کنید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند، تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

دوز عمومی: دوز بستگی به وضعیت درمانی و پاسخ بیمار دارد. دوز مصرفی برای نوزادان و کودکان باید بر اساس شدت بیماری و پاسخ بیمار باشد نه بر طبق راهنماهای سخنگیرانه ی دوزبندی که بر اساس سن، وزن و یا سطح بدن کودکان می باشد.

دوز معمول بزرگسالان: ۵-۶ میلی گرم در روز
دوز معمول کودکان: ۱/۲ تا ۲ میلی گرم در کیلوگرم در روز در ۳ یا ۴ دوز منقسم.

چطور مصرف کنید:

قرص را به طور کامل همراه هر لیوان آب مصرف کنید.

چه زمانی مصرف کنید:

برای کاهش ایجاد ناراحتی دستگاه گوارش، دارو را همراه یا بعد از غذا یا شیر مصرف کنید.

برای چه مدت مصرف کنید:

مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

اگر برنامه مصرف دارو به صورت یک دوز یک روز در میان یا یک بار در روز است: در صورتی که صبح همان روز به یاد آوردید، هرچه سریعتر دارو را مصرف کنید سپس مصرف دارو را مطابق برنامه قبلی ادامه دهید. اما اگر تقریباً نزدیک به دوز بعد به یاد آوردید دوز فراموش شده را مصرف نکنید.

اگر برنامه مصرف دارو به صورت چند بار در روز است: هرچه سریع تر دوز فراموش شده را مصرف کنید سپس به مصرف دارو را طبق برنامه قبلی ادامه دهید. اما اگر تقریباً نزدیک به دوز بعد به یاد آوردید دوز دارو را دو برابر نکنید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی DPIC تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیردهی:

بارداری: دسته بندی FDA برای مصرف این دارو در دوران بارداری C می باشد.

به طور کلی توصیه می شود که در دوران بارداری از کمترین دوز مؤثر در کوتاه ترین زمان استفاده شود. از مصرف دوزهای بالا در سه ماهه اول بارداری خودداری کنید.

شیردهی: پردنیزولون در شیر مادر ترشح می شود. توصیه می شود در خانم های شیرده تا ۴ ساعت پس از مصرف دارو از شیردهی خودداری شود.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید بخصوص داروهای زیر:
مهارکننده های استیل کولین استراز، آمینوگلوکوتامید، آموکسیسین بی، آندروژن ها، آنتی اسیدها، داروهای ضد دیابت، اشتها آور، آریپیپرازول، BCG، کلسیتریول، سرتینیب، کورتیکوئیدها، آلفا کتنده ها و مهار کننده های آنزیم CYP3A4، دفرآزیپروس، دنوزومب، اکتیناسه، مشتقات استروئیدی، فوساپریپانت، فلوئوماید، متی مازول، میفپریستون، نتائیزومب، عوامل مسدود کننده عصب - عضله، نیکورآندیل، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، پیمکرولیموس، پیمازاید، آنتی بیوتیک های دسته کینولونی، ریتوناویر، روفلوکسیلاس، سالیسیلات ها، تاکرولیموس (موضعی)، دیورتیک های تیازیدی، توفاسیتینیب، تراستوزومب، واکسن ها (فقال و غیر فقال)، وارفارین و داروهای ضد آریتمی و کلیرومازین.

عوارض جانبی احتمالی مصرف نیزوپرد چه می باشد:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

سرگیجه، سبکسگی، پارگی میوکار، بحران کلیوی اسکلوئرمی، استفراغ، اسهال، اختلال چربی خون، ایپوماژون، کاتابولیسم پروتئین، کاهش دید یا تاری دید، تکرر ادرار، عطش، گیجی، هیجان، توهّم، افسردگی ذهنی، تغییرات خلقی، بی قراری، درد یا سوزش شکم یا معده، آکنه.

آیا می دانید در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقای گزارش دهنی عوارض دارویی تهیه شده است).

نیزوپرد چطور نگه داری می شود:

– دارو را دور از دید و دسترسی کودکان قرار دهید.

– دارو را درون جعبه دور از نور و یخ زدگی و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

– دارو را تا زمان مصرف در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.

– از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز گذاشتن آن در خودرو خودداری نمایید.

– از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده روی بسته بندی خودداری نمایید.

توصیف محصول:

قرص نیزوپرد ۵۰ میلی گرم به صورت سفید رنگ، گرد و خط دار متقاطع است که در جعبه های ۱۰۰ عددی (حاوی ۱۰ بیلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه یک برگه راهنما عرضه می گردد.

قرص نیزوپرد ۵ میلی گرم به صورت صورتی رنگ، گرد و خط دار است که در بسته های ۱۰۰ عددی (حاوی ۱۰ بیلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه یک برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

نیزوپرد محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.

کیلوپلور ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران
تلفن مهدی مشتری: ۹-۹۸۲۱۴۴۹۰۵۵ + ۹۸۲۱۴۴۹۰۵۵ (داخلی ۳۵۸)



تریامسینولون استوناید (کورتیران)

تریامسینولون استوناید
۴۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر
کورتیران
سوسپانسیون تزریقی

Triamcinolone Acetonide
40mg / 1ml
Cortiran
Injectable Suspension

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– وجود هر نوع حساسیت به کورتیکوئروپین یا آدرنوکورتیکوئیدها و موارد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر ایدز، عفونت های قارچی سیستمیک، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری های قلبی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری های کلیوی، دیابت، میاستنی گراویس، استنوز و سل.

– در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

هشدار: از مصرف دارو به صورت تزریق وریدی، داخل جلدی و داخل ضایعه خودداری شود.

به علت وجود بنزیل الکل، این دارو نباید در نوزادان نارس یا رسیده بکار رود.

– بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان این دارو با داروهایی نظیر آنتی اسیدها، فرم تزریقی آموتریپسین ب، داروهای خوراکی ضد دیابت، گلیکوزیدهای دیژیتال، دیورتیک ها، داروهای القا کننده آنزیم کبدی، منابع پتاسیم، داروهای حاوی سدیم، هورمون رشد انسانی، واکسن ها و فرآورده های حاوی الکل خودداری کنید.

– در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم و کالری و مصرف مکمل پتاسیم و پروتئین بیشتر مورد نیاز باشد.

– از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

– معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت به طور مرتب باید انجام شوند.

– پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است قطع تدریجی مصرف دارو لازم باشد.

– در صورت بروز عفونت ها یا ضایعات جدی باید احتیاط کرد.

– در صورتیکه در حین مصرف این دارو با افراد مبتلا به سرخک یا آبله مرغان مواجه شدید ممکن است اقدامات پیشگیرانه لازم باشد.

– جهت یکنواخت سازی سوسپانسیون بلافاصله قبل از تزریق

آمپول را به آرامی تکان دهید.

– این دارو ممکن است باعث اختلال در هوشیاری شود بنابراین در رانندگی یا کار با ماشین آلات می بایست احتیاطات لازم را رعایت کرد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول دارو به قرار زیر است:

داخل عضله: دوز اولیه ۶۰ میلی گرم به صورت عمیق داخل عضله گلوئتال تزریق می شود.

معمولاً دوزاًژ بین ۴۰ تا ۸۰ میلی گرم بسته به پاسخ دهی بیمار و طول درمان تنظیم می شود.

داخل مفصل، داخل سینوویوم و غلاف تاندون: برای مفاصل کوچک ۵-۲/۵ میلی گرم و برای مفاصل بزرگتر ۱۵-۵ میلی گرم تزریق می شود (در مجموع گاهی تا ۴۰ میلی گرم نیز تزریق می شود). در کودکان: دوز این دارو در کودکان بر اساس وزن و سطح بدن آنها طبق نظر پزشک محاسبه می گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.

کاهش اشتها، سوء هاضمه، عصبانیت، بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، سرگیجه، برافروختگی، سردرد، افزایش درد مفاصل، افزایش تعریق، گیجی و افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت از جمله عوارض این دارو می باشد.

همچنین به دنبال مصرف دراز مدت آن عوارضی همچون درد شکم و معده، آکنه، مدفوع خون آلود، ضربان نامنظم قلب، اختلالات قاعدگی، خستگی و ضعف غیر معمول، استفراغ، کاهش یا اختلال در دید و تکرر ادرار مشاهده شده است.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

– دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

– از مصرف داروی تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۱۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PD11-02/ 03

تاموکسیفن (نولوامون ۱۰ و ۲۰)

Nolvamun 10 & 20

Tamoxifen

F.C. Tablet

نولوامون ۱۰ و ۲۰

تاموکسیفن

قرص روکش دار

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- وجود هر نوع حساسیت به تاموکسیفن
- در صورت بارداری و شیردهی
- در صورت داشتن سابقه ابتلا به بیماری‌هایی نظیر کاتاراکت و یا دیگر مشکلات چشمی، اختلالات کبدی، سابقه حملات قلبی و تشکیل لخته‌های خونی در عروق و بدخیمی‌های رحمی
نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:
- دارو را بیشتر یا کمتر از مقدار تجویز شده مصرف ننمایید.
- پس از مصرف دارو احتمال بروز تهوع و استفراغ وجود دارد، ولی درمان را با وجود دل‌آشوبه ادامه دهید. اگر استفراغ با فاصله کمی پس از مصرف دارو بروز کرد به پزشک اطلاع دهید.
- اگر مصرف یک دوز را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید ولی در صورتی که زمان به یاد آوردن شما هم‌زمان با مصرف دوز بعدی بود فقط یک دوز این دارو را مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوز خودداری نموده و بقیه را مطابق با برنامه مصرف نمایید.
- روش‌های جلوگیری از بارداری غیر هورمونی در طول درمان با دارو و به مدت ۲ ماه پس از درمان باید مورد استفاده قرار گیرد. در صورت مشکوک شدن به بارداری فوراً به پزشک اطلاع دهید.
- در صورت بروز هایپرکلسمی شدید، مصرف این دارو باید قطع گردد.
- در حین مصرف دارو آزمایش‌های شمارش کامل سلول‌های خونی و بررسی عملکرد کبد باید انجام گیرد.
- در صورت بروز هر یک از علائم زیر به پزشک مراجعه نمایید:
- احساس تشکیل غده جدید در سینه
- خونریزی واژینال
- تغییرات در سیکل ماهانه
- کوتاه شدن تنفس
- درد ناگهانی سینه
- سرفه به همراه خون
- تغییرات در بینایی
- در صورت مصرف داروهایی مانند بروموکریپتین، آمینوگلوتماید، مدرکسی پروژسترون و داروهای طولانی‌کننده موج QT مثل آمیودارون، لتروزول، فنوباریتال، ریفامپین و کینیدین با پزشک خود مشورت نمایید.
موارد منع مصرف دارو:
- حساسیت به دارو و اجزای فرمولاسیون
- تجویز داروی تاموکسیفن جهت پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه در زنان دارای ریسک بالای ابتلا به سرطان سینه که مبتلا به ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) و آمبولی ریه نیز هستند و یا داروهای آنتی‌کوآگولانت کومارینی مصرف می‌نمایند ممنوع است.
مقدار مصرف دارو:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، ولی مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر می‌باشد:
سرطان سینه: ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم روزانه
DCIS (Ductal Carcinoma In Situ): ۲۰ میلی گرم در روز به مدت ۵ سال
- برای کاهش احتمال بروز سرطان سینه در خانم‌هایی که دارای ریسک بالای ابتلا به سرطان سینه (High-risk) هستند: ۲۰ میلی گرم روزانه به مدت ۵ سال
- تحریک تخمک‌گذاری: ۲۰ میلی گرم در روز، در روزهای دوم، سوم، چهارم، پنجم قاعدگی مصرف می‌شود. در صورت لزوم در دوره‌های بعدی درمان، مقدار مصرف روزانه را می‌توان به ۴۰ و سپس به ۸۰ میلی گرم افزایش داد.
مصرف در شیردهی:
به دلیل اینکه مصرف تاموکسیفن ممکن است باعث ایجاد عوارض جانبی جدی در شیرخوار شود از مصرف این دارو در هنگام شیردهی اجتناب نمایید.
مصرف در بارداری:
مصرف تاموکسیفن در دوران بارداری توصیه نمی‌شود چون با مطالعات بر روی حیوانات آزمایشگاهی عوارضی چون سقط، نقص و یا مرگ جنین مشاهده گردیده است.
عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:
اریتم مولتی فرم، سندرم استیوینس جانسون، گیجی، سمیت کبدی، اختلالات چشمی، آمبولی ریوی، ضعف و خواب‌آلودگی، سردرد، تهوع، استفراغ، راش پوستی، خشکی پوست، دردهای استخوانی، تاز شدن مو و کاهش تنبلی مو.
فقط در زنان:
آلرژی، ترومبوز وریدهای عمقی، هایپرپلازی رحم، پولیپ‌های رحم، سرطان رحم، عفونت، اختلالات قاعدگی، آمنوره، گرگرفتگی، کاهش وزن، تهوع و خونریزی رحمی، ترشحات غیر معمول واژینال، کرامپ‌های شکمی، بی‌اشتهایی، یبوست، خارش واژن، افسردگی، ادم، خستگی، درد عضلانی، سرفه، کیست تخمدان و ترومبوسیتوپنی.
فقط در مردان:
به ندرت کاهش میل جنسی مشاهده می‌شود.
شرایط نگهداری:
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته اجتناب نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



BRC/P-SG22-01/07

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران
تلفن سمدی مشتری: ۰۲۱-۳۵۸۱۷۰۵۵۱۴۴۹ داخلی ۳۵۸

تستوسترون انانتات ۱۰۰ و ۲۵۰ (آندوزیکس-آی اچ)

مصرف انسولین مورد نیاز می باشد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف این دارو و طول درمان به سن، جنس، نوع بیماری، پاسخ درمانی بیمار و عوارض جانبی بروز یافته بستگی دارد. به طور معمول استفاده از مقادیر بالاتر از ۴۰۰ میلی گرم در یک ماه، به دلیل طولانی اثر بودن دارو و ماندگاری آن در بدن توصیه نمی شود. قبل از تزریق، آمپول را به آرامی بین کف دو دست چرخانیده و گرم نمایید تا کریستال های تشکیل شده در اثر نگهداری در دمای پایین حل شود و سپس به صورت عضلانی عمیق و آهسته در عضله گلوئیتال تزریق نمایید.

- از تزریق ویدی دارو خودداری نمایید.

- استفاده از سر سوزن و سرنگ مرطوب سبب کدر شدن محصول روغنی می گردد که البته تغییری در اثر بخشی دارو ایجاد نمی کند.

مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

در هورمون تراپی مردانه: ۵۰ تا ۴۰۰ میلی گرم هر ۲ تا ۴ هفته یک بار
در کودکان: جهت بلوغ دیررس پسران: ۵۰ تا ۲۰۰ میلی گرم هر ۲ تا ۴ هفته یک بار و برای دوره محدود (۴ تا ۶ ماه)

در سرطان پستان متاستاتیک زنان: ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم هر ۲ تا ۴ هفته یک بار تزریق می شود و بیمار به طور مرتب پایش می شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید.

نکته: تجارب نشان داده است علایمی مانند تحریک سرفه و سختی تنفس در صورت تزریق سریع فرآورده های روغنی بیشتر دیده می شوند.

عوارضی که نیاز به توجه بیشتری دارند و باید سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید:

آمنوره و قاعدگی نامنظم، آکنه، کاهش سایز پستان، بزرگ شدن آلت تناسلی، خشونت و گرفتگی صدا، الگوهای طاسی موی مردانه، پوست چرب و افزایش رویش مو در صورت و بدن در زنان، عفونت ادراری، تکرر ادرار، بزرگ شدن سایز پستان، ارگشن (راست شدن) ناخواسته، دردناک و طولانی مدت آلت تناسلی و کاهش تعداد اسپرم در مایع منی در مردان شایع است.

سایر عوارض جانبی:

افزایش یا کاهش تمایلات جنسی، احتباس مایعات در بدن مانند تورم در پاها و زانوها، استرس و اضطراب، افسردگی، سردرد، مور مور شدن، ضعف و خستگی، زرد شدن پوست و چشم ناشی از اختلالات کبدی، مشکلات گوارشی (تهوع و استفراغ)، افزایش کلسترول خون و مهار فاکتورهای انعقادی (خونریزی غیر طبیعی)، التهاب و درد در محل تزریق و واکنش های آنافیلاکسی، خونریزی گوارشی و هایپرپلازی خوش خیم پروستات در مردان می باشد. در صورت بروز عوارض دیگر می توانید با پزشک و یا داروساز خود تماس بگیرید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران
تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۴۴۴ داخلی ۳۵۸



تستوسترون انانتات ۱۰۰ و ۲۵۰ Testosterone Enanthate 100 & 250

Andozix-IH

Injectable Solution

آندوزیکس-آی اچ

محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا در درمان موارد مشابه و یا توصیه به دیگران جداً خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو، وجود هر یک از موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:

- سابقه حساسیت به این دارو و یا سایر داروها، مواد جانبی داروها، غذاها و رنگ ها.
- ابتلا به سرطان پروستات و هایپرپلازی پروستات، سرطان پستان مردان، اختلالات کلیوی، نارسایی قلبی و سابقه انفارکتوس میوکارد.
- ابتلا به تومورهای کبدی و یا سابقه قبلی آن.
- در صورت مصرف سایر داروها به خصوص ضد انعقادها و داروهای هیپوتوکسیک به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

- بارداری
- مردان مبتلا به سرطان پروستات و پستان
- استفاده از هورمون مردانه تستوسترون برای افزایش حجم عضلات و افزایش کارایی فیزیکی، در افراد سالم اکیداً ممنوع بوده و می تواند پیامدهای خطرناک و غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد.

مصرف در بارداری:

- مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در شیردهی:

- از آنجایی که در ارتباط با ورود آندروژن ها به شیر مادر اطلاعات دقیق در دسترس نیست، لذا مصرف دارو در دوران شیردهی توصیه نمی گردد و در صورت لزوم مصرف دارو، شیردهی می بایست متوقف شود.

احتیاط مصرف:

- استفاده طولانی مدت از این دارو ممکن است سبب بروز اختلالات افزایشی در تعداد گلبول های قرمز خون شود، بنابراین در طی درمان با این دارو انجام آزمایشات خون توصیه می شود.
- این دارو می تواند سرعت رشد تومورهای پروستات موجود را افزایش داده و سبب هایپرپلازی پروستات به خصوص در سالمندان شود. به همین جهت توصیه می شود قبل از شروع درمان، تست های پروستات توسط پزشک انجام شده و در حین درمان نیز سلامت پروستات بیمار کنترل شود.
- مصرف طولانی مدت با دوز بالای این دارو سبب مشکلات شدید مانند تومور کبدی، هیپاتیت کلستاتیک و زردی می گردد.

قبل از تجویز دارو در پسران به منظور درمان بلوغ دیررس، در ارتباط با عارضه جانبی دارو بر روی بلوغ استخوانی با والدین بیمار مذاکره نمایید و همچنین پایش بلوغ استخوان از طریق تعیین سن استخوان دست و مچ دست توسط X-Ray هر ۶ ماه یک بار می بایست انجام شود.

- در بیماران مبتلا به سرطان پستان، درمان با آندروژن سبب افزایش سطح کلسیم از طریق تحریک لیز استخوانی می گردد که در این صورت می بایست دارو قطع شده و پایش سطح کلسیم ادرار و خون به طور مرتب انجام شود.

- روم به علت احتباس آب و سدیم پس از مصرف، یکی از شکایات اصلی بیمارانی است که سابقه ابتلا به بیماری های کبدی، کلیوی و قلبی را دارند که در این افراد می بایست علاوه بر قطع دارو، درمان با دیورتیک ها نیز انجام شود.

- توصیه می شود بررسی دوره ای عملکرد کبد و اندازه گیری سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات، کلسترول و HDL طی درمان با دارو انجام شود.

- در بیماران مبتلا به دیابت، تستوسترون سبب تغییر در سطح گلوکز خون می گردد. لذا تنظیم مقدار

تراکوزاکتاید ال.آ. (سیناکران)

Tetracosactide L.A. Synacran Injectable Suspension

تراکوزاکتاید ال.آ. سیناکران

سوسپانسیون تزریقی
موارد مصرف دارو:

این دارو یک استروئید آدرنوکورتیکال است و در موارد متعددی توسط پزشک تجویز و عضلانی تزریق می شود.
راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:
این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو، وجود هر یک از موارد زیر را به پزشک خود اطلاع دهید:
- سابقه هر نوع حساسیت به این دارو و یا سایر داروها، مواد جانبی داروها، غذاها، رنگ ها و مواد نگهدارنده.
- در صورتی که اخیراً واکنس تزریق کرده باشید و یا در صورت ابتلا به بیماری های ویروسی و یا سایر عفونت ها.
- اگر هر یک از شرایط زیر را دارید، در اسرع وقت پزشک معالج خود را مطلع سازید:

بیماری های شدید قلبی، زخم های فعال گوارشی، دیابت، آسم، پرفشاری خون، مشکلات کلیوی، التهاب گوارشی مانند کولیت، جراحی اخیر روده ای، حوادث ترومبوتیک اخیر، پوکی استخوان، میاستنی گراوایس، عفونت های آمیبی، کم کاری غده تیروئید، سیروز کبدی، سل، عفونت های ویروسی چشمی و صرع.
- در صورت سابقه بیماری های روانی و سایکوز حاد و یا در صورت بروز تغییرات رفتاری و افسردگی حین مصرف دارو مراتب را سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.
- در طی مصرف این دارو از انجام واکسیناسیون بدون نظر پزشک معالج خودداری نمایید.
- تا زمان مشخص شدن تاثیرات مصرف دارو بر بدن شما، از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند اجتناب نمایید.
- در صورت وقوع حاملگی سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید.
- بیماران دیابتی که انسولین مصرف می کنند، در حین مصرف این دارو باید قند خون خود را مرتب کنترل کنند. شاید نیاز باشد مقدار انسولین دریافتی آنها افزایش یابد.
- اثر دارو بر الکترولیت های بدن را می توان با رژیم های حاوی سدیم کم و پتاسیم زیاد کنترل نمود.
- در بیماران با سابقه آلرژی و آسم ممکن است واکنش های شدید حساسیتی ایجاد شود که معمولاً در ۳۰ دقیقه بعد از تزریق دارو اتفاق می افتد. بنابراین در طی این مدت باید مراقبت های پزشکی برای کنترل واکنش های حساسیتی احتمالی انجام شود.

موارد منع مصرف:

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو و یا به ACTH .
- در بیماران مبتلا به کوشینگ.
- این دارو در نوزادان نارس و تازه متولد شده به دلیل وجود بنزیل الکل در فرمولاسیون دارو منع مصرف دارد.
مصرف در بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران حاملگی به دلیل احتمال بروز آثار منفی بر رشد جنین و یا سقط جنین توصیه نمی شود و در صورت ضرورت و با کنترل و ارزیابی فواید دارو به مضرات آن تجویز می شود.
- در دوران شیردهی مصرف این دارو به دلیل نبودن اطلاعات کافی در مورد سلامت مصرف آن در این دوران، توصیه نمی شود و در صورت ضرورت و با ارزیابی فواید مصرف دارو به مضرات احتمالی آن پلایمانع است.

احتیاط مصرف:

در کودکان تا سن ۳ سالگی به دلیل وجود بنزیل الکل در فرمولاسیون دارو، مصرف آن باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید و باید در مصرف دارو احتیاط شود:

- احساس هر گونه درد در معده که ممکن است همراه با استفراغ و تهوع باشد.
- احساس درد در طی حرکت غذا از گلو به معده.
- بروز تشنج و یا درد در چشم و یا بروز مشکلات بینایی و یا درد در قفسه سینه.
- سردرد های شدید و ناگهانی و عدم تعادل در گفتار و حرکت.
- کوتاه شدن تنفس و تورم در صورت و لب و زبان و یا سایر بخش های بدن.
- دشواری در دفع ادرار.
- تغییرات شدید و ناگهانی خلقی.

مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر می باشد:

بزرگسالان: شروع درمان با یک میلی گرم عضلانی و روزانه آغاز می شود و در موارد حاد می توان هر ۱۲ ساعت یک میلی گرم تزریق نمود. بعد از فروکش کردن مراحل حاد، مصرف معمول دارو به یک میلی گرم عضلانی هر ۲ یا ۳ روز یک بار و حتی مقادیر کمتر تا ۰/۵ میلی گرم هر ۲ یا ۳ روز و یا یک میلی گرم هر هفته، کاهش می یابد.

کودکان کمتر از ۳ سال: به دلیل وجود بنزیل الکل در فرمولاسیون دارو مصرف دارو باید زیر نظر پزشک معالج صورت گیرد.

کودکان ۳ تا ۵ سال: شروع درمان با ۰/۲۵ تا ۰/۵ میلی گرم عضلانی روزانه آغاز شده و می تواند به همین مقدار دوز نگهدارنده هر ۲ تا ۸ روز ادامه پیدا کند.
کودکان ۵ تا ۱۲ سال: شروع درمان با ۰/۲۵ تا یک میلی گرم عضلانی روزانه آغاز شده و می تواند به همین مقدار دوز نگهدارنده هر ۲ تا ۸ روز ادامه پیدا کند.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک و یا داروساز مشورت نمایید:

عوارضی که نیاز به توجهات پزشکی دارند مثل: واکنش های حساسیتی (سرگیجه یا منگی، تحریک پذیری، از حال رفتن، حملات تشنجی، بثورات جلدی، اشکال در تنفس، ضریان آهسته و یا غیر عادی قلب، کهیر، تورم لب و زبان و یا سایر بخش های بدن). عوارضی که در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند:

تب، تهوع و استفراغ، قهرزی و یا درد در محل تزریق، خارش پوست، سردرد، خس خس سینه، دردهای گوارشی، مشکلات ادراری، درد چشم و مشکلات بینایی. در صورت بروز عوارض دیگر می توانید با پزشک خود، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

مسمومیت:

در صورت مصرف مقادیر زیاد این دارو علائم سندرم شبه کوشینگ، کاهش تحمل به گلوکز، کاهش پروتئین، برهم خوردن تعادل الکترولیتی، کاهش پتاسیم، ناراحتی های روانی و پوکی استخوان مشاهده می شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، داخل جعبه و درون یخچال (در دمای بین ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد) نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن سمدی مشتری: ۰۱۷-۵۵۱۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



دروسیرون + اتینیل استرادیول (کنتراسمین)

کنتراسمین

Drospirenone 3/ Ethinyl Estradiol 0.03

F.C. Tablet

دروسیرون ۳ / اتینیل استرادیول ۰/۰۳

قرص روکش دار

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو: این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– وجود هر نوع آلرژی به استروژن‌ها، پروژسترون‌ها و مواد دیگر از قبیل غذا، رنگ‌ها و مواد محافظ.
– در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر: سرطان پستان و رحم، نارسایی قلبی، بیماری‌های عروق مغزی به خصوص در افراد سیگاری، اختلالات عروق کرونر، نئوپلازی وابسته به استروژن، بیماری‌های کلسیاتیک کبدی، تومور کبدی، هایپرکالمی، ترومبوفیلیت، ترمبوز، ترومبوامبولی، خونریزی رحمی، دیابت، سردرد با علایم عصبی فوکانال، نارسایی کلیه و غده آدرنال، هایپرپرولاکتیمی، افسردگی، بیماری گوارشی کرون، آتمی سلول داسی شکل و افراد بالای ۳۵ سال.
– در صورت مصرف داروهایی مانند مهارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آتریوتانسین، بلاک کننده گیرنده آتریوتانسین II، کاربامازپین، سیکلوسپورین، گریزئوفلووین، فنوباربیتال، فنی تونین، ریگامین، لاموتریزین، ایزوترتینوین، تنوفیلین، دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم مانند اسپرونولکتون، مکمل‌های حاوی پتاسیم، ضد التهاب‌های غیر استروئیدی، هپارین، آنتی کواگولانت‌ها، اکزستان، فلوکونازول، باربیتورات‌ها و در صورت استفاده از تنباکو.
– بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– در اولین دوره مصرف این دارو در ۷ روز اول از یک روش جلوگیری دیگر هم استفاده نمایید. برخی از متخصصین عقیده دارند که بهتر است طی اولین دوره مصرف این دارو (۲۱ روز) از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
– دارو را در ساعت معین و ترجیحاً پس از شام یا هنگام خواب میل نمایید.
– سعی کنید جهت کاهش عوارض جانبی و افزایش اثر دارو، فواصل مصرف دارو بیش از ۲۴ ساعت نباشد.
– این دارو در برخی از افراد ممکن است حساسیت به نور ایجاد نماید، لذا توصیه می‌شود در طول مصرف دارو از ضدآفتاب استفاده شود.
– در صورت مشکوک شدن به بارداری مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.
– به طور منظم هر ۶ ماه تا یک سال به پزشک مراجعه نمایید.
– در صورت نیاز به انجام تست‌های آزمایشگاهی پزشک مربوطه را از مصرف قرص ضد بارداری مطلع سازید.
– مصرف این دارو هیچگونه اثر محافظتی در مقابل بیماری‌های آمیزشی نظیر HIV ندارد.
– در زمان مصرف این دارو از استعمال دخانیات خودداری کنید.
– در زمان مصرف این دارو از قرار گرفتن زیاد در معرض نور مستقیم آفتاب و یا لامپ‌های الکتریکی خودداری کنید.
– مقدار مصرف دارو: مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
این دارو به منظور جلوگیری از بارداری به صورت رژیم ۲۱ روزه مصرف می‌شود. بدین ترتیب که یک قرص از روز اول قاعدگی مصرف می‌شود. پس از ۲۱ روز به مدت ۷ روز مصرف قرص قطع می‌گردد و در روز هشتم بدون توجه به اینکه خونریزی قاعدگی قطع شده باشد یا خیر، مجدداً رژیم ۲۱ روزه بعدی شروع می‌شود.
– اگر مصرف یک قرص را فراموش کردید به محض یادآوری آن را مصرف نموده و سپس دوز بعدی را در وقت مقرر مصرف نمایید. در این صورت ممکن است در یک روز ۲ قرص را با هم مصرف نمایید و بقیه قرص‌ها را طبق روال معمول ادامه دهید.
– اگر مصرف دو قرص در دو روز متوالی را در هفته اول یا دوم دوره پیشگیری فراموش نمودید، به محض به یادآوردن، در دو روز متوالی بعد، روزی دو قرص مصرف نمایید و بقیه قرص‌ها را طبق روال معمول ادامه دهید و در ۷ روز بعدی از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری استفاده نمایید.
– اگر مصرف دو قرص متوالی را در هفته سوم و یا سه قرص متوالی را در هر زمانی از دوره مصرف فراموش نمودید، بسته قبلی قرص را دور انداخته و یک دوره مصرف جدید را شروع نمایید و همچنین تا ۷ روز بعد، از یک روش دیگر جلوگیری استفاده نمایید. ممکن است در این ماه خونریزی نداشته باشید ولی اگر در دو ماه متوالی قاعدگی رخ نداد با پزشک معالج مشورت نمایید.
– در سایر موارد با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:
خونریزی مغزی، بیماری‌های کبدی، انفارکتوس میوکارد، آمبولی ریوی (درد سینه، لرز، تشنج، سرفه، درد شکم و پشت، بی‌حسی سر انگشتان، وزوز گوش)، ترومبوامبولی و ترومبوز (درد شکمی، سرفه خونی شدید، سردرد، تنگی نفس، تغییر بیثباتی و ...)، ترومبوفیلیت، بی‌نظمی در خونریزی قاعدگی، خونریزی میان قاعدگی، لکه بینی، سردرد، میگرن، هایپرانتسینوز، واژینیت، تومور پستان، هایپرپلازی کبدی، هیپاتیت، کازسینوم هیپاتوسلولار و بدتر شدن افسردگی.
عوارضی که در صورت تداوم و یا بدتر شدن باید به پزشک مراجعه نمود: کرامپ شکمی، نفخ، تورم و حساس شدن پستان، تغییر در ترشحات رحمی، اختلال در بینایی، یرقان کلسیاتیک، سرگیجه، ناباروری پس از قطع دارو، عدم تحمل لنزهای تماسی، احتباس آب و نمک، افزایش یا کاهش موهای بدن و صورت، تغییر در میل جنسی، لک‌های پوستی و افزایش یا کاهش وزن.
همچنین ترومبوز عروق شبکیه، کاتاراکت، پورفیری، تغییر در متابولیسم کربوهیدرات و چربی و سینوزیت از دیگر عوارض این دارو می‌باشد.

مصرف در دوران بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در دوران شیردهی: این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود و می‌تواند عوارضی مانند بزرگ شدن پستان را بر روی شیرخوار نشان دهد بنابراین بهتر است در زمان شیردهی مصرف نشود.

شرایط نگهداری دارو:

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.



تلفن مدای مشتری: ۱۹-۰۵۱۷۴۴۹۵۵ داخلی ۳۵۸

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

داینوزست (اندورین - آی اچ)

اندورین - آی اچ داینوزست قرص خط دار خوراکی حاوی ۲ میلی گرم داینوزست

پیش از شروع مصرف اندورین - آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

اندورین - آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود:

قرص اندورین - آی اچ (آی-ان-دورین-آی-اچ) حاوی ماده موثره داینوزست با میزان ۲ میلی گرم می باشد و به گروه دارویی پروروستین ها تعلق دارد.

اندورین - آی اچ برای درمان علیم دردناک اندومتروز استفاده می شود.

آنچه باید پیش از مصرف اندورین - آی اچ بدانید:

اندورین - آی اچ برای بیماری قلبی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علیم شبیه با شما را دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید:

- اگر به داینوزست یا سایر ترکیبات فرمولاسیون حساسیت دارید.
- در صورت ابتلا به خونریزی غیر طبیعی تشخیص داده نشده وازیتال، بیماری فعال ترومبوآمبولی وریدی (ایجاد لخته در رگ ها)، سابقه و یا ابتلا به بیماری های شریانی و قلبی - عروقی (مانند سکته قلبی، سکته مغزی)، دیابت ملیتوس همراه با درگیری عروقی، سابقه و یا ابتلا به بیماری شدید کبدی در حالی که آزمایش های کبدی غیر طبیعی می باشد، سابقه و یا ابتلا به نئوپلازی کبدی (خوش خیم یا بدخیم)، وجود و یا شک به وجود بدخیمی های وابسته به هورمون جنسی، شایعه های چشمی ناشی از بیماری های عروقی چشم مانند از دست دادن تپسی یا کامل بینایی یا نقص در میدان دید، سابقه و یا ابتلا به میگرن همراه با فوکل اورا، شیردهی، بارداری و یا شک به بارداری.

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

- اندورین - آی اچ در دوران قبل از قاعدگی (قبل از باغ)، در سالمندان و به عنوان داروی ضد بارداری مورد مصرف ندارد.
- مصرف این دارو در بعضی از زنان با خونریزی های نامنظم قاعدگی (همانند آمنوره، خونریزی های مکرر یا غیر مکرر، خونریزی های طولانی مدت) همراه بوده و ممکن است در برخی زنان (برای مثال زنان مبتلا به فیبروزید) تشدید شود. معمولاً با گذشت زمان کاهش شدت الگوهای خونریزی مشاهده می شود. در صورتی که خونریزی های نامنظم با مصرف طولانی مدت ادامه یابد یا با سستی تدابیر تشخیصی مناسب (مانند نمونه برداری از اندومتر و سونوگرافی لگنی) جهت رد نمودن پاتالوژی اندومتر صورت پذیرد.
- در صورت خونریزی شدید طولانی مدت در طول درمان، بایستی مصرف دارو قطع شود.
- در برخی مطالعات درمان با پروروستین ها به تنهایی همراه با ریسک کم ترومبوآمبولیسم وریدی بوده است، بنابراین در طول درمان با این دارو در صورت مشاهده علیم و یا شک به وجود عارضه ترومبوپتیک، مصرف آن بایستی فوراً قطع گردد.
- معاینات منظم پستان در طول درمان توصیه می شود. کیست های تخمدانی مقاوم که اغلب بدون علامت می باشند ممکن است در طول درمان ایجاد گردند.
- مصرف این دارو با کاهش متوسط در سطح استروژن اندوزن همراه است.
- در زنان مبتلا به دیابت یا افسردگی بایستی با احتیاط مصرف شود.
- در بیماران که سابقه پرقان گلیستاتیک را طی دوران بارداری یا حین مصرف استروئیدهای جنسی داشته اند، در صورت بروز مجدد پرقان گلیستاتیک حین مصرف بایستی دارو قطع گردد.
- مصرف این دارو در بیماران با عدم تحرک طولانی مدت و نیز حداقل چهار هفته قبل از جراحی الکتیو باید متوقف شود و ادامه درمان بایستی دو هفته بعد از تحرک مجدد آغاز گردد.
- در طول درمان با این دارو خطر سکته در زنان مبتلا به فشار خون بالا ممکن است افزایش یابد. در صورت مشاهده افزایش قابل توجه فشار خون، مصرف دارو بایستی قطع گردد.
- خطر عوارض قلبی - عروقی در زنان سیگاری حین مصرف این دارو افزایش می یابد، لذا توصیه می شود در طول دوره درمان از مصرف سیگار خودداری گردد.
- مصرف پروروستین ها ممکن است با جراحات عروق شکمیه چشم همراه باشد بنابراین طی معاینات در صورت بروز مواردی از قبیل بیرون زدگی ناگهانی چشم، دوبینی و تشدید میگرن، درمان باید متوقف گردد.
- زنان با سابقه کلوآسما (ایجاد لکه های رنگی روی پوست در دوران بارداری) حین مصرف این دارو بایستی از قرارگرفتن در نور آفتاب یا تابش فرابنفش اجتناب کنند.
- در بیماران با سابقه خارش پوستی در طول دوران بارداری و یا به دلیل استفاده از استروئیدهای جنسی، در صورت عود خارش حین درمان بایستی مصرف این دارو قطع گردد.
- استفاده از ضد بارداری های هورمونی در طول دوره درمان با داینوزست توصیه نمی شود و بایستی از روش های جلوگیری از بارداری غیر هورمونی (فیزیکی) استفاده شود.
- اغلب در طول درمان با داینوزست تخمک گذاری مهار می شود اگرچه قاعدگی طبیعی معمولاً دو ماه پس از قطع مصرف دارو آغاز می گردد.
- خطر ترومبوآمبولیسم ممکن است بلافاصله پس از زایمان افزایش یابد.

اندورین - آی اچ را چگونه مصرف کنید:

- مقدار مصرف دارو شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.
- چه مقدار مصرف کنید: ۲ میلی گرم (یک قرص) یک بار در روز.
- تنظیم دوز در اختلالات کبدی:
اختلالات خفیف تا متوسط: تنظیم دوز توسط منابع معتبر اعلام نشده است.
اختلالات شدید: در بیماران با سابقه و یا مبتلا به بیماری شدید کبدی منع مصرف دارد.
- چطور مصرف کنید: قرص را به طور کامل یا یک لیوان آب بپوشید.

چه زمانی مصرف کنید: این دارو می تواند قبل یا بعد از غذا مصرف شود.

برای چه مدت مصرف کنید: مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

اثر بخشی اندورین - آی اچ ممکن است در صورت عدم مصرف یک دوز یا به دلیل استراغ و اسهال (اگر طی ۳ تا ۴ ساعت پس از مصرف رخ دهد) کاهش یابد. بلافاصله پس از به یاد آوردن فقط یک قرص مصرف کنید سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیردهی:

- مصرف این دارو در دوران بارداری و یا در صورت شک به بارداری ممنوع می باشد.

- قبل از شروع درمان بایستی احتمال بارداری رد شود.

- اطلاعاتی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر موجود نمی باشد.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

- در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
- از استفاده هم زمان اندورین - آی اچ با الکا کتنده های قوی سیستم آنزیمی CYP3A4، مانند گریزنوفلووین، ترانکزامیک اسید و بولی پرستال پریمز نامید.
- اندورین - آی اچ ممکن است اثر یا سطح داروهای بنزدیابازین، سلازین و وریکونازول را افزایش دهد.
- سطح فنی و یا اثر اندورین - آی اچ ممکن است با سطح داروهای زیر کاهش یابد:
CYP3A4، میفپریستون، وریکونازول و گیاهان با خصوصیات پروتستونیک افزایش یابد.
- اندورین - آی اچ ممکن است اثر ضد انعقادها و آنتاگونیست های ویتامین K را کاهش دهد.
- اثر یا سطح اندورین - آی اچ ممکن است با داروهای زیر کاهش یابد:
آسیترین، آمینوگلوکوتیمید، اپریپانتات، آرتمتر، باریتورات ها، بکساروتن (سیستمیک)، ترکیبات ایجاد کننده کمپلکس با اسیدهای صفراوی، بوستان، کاربامازپین، کلوزاپام، الکا کتنده های قوی سیستم آنزیمی CYP3A4، دایرافنیل، دفراسیروکس، اسلی کاربازپین، فلیامات، فوس فنوتین، فوس فنی توین، لاهورتزین، میفپریستون، مایکوفنولات، نلفیناپور، نیویراپین، اکس کاربازپین، پرامیائل، فنی توین، پریمیدون، پروکالوپرابند، مشتقات ریتونوویک اسید، مشتقات ریفامپاسین، علف چای، سوگامادکس، تلایرور، توسیلیزومب، توپیرامات.

عوارض جانبی احتمالی مصرف اندورین - آی اچ چه می باشد:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر گونه عارضه به خصوص عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
- افسردگی، سردرد، تحریک پذیری، میگرن، اختلالات خواب، عصبانیت، آکنه، آلوپسی، احساس درد در پستان، کاهش میل جنسی، کیست تخمدان، دردهای شکمی، تهوع، افزایش وزن، خونریزی وازیتال، ضعف.
- عوارض نادر ولی مهم یا تهدید کننده حیات:
دردهای شکمی، آتمی، اضطراب، افزایش اشتها، اختلال توجه، عدم تعادل سیستم اعصاب خود مختار، کمر درد، درد استخوان، سفتی پستان، توده پستان، اختلال گردش خون، یبوست، درماتیت، اسهال، خستگی چشم، خستگی پوست، ادم، بیماری فیبروکیستیک پستان، نفخ شکم، ترشحات وازیتال، التهاب دستگاه گوارش، عدم تحمل گلوکز، درد اندام های انتهایی، گرگرفتگی، تغییرات خلق و خو، اسپاسم عضلانی، اونیکوالیزیس، تپش قلب، درد لگن، حساسیت به نور، اختلالات پیگمانتاسیون، خارش پوست، وزوز گوش، عفونت مجاری ادراری، کاندیدای وازیتال، استراغ، خشکی دهانه واژن.

آیا می دانید در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقا، گزارش دهنی عوارض دارویی تهیه شده است.)

اندورین - آی اچ چگونه نگهداری می شود:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- در طول مدتی که قرص های خود را مصرف می کنید آنها را در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.

- از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری کنید.

توسیف محصول:

شکل ظاهری اندورین - آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص اندورین - آی اچ به صورت سفید، گرد، تخت و خط دار می باشد که در جعبه های ۳۰ عددی (حاوی ۳۳ بلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه با برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده: اندورین - آی اچ محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.

کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۶۷، تهران، ایران

تلفن مدای مشتری ۰۹۵۵۱۷۰۰۲۱۴۴۹۰۲ داخلی ۳۵۸

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۰/۰۳/۱۷



BRC P-SJ84-03 01

آمپول دکزامتازون سدیم فسفات (دکامزون)

دکزامتازون

(۸ میلی گرم در ۲ میلی لیتر)

دکامزون

آمپول

Dexamethasone

(8mg / 2ml)

Decameson

Ampoule

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– وجود هر نوع حساسیت به کورتیکوئیدها یا آدرنوکورتیکوئیدها و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگها.

– در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر ایدز، عفونت های قارچی سیستمیک، عفونت های ویروسی و باکتریایی، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری های قلبی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری های کبدی و کلیوی، دیابت، میاستنی گراویس، استنوپروز، سل، سایکوز، کم کاری یا پر کاری تیروئید، فشار خون بالا، لوپوس اریتماتوز سیستمیک.

– در صورت حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان این دارو با داروهای نظیر فرم تزریقی آمفوتریسین ب، داروهای ضد دیابت، گلیکوزیدهای دیژیتال، دیورتیک ها، داروهای القا کننده و مهار کننده آنزیم کبدی، منابع پتاسیم، داروهای حاوی سدیم، هورمون رشد انسانی، واکسن ها و الکل، استامینوفن، ضدالتهاب های غیر استروئیدی، آسپرین، آمینوگلوکوتتامید، استروئیدهای آنابولیک، آندروژن ها، آنتی بیوتیک های ماکرولیدی، آنتی کولینرژیک ها و آنتی کولین استراژها، ضد انعقادها، ضد افسردگی ها سه حلقه ای، داروهای تیروئیدی، کنترااستپتوهای خوراکی، فولیک اسید، ایزونیازید، کتوکونازول، استازولامید، داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، ریتودرین، تالیدومید، میتوتان، مگزبالتین خودداری کنید.

– در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم و کالری و مصرف بیشتر مکمل پتاسیم و پروتئین مورد نیاز باشد.

– از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

– معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت بطور مرتب باید انجام شوند.

– پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است قطع تدریجی مصرف دارو لازم باشد.

– در صورت بروز عفونت ها یا ضایعات جدی باید احتیاط کرد.

– چنانچه در حین مصرف این دارو با افرادی که دچار سرخک یا آبله مرغان هستند مجاور شوید ممکن است اقدامات پیشگیرانه لازم باشد.

– این دارو ممکن است باعث اختلال در هوشیاری شود بنابراین در رانندگی یا کار با ماشین آلات می بایست احتیاط لازم را رعایت کرد.

مقدار مصرف دارو:

– دوز اژ عمومی در بزرگسالان:

۲/۶ تا ۶ میلی گرم به صورت داخل مفصلی، داخل ضایعه یا داخل بافت نرم تزریق می گردد.

در صورت نیاز می توان به فواصل ۳ روز تا ۳ هفته این دوز را تکرار کرد. جهت تزریق عضلانی یا وریدی

۹-۵/۵ میلی گرم در روز دکزامتازون قابل استفاده می باشد.

– ادم مغزی:

دوز اولیه ۱۰ میلی گرم به صورت تزریق وریدی می باشد سپس هر ۶ ساعت ۴ میلی گرم تزریق عضلانی صورت می گیرد تا زمانی که علائم فروکش نماید. دوز دارو را می توان پس از ۴-۲ روز کاهش داد و به تدریج طی دوره ۵ تا ۷ روزه آن را قطع نمود.

در ادم مغزی راجعه یا بیمارانی که تومور مغزی غیر قابل جراحی دارند از درمان کمکی استفاده می شود بدین ترتیب که ابتدا ۲ میلی گرم تا ۳ بار در روز به صورت عضلانی تجویز می گردد سپس براساس پاسخ بیمار دوزهای بعدی تنظیم می گردد.

– شوک:

ابتدا ۲۰ میلی گرم به صورت وریدی تزریق می گردد سپس ۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از طریق انفوزیون وریدی طی ۲۴ ساعت تجویز می شود.

– اختلالات آلرژیک: ابتدا ۸-۴ میلی گرم عضلانی تزریق می گردد سپس دوز نگهدارنده به صورت خوراکی تجویز می شود.

– تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی: ۲۰-۸ میلی گرم به صورت وریدی ۵ تا ۱۵ دقیقه قبل از شیمی درمانی تجویز می شود.

سپس درمان با قرص دکزامتازون پس از پروسه شیمی درمانی ادامه می یابد.

– پیشگیری از سندرم زجر تنفسی در نوزادان: ۵ میلی گرم هر ۱۲ ساعت تا ۴ دوز که به صورت عضلانی ۷ روز تا ۲۴ ساعت قبل از تاریخ تخمین زده شده برای زایمان تزریق می شود.

کودکان: دوز دارو براساس وزن و سطح بدن آنها طبق نظر پزشک محاسبه می گردد.

هشدار: این دارو حاوی متابی سولفیت سدیم می باشد و در افراد حساس بخصوص آسماتیک ممکن است باعث تشدید حمله آسم شود.

– رفیق سازی دارو جهت انفوزیون وریدی با محلول دکستروز یا سدیم کلراید تزریقی صورت می گیرد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.

افزایش اشتها، سوء هاضمه، عصبانیت، بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، سرگیجه، برافروختگی، توهم، سرخوشی، افسردگی، اختلالات مانیک – دپرسیو، سردرد، افزایش درد مفاصل، افزایش تعریق، منگی و افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت، آکنه، ضربان نامنظم قلب، اختلالات قاعدگی، خستگی و ضعف غیر معمول، استفراغ، اختلال یا کاهش دید، تکرر ادرار، درد و عفونت و آتروفری در محل تزریق، تشنج، نارسایی قلبی، ترومبوآمبولی، پانکراتیت، دیابت ملیتوس، واکنش های آلرژیک، سندرم کوشینگ، کاتاراکت، هیپوکالمی، افزایش فشار داخل جمجمه، پوکی استخوان، هایپرتانسیون، اختلالات گوارشی شامل زخم معده با علائمی مانند مدفوع خون آلود و درد شکم و معده، پوست نازک و شکننده، پارگی تاندون، احتیاس سدیم و مایعات، نکرور استخوان (آواسکولار) و سرکوب رشد کودکان.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته اجتناب کنید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن مدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۱۷۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/P-010-02/03

قرص دگزامتازون (دکامزون ۰/۵ و ۴)

Decamason 0.5 & 4

Dexamethasone

Scored Tablet

دکامزون ۰/۵ و ۴

دگزامتازون

قرص خطدار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- به منظور جلوگیری از ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع دارو چه با نسخه و چه بدون نسخه با پزشک معالجتان مشورت نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به کورتیکوئیدها یا آدرنوکورتیکوئیدها و موارد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگها.
- در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر:
آنتی اسیدها، باریتوراتها، گاربامازین، فنی توئین، ریفامپین، آنتی دیابتیکها، انسولین، دیورتیکها، سوماتروپین، گریزوفلوین، پرمیدون، آموکسیسیلین B و سیکلوسپورین.
- در صورت ابتلا به هر یک از بیماریهایی نظیر: ایدز، عفونت های قارچی، عفونت هرپس، سیمپلکس، ناراحتی های انگلی، سل، آبله مرغان، دیابت ملیتوس، زخم معده، گلوکوما، کولیت اولسراتیو، ناراحتی قلبی، افزایش فشار خون، اختلالات کبدی و کلیوی، افزایش کلسترول، استئوپوروزیس، میاستنی گراویس و لوپوس اریتماتوزیس.
- در صورت حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- برای به حداقل رساندن تحریکات گوارشی، این دارو را همراه غذا مصرف نمایید.
- مصرف هم زمان الکل ممکن است سبب افزایش اثرات اولسراتیک دارو گردد.
- از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.
- در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم و کالری و همچنین افزایش مصرف ماکمل پتاسیم و پروتئین نیاز باشد.
- پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است قطع تدریجی مصرف دارو لازم باشد.
- در افراد دیابتی ممکن است در میزان قند خون تاثیر بگذارد بنابراین باید در طی مصرف دارو، قند خون توسط پزشک معالج کنترل شود.
- معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت به طور مرتب باید انجام گیرد.
- در طول و پس از درمان به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
- در صورت بروز علائم بیماری پس از کاهش یا قطع مصرف دارو به پزشک خود مراجعه نمایید.
- از تماس با افرادی که دچار بیماری آبله مرغان و سرخک می باشند، اجتناب نمایید و در صورت تماس به پزشک خود اطلاع دهید.
- در حین درمان با این دارو، واکسیناسیون و سایر اقدامات ایمن سازی، تماس با افرادی که واکسن خوراکی فلج اطفال دریافت کرده اند و نیز افرادی که جراحی یا سایر درمان های اضطراری انجام داده اند باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
- در صورت بروز عفونت یا ضایعات جدی باید احتیاط کرد.

مصرف در بارداری:

مطالعات در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان ها انجام نگرفته است. در هر حال مطالعات بر روی حیوان ها نشان داده که کورتیکواستروئیدها باعث نقص در جنین می گردند.
مصرف در شیردهی:

کورتیکواستروئیدها به داخل شیر ترشح می شوند و ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در کودک گردند. با توجه به مقدار دارویی که هر روز مصرف می شود شاید لازم باشد دارو را عوض کرده یا در حین درمان شیردهی را متوقف کرد.

مصرف در کودکان:

کورتیکواستروئیدها ممکن است باعث شدیدتر شدن بیماری هایی نظیر آبله مرغان و سرخک در کودکان شوند. همچنین این دارو می تواند باعث کند شدن یا توقف رشد در کودکان و نوجوانان گردد.

مقدار مصرف دارو: مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

- بزرگسالان:

دوز معمول: دوز مورد نیاز متفاوت است و برحسب بیماری و پاسخ بیمار برای هر فرد به تفکیک تعیین می شود.
مشکلات ضد التهابی، سرکوب ایمنی و غدد داخلی: براساس بیماری تحت درمان دوز شروع ۰/۷۵ تا ۹ میلی گرم در روز.
اختلالات آلرژیک: روز اول تزریقی، روز دوم و سوم ۳ میلی گرم خوراکی در دو دوز منقسم، روز چهارم ۱/۵ میلی گرم خوراکی در دو دوز منقسم، روز پنجم و ششم ۰/۷۵ میلی گرم خوراکی روزانه، روز هفتم ویزیت مجدد.
مالتیپل اسکلروزیس: در موارد حاد روزی ۳۰ میلی گرم برای یک هفته سپس ۴ تا ۱۲ میلی گرم یک روز در میان برای یک ماه تا مشاهده اثر.

کاربردهای تایید نشده: تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی:
در موارد حاد: ۸ تا ۱۲ میلی گرم وریدی یا خوراکی.
در موارد تأخیری: ۸ میلی گرم در روز در یک یا دو دوز منقسم برای ۲ روز، ۱۶ تا ۲۴ ساعت بعد از شیمی درمانی.

مولتیپل میلوما: هر صبح ۴۰ میلی گرم در روزهای ۱، ۴، ۹، ۱۲، ۱۷ و ۲۰ هر سیکل.

- کودکان:

مشکلات سرکوب ایمنی و غدد داخلی: دوز شروع با ۰/۲ تا ۰/۳ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز. به صورت ۳ تا ۴ دوز منقسم.
کاربرد تایید نشده: مشکلات ضد التهابی: ۰/۸ تا ۰/۳ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز، به صورت منقسم هر ۶ تا ۱۲ ساعت.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.

افزایش اشتها، سو، هاضمه، عصبانیت یا بی قراری، تیره یا کمرنگ شدن پوست، اشکال در به خواب رفتن، افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت.
- عوارض مصرف دوز بالا و طولانی مدت دارو: درد معده، شکم و یا پشت، گیجی، تب، از دست دادن اشتها، درد عضله و مفاصل، سرگیجه، استفراغ، کوتاه شدن تنفس، کاهش وزن، چاقی موضعی، آکنه و افزایش فشار خون.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته اجتناب کنید.



BRC/ P- SDI 5- 01/ 03

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن مدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۹۴۴۹ داخلی ۳۵۸

دیدروژسترون (دروژکس-آی اچ)

دروژکس-آی اچ

دیدروژسترون

قرص روکش دار خط دار خوراکی حاوی ۱۰ میلی گرم دیدروژسترون

پیش از شروع مصرف دروژکس-آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

دروژکس-آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود:

قرص دروژکس-آی اچ (د-روژکس-آی-اچ) حاوی ماده موثره دیدروژسترون با میزان ۱۰ میلی گرم می باشد و به گروه دارویی هورمون های جنسی (پروژسترون) تعلق دارد و فاقد اثرات استروژنی و آندروژنی می باشد. دروژکس-آی اچ جهت درمان اختلالات قاعدگی مانند منورازی، آندومتروز، محافظت از اندومتر طی درمان جایگزینی هورمون (HRT) در یائسگی، تهدید به سقط، سقط مکرر و ناباروری استفاده می شود.

آنچه که باید پیش از مصرف دروژکس-آی اچ بدانید:

- دروژکس-آی اچ برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علائم شبیه با شما دارند خودداری نمایید.
 - پزشک شما قبل از تجویز این دارو باید علت خونریزی غیر طبیعی را مشخص نماید.
 - اگر شما در حال حاضر تحت درمان با داروی ضد انعقاد هستید به پزشک خود اطلاع دهید.
 - اگر شما سابقه ابتلا به اختلال پورفیری یا افسردگی دارید یا اخیراً مبتلا به این مشکلات شده اید و یا این مشکلات طی دوره بارداری یا پیش از درمان هورمونی تشدید شده اند با پزشک خود مشورت کنید.
 - پزشک شما باید قبل از درمان با این دارو، معاینات کامل فیزیکی شامل معاینه پستان و معاینه زنان (لگن) را برایتان انجام دهد.
 - چنانچه به هر یک از بیماری های زیر مبتلا هستید به پزشک خود اطلاع دهید:
 - فشار خون بالا، آسم، سرع، میگرن، مشکلات قلبی، مشکلات کلیوی.
- مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید:**
- اگر شما به دیدروژسترون یا سایر ترکیبات پروژاستین حساسیت دارید.
 - اگر شما مشکوک یا مبتلا به بدخیمی های وابسته به هورمون پروژسترون هستید.
 - اگر یکی از مشکلات زیر را دارید:
 - خونریزی واژینال یا علت نامشخص، سقط ناقص، اختلالات کبدی و بیماری های عروقی.
 - اگر دلیل مصرف این دارو پیشگیری از هایپرپلازی اندومتر (ضخیم شدن آندومتر) است به ویژه اگر هم زمان استروژن ها را نیز مصرف می کنید.
 - اگر سن شما کمتر از ۱۸ سال است.
 - اگر مبتلا به عدم تحمل گالاکتوز، کمبود لاکتاز یا جذب ناقص گلوکوز-گالاکتوز هستید.

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

- دارو همیشه در یک ساعت معین مصرف شود.
- ممکن است طی درمان با دروژکس-آی اچ دچار لکه بینی شوید.
- شما باید طی دوره درمان با این دارو به طور منظم مورد آزمایش قرار بگیرید. توالی آزمایش و نوع آن توسط پزشک و براساس موقعیت فردی شما مشخص می شود.
- هرگونه تغییر در پستان خود را سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.
- شما باید بطور منظم تحت معاینات پستان شامل ماموگرافی قرار بگیرید. این معاینات باید مطابق با نیازهای درمانی هر شخص انجام گیرد.
- اگر عمل جراحی (به ویژه جراحی شکمی یا جراحی ارتوپدی اندامهای تحتانی) دارید که بعد از آن احتمال بی حرکتی طولانی مدت وجود دارد، به پزشک خود اطلاع دهید. پزشک احتمالاً درمان جایگزین هورمونی را چهار الی شش هفته قبل از جراحی متوقف خواهد کرد.
- اگر بعد از شروع درمان، ترومبوآمبولی وریدی (ایجاد لخته در وریدها) ایجاد شود باید مصرف دروژکس-آی اچ را متوقف نمایید و به پزشک خود اطلاع دهید.
- اگر هر یک از علائم بالقوه ترومبوآمبولی (مانند تورم دردناک پا، درد ناگهانی در قفسه سینه و تنگی نفس) اتفاق افتاد، مصرف دروژکس-آی اچ را قطع کرده و سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.

دروژکس-آی اچ را چگونه مصرف کنید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

- اختلالات قاعدگی (مانند منورازی): ۱۰ میلی گرم (یک قرص) دو بار در روز به صورت دوره ای.
- آندومتروز: ۱۰ میلی گرم (یک قرص) دو یا سه بار در روز به صورت دوره ای یا مداوم.

- محافظت از اندومتر طی درمان جایگزینی هورمون در یائسگی: ۱۰ میلی گرم (یک قرص) یک یا دو بار در روز به صورت دوره ای یا ۵ میلی گرم در روز به طور مداوم.
- تهدید به سقط: ۴۰ میلی گرم (۴ قرص) در شروع درمان و سپس ۱۰ میلی گرم (یک قرص) یا بیشتر هر ۸ ساعت و تا یک هفته بعد از قطع علائم درمان ادامه پیدا کند و سپس به صورت تدریجی مصرف دارو کاهش پیدا کند مگر اینکه علائم برگردد.
- سقط مکرر: ۱۰ میلی گرم (یک قرص) دو بار در روز به صورت دوره ای تا زمان بارداری سپس تا هفته ۲۰ بارداری به طور مداوم استفاده گردد. پس از آن مصرف دارو به صورت تدریجی ممکن است کاهش یابد.
- ناباروری: ۱۰ میلی گرم (یک قرص) دو بار در روز به صورت دوره ای.
- چطور مصرف کنید: قرص را به طور کامل با یک لیوان آب ببلعید.

چه زمانی مصرف کنید: استفاده از قرص بدون توجه به زمان صرف غذا امکان پذیر است.

برای چه مدت مصرف کنید: دارو را تا زمانی که پزشک شما دستور داده است مصرف کنید. اگر به هر دلیلی قصد قطع کردن مصرف دارو را دارید حتماً پزشک خود را سریعاً در جریان قرار دهید.

به قسمت «چه مقدار مصرف کنید» مراجعه نمایید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

در صورتی که مصرف قرص خود را فراموش کردید، از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کرده و برای کسب اطلاعات با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

اگر دارو را بیش از مقدار تعیین شده مصرف کردید:

بالفاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیردهی:

- پیش از مصرف این دارو و هر داروی دیگری طی دوره بارداری و شیردهی یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- تاکنون اطلاعاتی مبنی بر عدم امکان مصرف دیدروژسترون در طول دوره بارداری وجود ندارد. پزشک شما باید ریسک و فواید مصرف دارو را بررسی نماید.
- شواهدی مبنی بر اینکه دیدروژسترون باروری را کاهش می دهد، موجود نمی باشد.
- دیدروژسترون در شیرمادر ترشح می شود. خطر دارو برای شیرخوار قابل چشم پوشی نیست.
- در دوران شیردهی دیدروژسترون مصرف نکنید.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.
- داروهای القا کننده آنزیم (مانند کاربامازپین، فنوباریتال، فنی توالین و ریگامپین)، سیکلوسپورین.

عوارض جانبی احتمالی مصرف دروژکس-آی اچ چه می باشد:

- پس از مصرف دارو از رانندگی و کار با ماشین آلات پرهیز کنید.
- هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
- مشکلات گوارشی، تغییرات در اشتها یا وزن، تجمع مایعات (ادم)، آکنه، کلوآسما (ملاسما)، راش پوستی آلرژیک، کهیر، افسردگی، تغییرات در پستان شامل ناراحتی و زگیل ماستی، تغییرات در میل جنسی، ریزش مو، هیرسوتمسم، خشکی، خواب آلودگی یا بی خوابی، تب، سردرد، علایم شبه سندرم پیش از قاعدگی، تغییر در سیکل قاعدگی یا خونریزی نامنظم قاعدگی.
- آیا می دانید در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقاء گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است).

دروژکس-آی اچ چگونه نگهداری می شود:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- در طول مدتی که قرص های خود را مصرف می کنید آن ها را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری نمایید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری کنید.

توصیف محصول:

مشکلاتی دروژکس-آی اچ و نحوه غرض آن چگونه است:

قرص دروژکس-آی اچ محدب، با روکش سفید رنگ و خط را می باشد که در جعبه های ۲۰ عددی (حاوی ۲ پلیستر ۱۰ عددی) همراه با برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

دروژکس-آی اچ، محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.
کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۲۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران.
تلفن صدای مشتری: ۰۹۸۲۱۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (داخلی ۳۵۸)

تاریخ بازنگری:

۱۳۹۸/۰۶/۵



داینوزست + اتینیل استرادیول (داینوزیل-آی اچ)

داینوزیل-آی اچ

داینوزست/اتینیل استرادیول

قرص روکش دار خوراکی حاوی ۲ میلی گرم داینوزست/۰۰۳ میلی گرم اتینیل استرادیول

پیش از شروع مصرف داینوزیل-آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی اطلاعات جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

داینوزیل-آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود.

قرص داینوزیل-آی اچ (دای-نوزیل-آی اچ) حاوی ماده مؤثره داینوزست به میزان ۲ میلی گرم، متعلق به گروه دارویی پروژسترون ها و اتینیل استرادیول به میزان ۰۰۳ میلی گرم، متعلق به گروه دارویی استروژن ها می باشد. داینوزیل-آی اچ به عنوان داروی ضد بارداری خوراکی و جهت درمان آکنه یا شدت متوسط در زنانی که دارای ضد بارداری خوراکی در آنها منع مصرف ندارد و یا درمان های موضعی در مورد آن ها موثر واقع نشده است، کاربرد دارد.

آنچه که باید پیش از مصرف داینوزیل-آی اچ بدانید:

داینوزیل-آی اچ برای بیماری قلبی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علائم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.

نورانی که این دارو را نباید مصرف کنید:

- اگر به داینوزیل یا اتینیل استرادیول یا سایر ترکیبات این دارو حساسیت دارید.
- در صورت ابتلا یا داشتن سابقه تشکیل لخته خون در رگ های یا (ترومبوز وریدی عمقی) یا در ریه ها (آمبولی ریوی).
- در صورت ابتلا به بیماری هایی که ریسک تشکیل لخته در شریان ها را افزایش می دهند مانند دیابت ملیتوس همراه با آسیب عروق کونی، فشار خون بالا، پرفوایی چربی نامناسب (چربی خون بالا).
- در صورتی که مبتلا به بیماری هستید که بر روی لخته شدن خون تاثیر می گذارد، برای مثال: کمبود پروتئین C، کمبود آنتی ترومبین ۳، فاکتور V لیپدن و آنتی پادی های ضد فسفولیپید.
- در صورتی که اخیراً سابقه جراحی داشته اید یا قرار است برای مدت طولانی تحرک نداشته باشید.
- در صورت داشتن سابقه حمله قلبی، سکنه مغزی و یا شرایط مستعد کننده تغییر آترین قلبی و حمله گذرای ایسکمیک مغزی (TIA).
- در صورت ابتلا یا داشتن سابقه بیماری های شدید کبدی، تومورهای کبدی یا پانکراتیت.
- در صورت ابتلا یا داشتن سابقه میگرن همراه با علائم عمیق مرکزی.
- در صورت ابتلا یا احتمال ابتلا به سرطان پستان یا سرطان دیواره رحم.
- در صورت ابتلا یا داشتن سابقه تغییر طبیعی واژینال و یا عدم زرخداد قاعدگی شده اید.

- در صورت استعمال دخالتها:

- در حین مصرف این دارو باید بدانید:

- استفاده از داروی داینوزیل-آی اچ پیش از شروع دوره قاعدگی و پس از یانسی توصیه نمی شود.
- در صورتی که هر یک از ریسک فاکتورهای اشاره شده در زیر را دارید، در کنار خطرات احتمالی دارو، مزایای استفاده از داینوزیل-آی اچ نیز باید برای هر بیمار توسط پزشک یا داروساز بررسی و ارزیابی شود:
- آمیولی (در بیماری که شاخص توده بدنی (BMI) آنها بالاتر از ۳۰ باشد)، گروه سنی بالای ۳۵ سال، سابقه خانوادگی بیماری ترومبو-آمبولی وریدی و ترومبو آمبولی شریانی به ویژه در سنین پایین (مختلر خون)، قبل از ۵۰ سالگی.
- بیماری کرون و کوئیت آمبولی استرونی می تواند با مصرف داروهای ضد بارداری خوراکی ترکیبی تشدید شود.
- اگر شما مبتلا به دیابت هستید طی مدت مصرف ضدبارداری های خوراکی ترکیبی باید با دقت تحت مراقبت باشید.
- اگر سابقه بیماری رواتی آنژیوادم دارید، مصرف استروژن ممکن است سبب تحریک یا تشدید نشانه های ادم پوستی گردد.
- اگر تری گلیسرید خون شما بالاتر یا سابقه آن را داشته اید، ممکن است با مصرف ضدبارداری های ترکیبی خوراکی ریسک پانکراتیت در شما افزایش یابد.
- اگرچه داینوزیل-آی اچ به منظور جلوگیری از بارداری استفاده می شود، ولی این دارو شما را در برابر عفونت های واگیردار جنسی مانند عفونت های HIV، محافظت نمی کند. شما باید بدانید که جهت جلوگیری از انتقال عفونت های واگیردار جنسی، لازم است از وسایل ضد بارداری دیگری (مانند کاندوم) هم استفاده کنید.

داینوزیل-آی اچ چگونه مصرف کنید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورالعمل پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چگونه مصرف کنید: یک قرص در روز.

چطور مصرف کنید: قرص را به طور کامل با مقدار کمی مایعات ببلعید.

زمانی چه مصرف کنید: دارو را در ساعت معینی از روز مصرف نمایید.

برای چه مدت مصرف کنید: روزانه یک قرص برای مدت ۲۱ روز متوالی استفاده گردد. پس از آن ۷ روز دارو مصرف نشود و بلافاصله پس از آن بسته بعدی قرص آغاز گردد. معمولاً سه روز بعد از مصرف آخرین قرص، خونریزی قاعدگی شروع می شود و ممکن است تا قبل از شروع بسته بعدی پایان نپذیرد. مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.

مصرف دارو را چگونه شروع کنید:

- اگر از داروی ضدبارداری دیگری استفاده نهموده اید (طی یک ماه گذشته)، مصرف داینوزیل-آی اچ، بایستی از روز اول دوره قاعدگی طبیعی زمان آغاز گردد (در اولین روز خونریزی قاعدگی). چنانچه مصرف قرص به صورت فوق آغاز شود، نیازی به استفاده از سایر روش های ضدبارداری در اولین دوره مصرف دارو نمی باشد. می توان داینوزیل-آی اچ را از روز ۵-۲ خونریزی قاعدگی آغاز نمود ولی در این صورت در اولین دوره مصرف، توصیه می شود در ۷ روز ابتدای استفاده این دارو، از روش ضد بارداری غیر خوراکی دیگر (مانند کاندوم) نیز استفاده شود.

- در صورتی که قبلاً از داروهای با روش های ضدبارداری دیگری مثل داروهای ترکیبی دیگر، حلقه واژینال، پیج پوستی و یا کنتراستپتیوهای حاوی پروژسترون به تنهایی استفاده می کردید، برای شروع داینوزیل-آی اچ با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

- تاخیر کمتر از ۱۲ ساعت در مصرف هر قرص: اثرات ضدبارداری دارو کاهش نمی یابد، بلافاصله پس از به خاطر آوردن، یک قرص را مصرف کنید و سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید.

- تاخیر بیش از ۱۲ ساعت در مصرف هر قرص: اثرات ضدبارداری قرص کاهش می یابد. مدیریت مصرف قرص های فراموش شده، می تواند بر اساس توصیه اشاره شده در ذیل صورت پذیرد:

- اگر در هفته اول، قرص را فراموش کردید: به محض به یاد آوردن قرص فراموش شده آن را مصرف کنید، حتی اگر منجر به مصرف

همزمان دو قرص گردد، سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. علاوه بر آن بایستی طی ۷ روز آینده از روش ضدبارداری غیر خوراکی دیگری (مانند کاندوم) استفاده کنید. چنانچه در ۷ روز گذشته، رابطه جنسی داشته اید، بایستی احتمال بارداری بررسی شود.

- اگر در هفته دوم، قرص را فراموش کردید: به محض به یاد آوردن قرص فراموش شده آن را مصرف کنید، حتی اگر منجر به مصرف همزمان دو قرص گردد، سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. چنانچه در ۷ روز قبل از دوز فراموش شده، دارو را به طور صحیح مصرف کرده اید، نیازی به مصرف قرص را فراموش کردید: چنانچه در ۷ روز قبل از دوز فراموش شده، دارو را به طور صحیح مصرف کرده اید، نیازی به استفاده از مراقبت های ضدبارداری دیگر نمی باشد. در این مواقع یکی از دو روش زیر را انتخاب نمایید:

۱- به محض به یاد آوردن، قرص را مصرف کنید، حتی اگر منجر به مصرف همزمان دو قرص گردد، سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. شروع استفاده از بسته بعدی قرص، بایستی بلافاصله پس از اتمام بسته فعلی باشد و هیچ فاصله ای بین مصرف بسته های قرص نباشد. تا پایان بسته دوم قرص، شما خونریزی نخواهید داشت، اما ممکن است شاهد لکه بینی یا خونریزی های مقطعی در طی روزهای مصرف قرص باشید.

۲- مصرف قرص در بایستری فعلی را قطع کنید، سپس به مدت ۷ روز قرص مصرف نکنید (روزی که قرص فراموش شده است، نیز شامل این هفت روز می باشد)، سپس بسته دیگری از قرص را شروع کنید.

اگر مشکلات گوارشی داشته:

ممکن است جذب قرص داینوزیل-آی اچ، به دلیل استفراغ یا اسهال شدید کاهش یابد (چنانچه طی ۳-۴ ساعت پس از مصرف قرص رخ دهد)، می بایست در اسرع وقت قرص جدیدی خورده شود. قرص جدید باید تا قبل از گذشت ۱۲ ساعت پس از زمان معمول مصرف قرص میل شود، پس از گذشت ۱۲ ساعت بایستی در خصوص مصرف قرص فراموش شده، مشابه توصیه های بالا عمل نمایید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید. نشانه های مصرف بیش از حد قرص ضدبارداری خوراکی ترکیبی در کودکان و بزرگسالان ممکن است شامل موارد زیر باشد: تهوع، استفراغ، تحریک پذیری پستان، سرگیجه، درد شکم، خواب آلودگی، خستگی و خونریزی واژینال در زنان و دختران، لازم به ذکر است که آنتی دوتی برای این دارو وجود ندارد و درمان آن بر اساس علائم ناشی از بیماری صورت می پذیرد.

آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیرخوار:

مصرف قرص داینوزیل-آی اچ، در طول مدت بارداری ممنوع می باشد. قبل از شروع درمان با قرص داینوزیل-آی اچ، بایستی احتمال بارداری رد شود. اگر در طول مدت مصرف قرص داینوزیل-آی اچ بارداری رخ دهد، مصرف قرص داینوزیل-آی اچ بایستی سریعاً قطع شود. داروهای ضدبارداری خوراکی ترکیبی ممکن است در دوران بارداری موجب کاهش مقدار و تغییر ترکیبات شیر شوند. ممکن است عوارض کمی از استروئیدهای ضدبارداری و یا متابولیت های آن در شیر مادر ترشح شود. بنابراین به طور کلی مصرف قرص ضدبارداری خوراکی ترکیبی تا زمانیکه در نزدتان را کامل از شیر نگیرید، توصیه نمی شود.

مصرف همزمان با سایر داروها:

- در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

- عللانی از دخالت مصرف هم زمان این دارو با داروهای اشاره شده در زیر دیده شده است:

باربیتورات ها، مصرف کاربامازین، فنی توئین، پریمدون، ریگامایسین، ریتوناویر، نورابین، افلویرتن، فلامات، گریزوفلووین، اکس کاربازین، توپیرامات، اسیداسکوروبیک، پاراسمول، آتورواستاتین، کتوکوتازول، ایتراکوتازول، ریکوتازول، فلوکوتازول، کلاریترومایسین، اریترومایسین، دیکلیتامز، ایندیناتویر، سیکلوسپورین، لاموتیزین، میدازولام، تیوفیلین، ملاتونین، تیزابیدین و گیاه علف چای.

عوارض جانبی احتمالی مصرف داینوزیل-آی اچ چه می باشد:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض معمول: درد در ناحیه پستان، سردرد.

عوارض غیر معمول: التهاب واژن/ دهانه واژن، کاندیدیازیس واژن یا عفونت قارچی دهانه واژن، تغییر در اشتها (افزایش اشتها)، خلق و خوی افسرده، گیجی، میگرن، افت فشار خون، افزایش فشار خون، درد، تهوع، استفراغ، اسهال، آلوپسی (ریزش منطقه ای مو)، راش، خارش، آکنه، خونریزی های غیر طبیعی، خونریزی های بین قاعدگی، بزرگ شدن پستان، تورم پستان، دردهای قاعدگی، ترشحات واژن، کیست تخمدان، درد لگن، خستگی و تغییرات وزن.

آیا می دانید در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما تکمیل نمایید؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقا، گزارش دهنی عوارض دارویی تهیه شده است).

داینوزیل-آی اچ چگونه نگهداری می شود:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- تا زمانی که قرص خود را مصرف می کنید آن را در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.

- از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری کنید.

- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری کنید.

توسیف محصول: شکل ظاهری داینوزیل-آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص داینوزیل-آی اچ به صورت آبی، گرد، محذب روکش دار می باشد که در جعبه ۲۱ عددی (حاوی یک پلیاستر کارت ۲۱ عددی)، همراه با برگه راهنما عرضه می گردد.

نویسندگان:

داینوزیل-آی اچ محصول شرکت ایران هورمون می باشد.

کیلوپلتر ۱۱۱ عدد مخصوص، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۴، تهران، ایران.

تلفن خدمات مشتریان: ۹۰۵۵۱۷۰۰۵۵۱۴۴۹۸۲۱ (داخلی ۳۵)

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶



BRCO P-SJ93-01/01

رالوکسیفن هیدروکلراید (رالوکسن)

Raloxen

Raloxifen Hydrochloride
F.C. Tablet

رالوکسن

رالوکسیفن هیدروکلراید
قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به رالوکسیفن، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

- در صورت مصرف داروهای زیر:

کلستیرامین، استروژن (سیستمیک) و وارفارین.

- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر:

سابقه ایجاد لخته خونی، سرطان یا تومور و نارسایی احتقانی قلب.

- در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- مصرف این دارو قبل از یائسگی توصیه نمی شود.

- قبل از هر گونه عمل جراحی مصرف این دارو را به پزشک جراح اطلاع دهید.

- چنانچه قرار است در موقعیتی قرار گیرید که برای یک مدت طولانی مجبور به عدم تحرک باشید مثل عمل جراحی، مسافرت طولانی و استراحت در رختخواب با پزشک خود مشورت نموده و ۷۲ ساعت قبل از جراحی مصرف دارو را قطع نمایید.

- چنانچه در حین مصرف این دارو احساس کردید که باردار شده اید دارو را قطع نموده و با پزشک خود مشورت نمایید. (البته مصرف این دارو فقط در دوران یائسگی توصیه می گردد.)

- چنانچه در حین مصرف این دارو دچار خونریزی از واژن، درد پستان و تورم دست ها و پاها شدید با پزشک خود مشورت نمایید.

- چنانچه یک دوز دارو را فراموش نمودید از دو برابر نمودن دوز بعدی خودداری نمایید و مانند روال گذشته به مصرف دارو ادامه دهید.

- توصیه می شود جهت دستیابی به پاسخ درمانی بهتر، همراه با رژیم دارویی، مصرف مکمل های حاوی کلسیم و ویتامین د و انجام تمرینات ورزشی مناسب را مورد توجه قرار دهید.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

- پیشگیری از پوکی استخوان: ۶۰ میلی گرم یک بار در روز.

- درمان پوکی استخوان: ۶۰ میلی گرم یک بار در روز.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.

درد سینه، عفونت مجاری ادراری، بیماری های رحم، تب و عفونت، سندرم شبه آنفلوآنزا، سینوزیت، فارتژیت، درد عضلانی، ادم محیطی، بثورات پوستی، التهاب واژن، اختلالات گوارشی، لارنژیت، پنومونی، سردردهای میگرنی، اختلالات بینایی و ترومبوازمبولیسم با علائمی مانند سرفه های خون آلود، اختلال در تکلم، عدم حفظ تعادل بدن و کوتاهی تنفس.

عوارضی که در صورت تداوم آنها باید به پزشک مراجعه نمود شامل التهاب و درد مفاصل، دردهای عضلانی، گرگرفتگی، بی خوابی، ترشحات سفید رنگ واژن، افزایش وزن، افسردگی و تعریق می باشند.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۰۹-۷۵۱۰۵۵۱۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- S044- 01/ 01

رزوواستاتین (رزویک - آی اچ)

Rosuvic -IH 10 & 20

Rosuvastatin

F.C. Tablet

رزویک - آی اچ ۱۰ و ۲۰

رزوواستاتین

قرص روکش دار

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- سابقه مصرف الکل، بیماری‌های کبدی و کلیوی، بالا بودن سطح آنزیم‌های کبدی، تشنج و یا مرع، بیماری‌ها و اختلالات متابولیکی و الکترولیتی، عفونت‌ها، فشار خون پایین، اعمال جراحی و یا آسیب‌های جسمی اخیر، کم کاری غده تیروئید، مشکلات ماهیچه‌ای و وجود پروتئین در ادرار را به پزشک خود اطلاع دهید.
- وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر مواد جانبی داروها، غذاها، رنگ‌ها و مواد نگهدارنده را به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

- بارداری

- در صورت حساسیت به این دارو از مصرف آن خودداری شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری در رده X قرار دارد و مصرف آن در این دوران ممنوع است.

این دارو در شیر ترشح می‌شود و مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود. در صورت ضرورت و با نظر پزشک و ارزیابی فواید مصرف آن نسبت به خطرات احتمالی می‌تواند تجویز شود.

احتیاطات:

- در بیماران با نارسایی کبدی و یا کلیوی با احتیاط مصرف نمایید.

- در صورت مصرف همزمان این دارو با فنوفیرات، کلوفیرات، نیکوتینیک اسید (نیاسین) و جم فیبروزیل به دلیل افزایش احتمال بروز عوارض جانبی دارو بر عضلات، احتیاط نمایید.

- توصیه می‌شود قبل از شروع درمان و ۱۲ هفته بعد از آغاز مصرف دارو و سپس به طور سالانه، تست‌های کبدی انجام گیرد.

- در صورت بروز هر گونه عارضه عضلانی مانند خستگی و ضعف غیرعادی همراه تب و درد و گرفتگی عضلات در اسرع وقت با پزشک خود مشورت نمایید.

- در صورت بروز حاملگی در اسرع وقت با پزشک خود مشورت نمایید.

- قبل از انجام هر گونه اعمال جراحی و دندانپزشکی، کادر درمانی را از مصرف این دارو آگاه سازید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

- سیکلوسپورین، جم فیبروزیل، نیکوتینیک اسید (نیاسین)، فنوفیرات، کلوفیرات، کلشی سین، اریترومايسين، آرترومايسين، نفازودون، وارفارین.

- در صورت مصرف داروهای آنتی اسید معده مثل آلومینیوم ام جی اس و یا منیزیم هیدروکساید توصیه می‌شود مصرف آنها با این دارو حداقل ۲ ساعت فاصله داشته باشد.

- در افرادی که تحت درمان با داروی سیکلوسپورین هستند، دوز رزوواستاتین به ۵ میلی گرم در روز محدود می‌شود.

- در افرادی که تحت درمان با داروی جم فیبروزیل هستند، دوز رزوواستاتین به ۱۰ میلی گرم در روز محدود می‌گردد.

موارد و مقدار صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

- به عنوان داروی پایین آورنده چربی خون در بزرگسالان: به طور معمول ۵ تا ۲۰ میلی گرم روزی یک بار تجویز می‌شود.

- ضرورتی به مصرف این دارو همراه غذا وجود ندارد ولی از مصرف آب گرمی فروت در طول درمان پرهیز نمایید.

- توصیه می‌شود جهت رسیدن به پاسخ درمانی مطلوب، دارو را به طور منظم و در ساعت مشخصی از روز میل نمایید.

- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، در اولین فرصت ممکن آن را میل نمایید ولی در صورتی که زمان مصرف قرص بعدی فرا رسیده باشد، هرگز مقدار دارو را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به توجه بیشتری دارند:

میوپاتی (با علائم درد عضلانی، ضعف و خستگی)، رابدومیولیز (با علائمی مانند سیاه شدن ادرار، تب، گرفتگی و اسپاسم عضلات، درد عضلانی، خستگی و ضعف غیر معمول)، زردی (لرز، مدفوع آجری رنگ، تیره شدن ادرار گچی، تب، سردرد، خارش، بی اشتهایی، تهوع، درد معده و شکم، راش پوستی، بوی نامطبوع دهان، خستگی و ضعف غیر عادی، استفراغ خونی، زرد شدن پوست و چشم).

عوارضی که در صورت تداوم و یا بدتر شدن بیمار برای بیمار قابل توجه هستند:

سردرد، التهاب و درد و خشکی گلو، آبریزش و یا گرفتگی بینی، تغییر در صدا، مشکل در بلعیدن، تورم و برآمدگی در گردن، شکم درد، کم خونی، درد قفسه سینه، اضطراب، درد مفاصل، آسم، کمردرد، افسردگی، اسهال، بی‌خوابی، دیابت، ادم، نفخ، علائم شبه آنفلوآنزا، ورم معده، افزایش فشار خون، عفونت، بی خوابی و درد لگن.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



BRC/P-S070-01/03

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن مدای مشتری: ۱۹۰-۱۷۴۴۹۰۵۵ داخلی ۳۵۸

ریواروکسابان (آنکلات- آی اچ ۱۰ و ۱۵ و ۲۰)

آنکلات-آی اچ ۱۰ و ۱۵ و ۲۰

Rivaroxaban

F.C. Tablet

ریواروکسابان

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه مصرف الکل، بیماری های کبدی و کلیوی، بالا بودن سطح آنزیم های کبدی، تشنج و یا صرع، بیماری ها و اختلالات متابولیکی و الکترولیتی، عفونت ها، فشار خون پایین، اعمال جراحی و یا آسیب های جسمی اخیر، کم کاری غده تیروئید، مشکلات ماهیچه ای و وجود پروتئین در ادرار.
- وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر مواد جانبی داروها، غذاها، رنگ ها و مواد نگهدارنده.
- در صورت حاملگی و شیردهی.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری در رده X قرار دارد. مصرف آن در این دوران ممنوع است.

این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوارن شیردهی توصیه نمی شود. در صورت ضرورت و با نظر پزشک و ارزیابی فواید مصرف آن نسبت به خطرات احتمالی می تواند تجویز شود.

احتیاطات:

- در بیماران با نارسایی کبدی و یا کلیوی با احتیاط مصرف نمایید.
- در صورت مصرف هم زمان این دارو با فنوفیبرات، کلوپیگرات، نیکوتینیک اسید (نیاسین) و جم فیبروزیل به دلیل افزایش احتمال بروز عوارض جانبی دارو بر عضلات، احتیاط نمایید.
- توصیه می شود قبل از شروع درمان و ۱۲ هفته بعد از آغاز مصرف دارو و سپس به طور سالانه، تست های کبدی انجام گیرد.
- در صورت بروز هر گونه عارضه عضلانی مانند خستگی و ضعف غیرعادی همراه تب، درد و گرفتگی عضلات در اسرع وقت با پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت بروز حاملگی در اسرع وقت با پزشک خود مشورت نمایید.
- قبل از انجام هرگونه اعمال جراحی و دندانپزشکی، کادر درمانی را از مصرف این دارو آگاه سازید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

- سیکلوسپورین، جم فیبروزیل، نیکوتینیک اسید (نیاسین)، فنوفیبرات، کلوپیگرات، کلشی سین، اریترومايسين، آریترومايسين، نفازودون، وارفارین.
- در صورت مصرف داروهای آنتی اسید معده مثل آلومینیوم ام جی اس و یا منیزیم هیدروکساید توصیه می شود مصرف آنها با این دارو حداقل ۲ ساعت فاصله داشته باشد.

- در افرادی که تحت درمان با داروی سیکلوسپورین هستند، دوز رزواستاتین به ۵ میلی گرم در روز محدود شود.

- در افرادی که تحت درمان با داروی جم فیبروزیل هستند، دوز رزواستاتین به ۱۰ میلی گرم در روز محدود گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

- بزرگسالان: به طور معمول ۵ تا ۴۰ میلی گرم روزی یک بار تجویز می شود.
- ضرورتی به مصرف این دارو همراه با غذا وجود ندارد ولی بهتر است دوزهای بیشتر از ۱۵ میلی گرم را همراه غذا مصرف نمایید.
- از مصرف آب گریپ فروت در طول درمان پرهیز نمایید.
- توصیه می شود جهت رسیدن به پاسخ درمانی مطلوب، دارو را به طور منظم و در ساعت مشخصی از روز میل نمایید.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، در اولین فرصت ممکن آن را میل نمایید ولی در صورتی که زمان مصرف قرص بعدی فرا رسیده باشد، هرگز مقدار دارو را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک یا دارو ساز مشورت نمایید:

میوپاتی (با علایم درد عضلانی، ضعف و خستگی)، رابدومیولیز (با علایمی مانند سیاه شدن ادرار، تب، گرفتگی و اسپاسم عضلات، درد عضلانی، خستگی و ضعف غیر معمول)، زردی (لرز)، مدفوع آجری رنگ، تیره شدن ادرار، گیجی، تب، سردرد، خارش، بی اشتها، تهوع، درد معده و شکم، راش پوستی، بوی نامطبوع دهان، خستگی و ضعف غیر عادی، استفراغ خونی، زرد شدن پوست و چشم).

عوارضی که در صورت تداوم و یا بدتر شدن برای بیمار قابل توجه هستند:

سردرد، التهاب و درد و خشکی گلو، آبریزش و یا گرفتگی بینی، تغییر در صدا، مشکل در بلعیدن، تورم و برآمدگی در گردن، شکم درد، کم خونی، درد قفسه سینه، اضطراب، درد مفاصل، آسم، کمر درد، افسردگی، اسهال، یبوست، دیابت، ادم، نفخ، علایم شبه آنفلوانزا، ورم معده، افزایش فشار خون، عفونت، بی خوابی و درد لگن.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹ - ۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC/P-S086-01/02

سیپروترون کامپاند (سیپروترون استات + اتینیل استرادیول)

(اتیسترون)

Etisterone
Cyproterone Compound
F.C. Tablet

اتیسترون
سیپروترون کامپاند
قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– وجود حساسیت به استروژن ها و پروژستین ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد نگهدارنده و رنگ ها، رعایت رژیم غذایی خاص مانند رژیم کم سدیم یا کم شکر، مصرف سیگار یا داشتن اضافه وزن
– در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر: سرخ، بیماری تروفوبلاستیک فعال، بیماری های سرخرگی، متاستاز، وابسته به سرطان پستان، سابقه افسردگی شدید (به ویژه اگر با ضد بارداری هورمونی ایجاد شده باشد)، هایپر-پرولاکتینمی، بیماری های التهابی روده (بیماری کرون)، میگرن، سابقه شخمی یا خانوادگی تری گلیسرید بالا، بالا بودن کلسترول، فاکتورهای خطر ابتلا به ترومبوآمبولی وریدی، بیماری سلول داسی شکل، توده بدون تشخیص پستان، مشکلات قلبی-عروقی، مشکلات کلیوی، ناهنجاری های بینایی، آتزیو ادم ارثی، کم کاری تیروئید، هایپوگلسمی، پانکراتیت، اندومتریوزیس، لوپوس اریتماتوز، بیماری کره
– در صورت مصرف داروهایی نظیر: داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد دیابت، بنزودیازپین ها، القا کننده های آنزیم کبدی (مانند گریزنوفلووین و ریفامپین)، تاموکسیفن، ضد افسردگی های سه حلقه ای، آمیودارون، استروئیدهای آنبولیک، آندروژن ها، استروژن ها، آترواستاتین، آسپرین، مورفین، داروهای ضد سرخ (مانند باریتورات ها، کاربامازپین، فنی توئین)، سیکلوسپورین، تنوفیلین، دی سولفیرام، متوترکسات، داروهای ضد فشار خون (مانند متیل دوبا)، ناتروکسان، پریمیدون، کورتیکواستروئیدها، داروهای درمان HIV (مانند ریتوناویر)، داروهای درمان هپاتیت C، لاموتریزین، تتراسایکلین، آنتی بیوتیک ها (مانند آمپی سیلین).

– این دارو در موارد زیر نباید مصرف شود:

حساسیت به آنتی آندروژن ها یا استروژن ها یا پروژستین ها یا هر یک از اجزای فرمولاسیون دارو، بارداری یا شک به بارداری، شیردهی، دیابت، مصرف سیگار، اختلال عملکرد شدید کبدی، ابتلا یا سابقه ابتلا به تومورهای کبدی، پورفیری حاد، بیماری یا سنگ کیسه صفرا، بیماری قلبی مرتبط با فشار خون بالای ریوی یا ریسک آمبولی، لخته خون، سابقه یرقان کلستاتیک یا خارش یا اختلال حرکتی کره طی بارداری، سابقه سرطان پستان یا رحم یا دهانه رحم، سابقه سندرم اورمیک هملایتیک، میگرن، سابقه شخمی ترومبوز وریدی یا سرخرگی یا ترومبوفلیت، درمان اسکروز برای وریدهای واریسی، فاکتورهای خطر شدید یا چندگانه برای بیماری شریانی یا ترومبوآمبولی وریدی، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، حملات ایسکمیک مغزی گذرا بدون سردرد، خونریزی واژینال بدون تشخیص

نکات قابل توجه به هنگام مصرف این دارو:

– قبل از شروع درمان با این دارو باید احتمال بارداری را رد کرد.
– در ۲۱ روز ابتدای درمان از روش های دیگر پیشگیری از بارداری استفاده نمایید.
– دارو را طبق الگو و در زمان مشخص مصرف نمایید. در طول درمان با این دارو در فواصل مرتب ۱۲-۶ ماه یا مطابق نظر پزشک در فواصل کمتر به پزشک مراجعه نمایید.
– برای پیشگیری از بروز تهوع یا کاهش آذ، دارو را همراه غذا یا بلافاصله بعد از غذا یا زمان خواب مصرف نمایید.
– بروز هر گونه مشکل در پستان از قبیل توده غیر معمول یا ترشح را به پزشک اطلاع دهید.
– پیش از انجام هر گونه جراحی، درمان اورژانسی یا تست آزمایشگاهی، به پزشک یا دندانپزشک خود درباره مصرف این دارو اطلاع دهید.
– در ۳ ماه ابتدایی مصرف این دارو ممکن است بین دو قاعدگی، مقادیر متفاوتی از خونریزی واژینال را تجربه کنید. در این صورت به مصرف دارو ادامه دهید اما در صورت شدید بودن خونریزی (مشابه خونریزی ماهانه) پزشک خود را مطلع نمایید.
– مصرف این دارو ممکن است منجر به ایجاد لکه های قهوه ای رنگ به خصوص بر روی صورت (کلوآسما) شود که معمولاً پس از قطع درمان به تدریج ناپدید می شوند. طی درمان، از قرار گرفتن در معرض خورشید و یا لامپ های UV خودداری نموده و در صورت داشتن واکنش شدید با پزشک مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:
کرامپ شکمی، آتوره (هنگام قطع)، افسردگی، تغییرات خلق و خو، ناهنجاری های پستان، ترومبوز، تغییرات دهانه رحم، اختلال حرکتی کره، عدم تحمل لنز تماسی، سردرد، اختلال عملکرد کبدی، نئوپلاسم کبدی، افزایش فشار خون، تحریک پذیری، کرامپ پا، اختلال میل جنسی، تغییر متابولیسم لیپید، ملاسما، اختلال قاعدگی، تهوع، اختلال واولوژینال (ولویت و واژینیت)، اختلال بینایی، استفراغ، احتباس مایعات بدن، واکنش های حساسیت به نور، تغییر اشتها و وزن

مقدار مصرف دارو:

این دارو در زنان در سن باروری، به عنوان درمان آکنه متوسط تا شدید مقاوم به درمان موضعی یا آنتی بیوتیک های خوراکی و هیرسوتیسم کاربرد دارد. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:
– در اولین دوره درمان، از روز اول قاعدگی به مدت ۲۱ روز، هر روز یک قرص مصرف شود. سپس ۷ روز مصرف دارو قطع گردد (در این ۷ روز قاعدگی رخ میدهد). پس از گذشت ۷ روز، مصرف قرص به همان ترتیب آغاز می گردد در صورتی که قاعدگی در موعد مقرر (در مدت ۷ روز) اتفاق نیفتاد به پزشک خود اطلاع دهید و مصرف دوره جدید دارو را شروع ننمایید.
– در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به این ترتیب عمل کنید: اگر از زمان مصرف ۱۲ ساعت یا کمتر می گذرد، دوز فراموش شده را مصرف نمایید و مصرف دارو را طبق روال گذشته ادامه دهید. اگر از زمان مصرف قرص بیش از ۱۲ ساعت گذشته باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کنید و بقیه را به همان صورت مصرف نمایید و از یک روش ضد بارداری غیر هورمونی (فیزیکی) دیگر نیز استفاده نمایید، در صورت فراموشی بیش از یک دوز با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SH26-01/ 02

سیپروترون استات (آندروستین ۵۰)

آندروستین ۵۰

Androstin 50

Cyproterone Acetate

Scored Tablet

سیپروترون استات

قرص خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن درموارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– وجود حساسیت به سیپروترون استات یا سایر اجزا: فرمولاسیون، دارو و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد معاف و رنگ ها

– در صورت ابتلا به هر بیماری به ویژه: ابتلا یا سابقه ابتلا به مننژیوما، سابقه مشکلات عروق مغزی، سندرم دوبین-جانسون، سندرم روتور، ابتلا یا سابقه ابتلا به اختلالات ترومبوآمبولیک (مانند ترومبوز ورید عمقی، سابقه سکتة قلبی، سابقه آمبولی ریوی)، بیماری ها و نارسایی کبدی، ابتلا یا سابقه ابتلا به تومورهای کبدی، بیماری های بدخیم، افسردگی مزمن شدید، دیابت، کم خونی داسی شکل، سرطان پروستات، اعتیاد مزمن به الکل، اختلال کبدی، دیابت شدید همراه با تغییرات عروقی، مشکلات وراثتی عدم تحمل گالاکتوز، فقدان یا کمبود لاکتاز لب یا سو، جذب گلوکز- گالاکتوز

– در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید، به ویژه داروهای ضد دیابت خوراکی و انسولین

– بارداری و شیردهی

– استفاده از این دارو در اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی شود.

نکات قابل توجه هنگام مصرف:

– دارو را بعد از غذا مصرف نمایید.

– خستگی و ضعف از عوارض معمول این دارو به خصوص در چند هفته اول مصرف می باشد. هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند احتیاط کنید.

– در موارد اعتیاد مزمن به الکل پاسخ درمانی به این دارو مشاهده نمی شود. طی مصرف این دارو از نوشیدن الکل اجتناب نمایید.

– این دارو ممکن است بلوغ استخوانی و تکامل بیضه را به تاخیر بیندازد بنابراین نباید برای جوانان نابالغ تجویز شود.

– عملکرد کبدی پیش از شروع درمان، بطور منظم طی درمان و یا هر زمان که علایم سمیت کبدی رخ دهد باید ارزیابی شود و در صورت بروز سمیت کبدی ناشی از سیپروترون درمان باید قطع شود (مگر آنکه علت بروز آن عامل دیگری (مانند بیماری متاستاز دهنده) باشد که ادامه مصرف دارو به نفع بیمار باشد).
– در مردان مبتلا به سرطان پروستات ممکن است محدود کردن دوره درمان توصیه شود.

– از آنجایی که کم خونی از عوارض جانبی این دارو می باشد لذا اندازه گیری سلول های خونی پیش از شروع و طی درمان توصیه می شود.
– به علت گزارش مهار آدرنوکورتیکال، طی درمان با این دارو، عملکرد آدرنوکورتیکال باید بطور منظم ارزیابی شود.

– مردان مبتلا به دیابت نیاز به پایش دقیق و کنترل دیابت دارند.
– کلیرانس کبدی سیپروترون با افزایش سن کاهش می یابد.

– در صورت مصرف مقدار بیش از حد تجویز شده، با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید (حتی در صورت عدم وجود علایم).

– در صورت تجویز این دارو با دوز بالا به زنان، تمام موارد گفته شده برای زنان نیز صدق می کند.

موارد و مقدار مصرف:

– کنترل میل جنسی در انحراف یا بیش فعالی جنسی در مردان: ۵۰ میلی گرم (یک قرص) دو بار در روز

– پیشگیری از عود تومور همراه درمان ابتدایی آنالوگ گنادورلین: مردان بزرگسال: روزانه ۲۰۰ میلی گرم در ۲ تا ۳ دوز منقسم به مدت ۵ تا ۷ روز قبل از آغاز آنالوگ گنادورلین، سپس روزانه ۲۰۰ میلی گرم در ۲ تا ۳ دوز منقسم به مدت ۳ تا ۴ هفته بعد از آغاز آنالوگ گنادورلین. حداکثر دوز روزانه ۳۰۰ میلی گرم می باشد.

– درمان تسکینی طولانی مدت کارسینومای پروستات، زمانی که آنالوگ های گنادورلین تحمل نمی شود و یا جراحی تخلیه یک یا هر دو بیضه منع مصرف دارد، یا زمانی که درمان خوراکی ترجیح دارد:

مردان بزرگسال: ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم گرم روزانه در ۲ تا ۳ دوز منقسم
– درمان گرگرفتگی همراه درمان آنالوگ گنادورلین یا بعد از جراحی تخلیه یک یا هر دو بیضه:

مردان بزرگسال: ابتدا ۵۰ میلی گرم روزانه سپس ممکن است دوز روزانه بر اساس پاسخ بیمار تا ۱۵۰ میلی گرم افزایش یابد. (۵۰ تا ۱۵۰ میلی گرم در ۱ تا ۳ دوز منقسم)

* حداکثر دوز روزانه این دارو ۳۰۰ میلی گرم می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر عارضه ای به ویژه عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. کاهش میل جنسی (برگشت پذیر)، مهار بازگشت پذیر تولید اسپرم، کاهش حجم انزال (برگشت پذیر)، حالت افسردگی و تغییر خلق، تنگی نفس، خستگی و ضعف، بزرگی پستان و غدد پستانی، اختلالات کبدی، سمیت کبدی شامل یرقان، هیپاتیت و نارسایی کبدی، گر گرفتگی، افزایش تعریق، درد نوک پستان، بی قراری، تغییر وزن، واکنش های پوستی، تولید نابجای شیر و نودول های خوش خیم، نئوپلاسمی ها، مهار آدرنوکورتیکال، کم خونی، آروسیرمی، تغییرات مو، هایپوتیروئیدیزم (کاهش یا توقف رشد موی سر)، استنوپروز (پوکی استخوان)، کم فعالیت غدد سباسه (احتمال بروز آکنه)، ترومبوآمبولی، ناباروری (برگشت پذیر)، مننژیوما

مصرف در بارداری و شیردهی:

– این دارو برای استفاده در زنان نمی باشد و مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع است.

شرایط نگهداری دارو:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۹-۱۷۰۵۵۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/P-SI 31-01/03

سیس آتراکوریوم ۱۰ (سیس آتراکورین)

Cisatracurium 10

Cis Atracorine

Injectable Solution

سیس آتراکوریوم ۱۰

سیس آتراکورین

محلول قابل تزریق

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:
- این دارو می‌بایست زیر نظر متخصصین و در مکان‌های مجهز به امکانات مقابله با موارد اورژانس تجویز گردد.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- وجود هر نوع حساسیت به سیس آتراکوریوم و سایر داروهای بیس-بنزیدیل ایزوکلینولین.

- در صورت بارداری و شیردهی.
- در صورت ابتلا به بیماری‌هایی مانند میاستنی گراویس، هایپرترمی بدخیم، اختلالات الکترولیتی، سوختگی، اختلالات کبدی و کلیوی، فلج ناقص اندام‌های تحتانی و فلج یک سمت بدن.
- در صورت مصرف در سالمندان و اطفال.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- تجویز این دارو و تنظیم دوز آن می‌بایست تحت نظارت فرد متخصص که دارای آشنایی کامل با عملکرد داروها می‌باشد صورت پذیرد.
- تجویز دارو فقط در مکان‌های مجهز به امکانات احیا، بیمار مانند لوله تراشه، دستگاه ونتیلیسیون مکانیکی، اکسیژن و آنتاگونیست‌های سیس آتراکوریوم باید انجام گیرد.

- برای جلوگیری از ایجاد استرس و ناراحتی در بیمار، سیس آتراکوریوم را قبل از القا، بی‌هوشی به بیمار تجویز نکنید.
- این دارو فقط باید به صورت وریدی تزریق گردد.

- همانند سایر مهارکننده‌های نوروماسکولار، می‌توان از محرک اعصاب محیطی جهت بررسی اثر دارو استفاده نمود.

- داروهای زیر دارای تداخل با داروی سیس آتراکوریوم می‌باشند لذا در صورت مصرف این داروها، پزشک معالج خود را مطلع سازید.

- آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند (آمینوگلیکوزیدها، تتراسایکلین‌ها، باسیتراسین، پلی‌میکسین‌ها، لینکومايسين، کلیندامایسین، کولیستین، کلیستیمات سدیم) و داروهای دیگر شامل نمک‌های منیزیم، لیتیم، بی‌حس‌کننده‌های موضعی، پروکائین آمید و کینیدین اثرات سیس آتراکوریوم را تشدید می‌نمایند.

- در صورتی که سیس آتراکوریوم به دنبال مصرف سوکسینیل کولین تزریق شود زمان شروع اثر آن تقریباً ۲ دقیقه سریع‌تر می‌شود ولی بر روی طول اثر آن هیچ تأثیری ندارد.

- ایزوفلوران و انفلوران طول اثر سیس آتراکوریوم را زیاد می‌کنند لذا مقادیر کمتری مورد نیاز است.

- در بیمارانی که طولانی مدت از فنی توئین و کاربامازپین استفاده می‌کرده‌اند، مدت بلوک عصبی-عضلانی کوتاه‌تر بوده و لذا دوز بیشتری لازم است.

مقدار مصرف:

- داروی کمکی در بی‌هوشی بزرگسالان: در تکنیک انتوباسیون با القا، اکسیژن شروع درمان با تزریق وریدی (3×ED_{۵۰}) 0.15 mg / kg تا (4×ED_{۵۰}) 0.2 mg / kg به عنوان جز، کمکی برای ترکیب بی‌هوشی Propofol/ Nitrous/ Oxygen می‌تواند شرایط ایده‌آلی برای انتوباسیون به ترتیب طی ۱/۵ و ۲ دقیقه فراهم نماید.
شرایطی مشابه را می‌توان در تجویز همین مقادیر به عنوان جز، کمکی در ترکیب Thiopental/ Nitrous/ Oxygen انتظار داشت. برای حفظ بلوک عصبی-عضلانی در جراحی‌های طولانی‌تر می‌توان 0.03 mg / kg را ۴۰ تا ۵۰ دقیقه بعد از دوز اولیه 0.15 mg/kg و ۵۰ تا ۶۰ دقیقه بعد از دوز اولیه 0.2 mg/kg تزریق کرد. نیاز به دوزهای نگهدارنده باید بر اساس معیارهای بالینی بیمار تعیین شود.
- انفوزیون مداوم حین عمل برای بزرگسالان: تزریق پیوسته دارو را می‌توان با مشاهده اولین علائم و شواهد برطرف شدن تأثیر دوز بولوس اولیه دارو آغاز کرد. دوز تزریقی اولیه ی انفوزیون، 3 mcg/kg/min است تا به سرعت بر بهبود عملکرد عصبی-عضلانی غلبه کند. در اغلب بیماران تزریق مقادیر ۱ تا ۲ میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه می‌تواند جهت حفظ طولانی مدت بلوک عصبی-عضلانی ۸۹ در محدوده ی % ۹۹ کافی باشد. سرعت تزریق را بر اساس پاسخ بالینی بیمار که به صورت تحریک اعصاب محیطی ظاهر می‌شود تنظیم نمایید.
میزان تزریق را در صورت بیهوشی پایدار با Isoflurane و ۳-۴ Enflurane در محدوده کاهش دهید. سرعت انفوزیون مناسب جهت نگهداری شرایط ایده‌آل برای بیمارانی که تحت جراحی پای-پس قلبی هم زمان با القا، هایپوترمی هستند نیز تقریباً نصف مقدار موارد نرموترمی است.

حفظ اثر بلوک عصبی-عضلانی در ICU:

اساس کار مشابه تزریق پیوسته و مداوم دارو در جراحی‌های طولانی است. تجویز اولیه دارو به میزان 3 mcg/kg/min می‌تواند بلوک عصبی-عضلانی را در افراد بزرگسال بستری در ICU فراهم کند.

- کودکان ۲ تا ۱۲ سال: دوز بولوس انفوزیون 0.1 mg/kg تا 0.15 mg/kg در مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه بی‌هوشی با Halothane و یا Opioid تجویز می‌شود. در صورت تجویز هم زمان در شرایط پایدار بیهوشی با Opioid/ Nitrous oxide/ Oxygen مقدار 0.1 mg/kg از آن می‌تواند ماکزیمم بلوک عصبی-عضلانی را برای مدت میانگین ۲/۸ دقیقه فراهم نماید که تا ۲۸ دقیقه از نظر بالینی موثر است و مقدار 0.15 mg/kg از آن می‌تواند ماکزیمم بلوک عصبی-عضلانی را برای مدت میانگین ۳ دقیقه فراهم نماید که تا ۳۶ دقیقه از نظر بالینی موثر است. انفوزیون مداوم دارو در اتاق عمل مشابه بزرگسالان است.

- کودکان ۱ تا ۲۳ ماهه: 0.15 mg/kg در مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه بی‌هوشی با Halothane و یا Opioid تجویز می‌شود. در صورت تجویز هم زمان در شرایط پایدار بی‌هوشی با Opioid/ Nitrous oxide/ Oxygen مقدار 0.15 mg/kg از آن می‌تواند ماکزیمم بلوک عصبی-عضلانی را برای مدت میانگین ۲ دقیقه فراهم نماید که تا ۴۳ دقیقه از نظر بالینی موثر است.

محلول تزریقی در آمپول‌های ۵ میلی‌لیتری با غلظت 2 mg/ml کاملاً شفاف و بی‌رنگ است. بنابراین از مصرف آمپول‌هایی که شفاف نبوده و حاوی ذرات قابل مشاهده باشند اکیداً خودداری نمایید. جهت رقیق سازی می‌توان آن را با محلول دکستروز ۵٪، محلول سدیم کلراید ۰/۹٪ و یا محلول (دکستروز ۵٪ و سدیم کلراید ۰/۹٪) رقیق نمود. همچنین این دارو با فرآورده‌های تزریقی، Fentanyl, Midazolam, Alfentanil, Droperidol, Sufentanil سازگار است.
به دلیل اسیدی بودن، با محلول‌های قلیایی با pH > 8.5 مثل محلول‌های باربیتورات و یا رینگر ل-سیتات سازگار است و نباید رقیق سازی شود. با Ketorolac, Propofol و یا رینگر ل-سیتات سازگاری دارد.

عوارض جانبی:

برادیکاردی، هایپوتانسیون، گرگرفتگی، راش پوستی، برونکواسپاسم، بلوک عصبی-عضلانی طولانی مدت، ضعف عضلانی، میوپاتی و واکنش‌های حساسیتی از عوارض این دارو می‌باشند.

مصرف در بارداری:

این دارو در رده C بارداری قرار دارد، درباره بی‌خطر بودن استفاده از سیس آتراکوریوم طی دوره بارداری اطلاعات کافی در دسترس نیست. لذا توصیه می‌شود مصرف این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز به تجویز آن پس از بررسی توسط پزشک متخصص صورت گیرد.

مصرف در شیردهی:

به ارتباط با ترشح دارو به شیر مادر اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما از آنجایی که اکثر داروها وارد شیر مادر می‌گردند لذا احتیاطات لازم در زمینه مصرف این دارو در دوران شیردهی باید صورت گیرد.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد، درون جعبه و به دور از نور نگهداری نمایید.
- از یخ زدگی دارو جلوگیری نمایید.

- پس از خروج دارو از یخچال و قرارگیری آن در دمای اتاق، ظرف ۲۱ روز آن را مصرف نمایید حتی اگر دوباره آن را در یخچال نگهداری می‌کنید.

- محلول‌های انفوزیون این دارو در یخچال یا دمای اتاق تا ۲۴ ساعت قابل نگهداری می‌باشد.

- در صورت نگهداری دارو در یخچال، هر سال حدود ۵٪ از قدرت (Potency) دارو کاسته می‌شود و در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد هر ماه حدود ۵٪ از قدرت آن کم می‌گردد.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن صدای مشتری: ۰۹-۱۷۰۵۵۱۴۹۴ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PN21-01/ 02

سولیفناسین (سوفاسین - آی اچ ۵)

Sofacine-IH 5

Solifenacin
F.C. Tablet

سوفاسین-آی اچ ۵

سولیفناسین

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید.

- در صورت بارداری و یا شیردهی، مصرف سایر داروها، سابقه حساسیت به این دارو و یا سایر داروها و مواد جانبی آنها، پزشک معالج خود را مطلع سازید.

- سابقه هر گونه بیماری مخصوصاً مواردی مانند انسداد مثانه و احتباس ادرار، انسداد گوارشی، نارسایی یا مشکلات کبدی، نارسایی یا مشکلات کلیوی، بیماری گلوکوم چشم یا زاویه بسته (پرفشاری چشم) و مشکل طولانی شدن موج QT در الکتروکاردیوگرام (نوار قلبی) را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

- در طول مصرف این دارو و در صورت بروز دردهای شکمی شدید و یا پیوست طولانی مدت به مدت ۳ روز و یا بیشتر در اسرع وقت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

مصرف این دارو ممکن است در بعضی افراد موجب مشکلات بینایی شود. پیش از رانندگی و یا فعالیت های دیگر از وضوح دید خود اطمینان حاصل کنید.

مصرف این دارو ممکن است در بعضی افراد موجب خشکی دهان شود. در صورت ادامه بروز این مشکل بیش از دو هفته با پزشک و یا دندانپزشک خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف:

- در صورت حساسیت به این دارو و یا مواد جانبی آن.

- در صورت انسداد گوارشی.

- در صورت احتباس ادراری.

- در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته چشم که در وضعیت کنترل نشده هستند.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در رده C حاملگی قرار دارد و مصرف آن در دوران بارداری توصیه نمی شود. در صورت ضرورت مصرف با تشخیص پزشک و ارزیابی فواید مصرف دارو نسبت به خطرات احتمالی آن تجویز می شود.

به دلیل فقدان مدارک کافی در مورد میزان ترشح این دارو در شیر مادر مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود. در صورت ضرورت مصرف، پزشک معالج در مورد قطع شیردهی تصمیم گیری خواهند نمود.

- توصیه می شود این دارو در بیماران مبتلا به انسداد راه خروجی مثانه به دلیل خطر احتباس ادرار با احتیاط تجویز شود.

- توصیه می شود در بیماران کبدی و نارسایی کلیوی با احتیاط فراوان مصرف شود.

- در صورت کاهش حجم ادرار و یا کاهش حرکات گوارشی هم زمان با مصرف این دارو، با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

- در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته چشم با احتیاط تجویز شود.

- کارایی و سلامت مصرف این دارو در کودکان مطالعه و ثابت نشده است.
- در بیماران با سابقه طولانی شدن موج QT قلبی با احتیاط و کنترل، تجویز و مصرف شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک معالج خود را مطلع سازید:

کتوکونازول، ایتراکونازول، کلاریترومایسین، ریفاکسیم، پتاسیم کلراید.

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است: جهت کنترل بیش فعالی مثانه بزرگسالان: در شروع درمان به طور معمول یک قرص ۵ میلی گرم یکبار در روز توسط پزشک معالج تجویز می شود و در صورت نیاز و تحمل بیمار ممکن است مقدار ۱۰ میلی گرم در روز نیز تجویز شود.

- مصرف این دارو به همراه غذا ضرورتی ندارد و فقط توصیه می شود که همراه با یک لیوان پر از آب میل نمایید.

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یادآوردن فوراً آن را میل کنید ولی اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی از عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه ممکن است همه این عوارض در یک فرد دیده نشود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

پیوست، خشکی دهان، تاری دید، سرفه، افسردگی، تحریک پذیری، بی اشتها، احساس خستگی و کسالت، سرگیجه، خشکی چشم، سوزش دهان، تورم لب پایینی، ضعف، افزایش فشار خون، علایم شبه آنفلوانزا، تهوع، التهاب حلق، خشکی و درد گلو، بدن درد، آبریزش بینی، تورم غدد بزاق، اختلال در بلع، درد قسمت فوقانی شکم، احتباس ادرار، عفونت مجاری ادرار، درد مثانه، استفراغ.

مسمومیت:

در صورت مصرف بیش از اندازه دارو و بروز مسمومیت سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنید. عوارضی مانند تاری دید، گیجی، منگی، تهوع، استفراغ، پیوست، سختی در دفع ادرار، احساس درد در چشم، خشکی چشم، خشکی بینی و دهان و یا گلو، قرمزی و گرگرفتگی صورت، سختی در تنفس، تپش قلب، لرزش، خشکی پوست، سرگیجه، خواب آلودگی، ثابت و گشاد شدن مردمکها در شرایط مصرف بیش از اندازه و مسمومیت با دارو مشاهده می شوند.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن مدای مشتری: ۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC/P-S074-01/01

فلوتامید (فلوتاناکس)

– در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد خوراکی و یا یکی از داروهای فنی توفیلین یا تنوفیلین به پزشک خود اطلاع دهید.

– در صورت فراموش کردن یک دوز از دارو، به محض یاد آوری آن را مصرف نمایید اما اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرا رسیده است از دو برابر کردن دوز مصرفی اجتناب کرده و مصرف دارو را مطابق قبل ادامه دهید. – طی درمان با این دارو ممکن است رنگ ادرار به رنگ کهربایی یا سبز مایل به زرد مشاهده شود. این علامت بی ضرر بوده و نیاز به درمان ندارد.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هرگونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به ویژه هریک از داروهای زیر، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین، داروهای دارای حاشیه درمانی باریک که با آنزیم CYP450 متابولیزه می شوند (مانند فنی توفیلین)، سیپروترون، ابیراترون استات، الفا/مهار کننده های CYP1A2، داپسون موضعی، دفراسیروکس، ایندیموم 111 کاپرومب پندتاید، پگ ایبتر فرون آلفا-2b، پریلوکاتین، تیزانیدین.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است: بزرگسالان: ۵۲۰ میلی گرم (یک قرص)، هر ۸ ساعت و در زمان مشخص. – این دارو را با معده خالی یا همراه غذا، همراه با یک لیوان آب مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولی در صورت بروز هر عارضه ای به ویژه عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

– عوارض شایع: تهوع، اسهال، ناتوانی جنسی یا کاهش میل جنسی، گرگرفتگی
– عوارض با شیوع کمتر: کم خونی (خستگی یا ضعف)، تورم مورت، انگشتان پا یا اندام انتهایی، سرخه یا گرفتگی صدا، تب یا لرز، درد پشت یا پهلو، ادرار کردن دردناک یا همراه با سختی، بی حسی یا مور مور شدن یا درد یا ضعف عضله در دست ها یا پاها، راش پوستی، حساسیت به نور، کاهش یا از دست دادن اشتها، درد یا حساسیت پستان، تورم پستان، استفراغ.

– عوارض نادر یا با شیوع نامعلوم: افزایش فشار خون، خارش پوست، افسردگی، اختلالات ریوی، مدفوع سیاه یا قیری، وجود خون در مدفوع یا ادرار، نقاط قرمز رنگ روی پوست، خونریزی یا کبودی غیر معمول، گیجی، سر درد، عصبی بودن، مشکل در به خواب رفتن، ضعف، بروز عفونت (شامل عفونت ریوی و دستگاه تنفسی)، آبی شدن لب ها، ناخن ها و کف دست، سرگیجه شدید یا غش کردن، احساس فشار شدید در سر، ضربان قلب سریع و ضعیف، گرمی و سرخ شدن صورت، احساس عمومی بیماری، احساس نفخ، گاز یا سوز، هاضمه، یبوست، خشکی دهان، عدم تطبیق چشم به تاریکی.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۹-۱۷۰۵۵۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



فلوتاناکس ۲۵۰

Flutanax 250

Flutamide

Tablet

فلوتامید

قرص

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران حتی در صورتی که علامت شبیه یا شما دارند خودداری فرمایید.

– در صورت ابتلا به هرگونه بیماری به ویژه بیماری قلبی-عروقی، شرایط مستعد کننده به سمیت آنتیلین (مانند نقصان آنزیم G6PD، هموگلوبینوپاتی ام شامل (مت هموگلوبینمی یا آنمی همولیتیک یا یرقان کلسیاتیک)، مصرف سیگار، اختلال کبدی، نقص یا اختلالات خونی، بیماری های ریوی یا سایر مشکلات تنفسی، سابقه حساسیت به آنتی آندروژن های غیر استروئیدی و هر دارو یا ماده دیگر و تمایل برای بچه دار شدن، به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

موارد مصرف:

این دارو در ترکیب با آلتالوگ LHRH یا جراحی دوطرفه بیضه، برای درمان سرطان پیشرفته پروستات (سطح B₂ یا C) یا سرطان متاستاتیک پروستات (سطح D₂) مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد منع مصرف:

اختلال عملکرد کبدی شدید، حساسیت به فلوتامید یا سایر اجزا، فرمولاسیون، استفاده در زنان (در شرایط غیر تهدید کننده حیات و غیر جدی)، پورفیریای حاد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری در رده D قرار دارد و به علت احتمال خطر برای جنین، در صورت صلاحدید پزشک تجویز گردد.

– ترشح این دارو داخل شیر مشخص نیست اما توصیه می شود به علت قابلیت ایجاد خطر در نوزادان و اثرات سمی، نباید طی مصرف این دارو شیردهی انجام شود.

موارد احتیاط:

– طی مصرف این دارو جهت ارزیابی روند درمان و عوارض جانبی، به طور منظم به پزشک مراجعه نمایید. – تست های عملکرد کبدی و ترانس آمینازهای سرمی باید پیش از شروع درمان، به صورت ماهانه به مدت ۴ ماه و پس از آن به صورت دوره ای ارزیابی شود.

– ایمنی و اثربخشی این دارو در اطفال ثابت نشده است و عوارض جانبی بر تکامل جنسی مردان جوان باید در نظر گرفته شود.

– طی مصرف این دارو از نوشیدن الکل اجتناب نمایید.

– آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) و همچنین غلظت مت هموگلوبین (در بیماران مستعد سمیت آنتیلین) باید ارزیابی شود.

– مصرف فلوتامید در بیماران دارای ALT بیش از ۲ برابر حد نرمال توصیه نمی شود و در صورت افزایش آن به بیش از ۲ برابر حد نرمال یا بروز زردی باید مصرف آن سریعاً متوقف و تا زمان رفع این مشکل تست های عملکرد کبدی پیگیری شود.

– در صورت تجویز دارو در زنان پیش از سن یائسگی، بیمار باید از یک ضد بارداری مناسب استفاده نماید. – در صورت بروز درد قفسه سینه، تنگی نفس یا دشواری در تنفس و علامت اولیه اختلال عملکرد کبدی (مانند تهوع، استفراغ، درد شکمی، خستگی، بی اشتها، علامت شبه آنفلوآنزا (سر درد، درد عضله یا مفاصل، خستگی)، افزایش بیلی روبین ادرار (ادرار تیره)، زردی، خارش و حساسیت ناحیه یک چهارم راست بالای شکم) سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

– در صورت استفراغ یا فاصله کمی پس از مصرف این دارو، برای آگاهی از مصرف مجدد یا عدم مصرف قرص به پزشک خود مراجعه نمایید.

فیناستراید (فینازکس-آی اچ ۱)

فینازکس-آی اچ ۱

فیناستراید

قرص روکش دار خوراکی حاوی ۱ میلی گرم فیناستراید

پیش از شروع مصرف فینازکس-آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی اطلاعات جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

فینازکس-آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود

قرص فینازکس-آی اچ (فی-نا-زکس-آی-اچ) حاوی ماده مؤثره فیناستراید به میزان ۱ میلی گرم می باشد و به گروه دارویی مهارکننده آنزیمی ۵-آلفا ردوکتاز تعلق دارد. فینازکس-آی اچ جهت درمان ریزش مو با الگوی مردانه (آلوپسی آندروژنیک)، فقط در آقایان استفاده می شود.

آنچه باید پیش از مصرف فینازکس-آی اچ بدانید

فینازکس-آی اچ برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علائم شبیه با شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید

- اگر به فیناستراید یا سایر ترکیبات فرمولاسیون حساسیت دارید.
- با توجه به اثر منفی فیناستراید بر رشد جنین، خانم هایی که باردار هستند یا قصد بارداری دارند باید از تماس مستقیم با قرص خرد شده یا شکسته شده و مایع منی شریک جنسی خود (که تحت درمان با مهار کننده ۵-آلفا ردوکتازها مانند فیناستراید می باشد) خودداری نمایند.
- استفاده از قرص فینازکس-آی اچ در کودکان توصیه نمی شود. نتایجی از ایمنی و اثر بخشی آن در کودکان اثبات نشده است.

در طول مصرف این دارو باید بدانید

- اثربخشی این دارو برای ریزش مو ناحیه گیجگاه (شقیقه) اثبات نشده است و در خانم ها کاربردی ندارد.
- دفع ادراری متابولیت های فینازکس-آی اچ در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی کاهش می یابد. در صورتی که مبتلا به نارسایی کلیوی هستید با پزشک خود مشورت نمایید.
- اگر تحت درمان با مهار کننده ی ۵-آلفا ردوکتاز هستید، تا حداقل یک ماه پس از آخرین دوز مصرفی دارو نباید خون اهدا کنید. هدف از این فاصله زمانی جلوگیری از انتقال دارو به زنان باردار دریافت کننده خون می باشد.
- اگر اختلال عملکرد کبدی دارید با پزشک خود مشورت نمایید.
- باید این دارو را حداقل به مدت ۳ ماه استفاده نمایید تا تاثیر آن را ببینید. اثرات دارو تا مادامی که مصرف دارو ادامه داشته باقی می ماند.

فینازکس-آی اچ را چگونه مصرف کنید

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشند.

چه مقدار مصرف کنید:

- آلوپسی آندروژنیک: ۱ میلی گرم (یک قرص) یک بار در روز.
- تنظیم دوز در نارسایی کلیوی: تنظیم دوز ضروری نمی باشد.
- تنظیم دوز در اختلالات کبدی: در بیماران با اختلال عملکرد کبدی با احتیاط مصرف شود.

چطور مصرف کنید:

قرص به طور کامل بلعیده شود. از جویدن یا خرد کردن قرص بپرهیزید.

چه زمانی مصرف کنید:

این دارو می تواند قبل یا بعد از غذا مصرف شود.

برای چه مدت مصرف کنید:

چنانچه قصد دارید مصرف دارو را قطع کنید، در این خصوص با پزشک خود مشورت کنید و مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.
جهت مشاهده علائم بهبود بیماری لازم است این دارو هر روز مصرف شود. توصیه می شود برای پایدار ماندن اثرات درمان مصرف دارو ادامه یابد و روند بهبود بیماری هر چند وقت یک بار بررسی شود.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، بلافاصله پس از به یاد آوردن فقط یک قرص مصرف کنید سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. اگر نزدیک به زمان مصرف قرص بعدی رسیده است از مصرف قرص فراموش شده خودداری نموده و استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. از مصرف هم زمان دو قرص خودداری نمایید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیامی دانستید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیردهی

- این دارو در بارداری، در رده X قرار دارد. در مطالعاتی بر روی تولید مثل حیوانات، در اندام های تناسلی خارجی گونه های نر، موارد غیر عادی گزارش شده است.

- مصرف دارو در زنان باردار یا کسانی که به زودی قصد بارداری دارند، ممنوع است.
- زنان باردار باید از تماس مستقیم با قرص خرد شده یا شکسته شده و مایع منی شریک جنسی خود (که در معرض مهار کننده ۵-آلفا ردوکتازها مانند فیناستراید می باشد) خودداری نمایند.

- اطلاعاتی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر موجود نمی باشد. لذا استفاده از این دارو در مادران شیرده ممنوع است.

مصرف هم زمان با سایر داروها

در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های تغذیه ای که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی احتمالی مصرف فینازکس-آی اچ چه می باشد

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
نا توانایی جنسی، کاهش میل جنسی، اختلال در انزال، بزرگ شدن پستان در مردان، گیجی، ادم، راش پوستی، ضعف، کاهش فشار خون وضعیتی، کاهش حجم انزال، خواب آلودگی، تنگی نفس، التهاب مخاط بینی، حساسیت به لمس پستان.
آیا می دانستید در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقاء گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است).

فینازکس-آی اچ چگونه نگهداری می شود

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- تا زمانی که قرص های خود را مصرف می کنید آن ها را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری نمایید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری نمایید.

توصیف محصول

شکل ظاهری فینازکس-آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص فینازکس-آی اچ ۱، به صورت سفید رنگ، گرد، محدب و روکش دار می باشد که در جعبه های ۳۰ عددی (حاوی ۳ پلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه با برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

فینازکس-آی اچ، محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.
کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۴۷، تهران، ایران.
تلفن صدای مشتری: ۹-۹۸۲۱۴۴۹۰۵۵۱۷ (داخلی ۳۵۸)

تاریخ بازنگری:

۱۳۹۹/۰۵/۱۲



BRC/P-S096-01/01

فیناستراید (فینازکس-آی اچ ۵)

فینازکس-آی اچ ۵

فیناستراید

قرص روکش دار خوراکی حاوی ۵ میلی گرم فیناستراید

پیش از شروع مصرف فینازکس-آی اچ ۵ هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی اطلاعات جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

فینازکس-آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود

قرص فینازکس-آی اچ (فی-نا-زکس-آی-اچ) حاوی ماده موثره فیناستراید به میزان ۵ میلی گرم می باشد و به گروه دارویی مهارکننده آنزیمی ۵-آلفا ردوکتاز تعلق دارد. فینازکس-آی اچ برای درمان و بهبود علائم هایپرپلازی خوش خیم پروستات استفاده می شود.

موارد مصرف تأیید نشده:

- سندرم درد مزمن لگن.
- پرمویی یا هیروسیتسم (ایدیوپاتیک) یا منشأ سندرم تخمدان پلی کیستیک) در زنان.

آنچه باید پیش از مصرف فینازکس-آی اچ بدانید

فینازکس-آی اچ برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علائم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید

- اگر به فیناستراید یا سایر ترکیبات فرمولاسیون حساسیت دارید.
- با توجه به اثر منفی فیناستراید بر رشد جنین، خانم هایی که باردار هستند یا قصد بارداری دارند باید از تماس مستقیم با قرص خرد شده یا شکسته شده و مایع منی شریک جنسی خود (که تحت درمان با مهار کننده ۵-آلفا ردوکتازها مانند فیناستراید می باشد) خودداری نمایند.

- استفاده از قرص فینازکس-آی اچ در کودکان توصیه نمی شود. نتایجی از ایمنی و اثربخشی آن در کودکان اثبات نشده است.

در طول مصرف این دارو باید بدانید

- دفع ادراری متابولیت های فینازکس-آی اچ در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی کاهش می یابد. در صورتی که مبتلا به نارسایی کلیوی هستید یا پزشک خود مشورت نمایید.
- قبل از شروع فینازکس-آی اچ برای درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات با پزشک خود درباره دیگر بیماری های اورولوژیکی مشورت کنید.

- اگر تحت درمان با مهار کننده های ۵-آلفا ردوکتاز هستید، تا حداقل یک ماه پس از آخرین دوز مصرفی دارو نباید خون اهدا کنید. هدف از این فاصله زمانی جلوگیری از انتقال دارو به زنان باردار دریافت کننده خون می باشد.

- اگر اختلال عملکرد کبدی دارید یا پزشک خود مشورت نمایید.

- حداقل پس از ۶ ماه از شروع درمان با فینازکس-آی اچ، سطح سرمی PSA به صورت دوره ای باید بررسی شود زیرا در مبتلایان به سرطان پروستات، فینازکس-آی اچ ممکن است سبب کاهش سطح سرمی PSA گردد.

- علائم تسکین هایپرپلازی خوش خیم پروستات، شامل بهبود جریان ادرار، کاهش علائم اورژانسی دفع ادرار و تسکین مشکل در ادرار کردن است.

- جهت مشاهده تاثیر کامل دارو، شاید لازم باشد حداقل به مدت ۶ ماه و یا تا پایان عمر مصرف شود. بدون مشورت با پزشک، مصرف قرص فینازکس-آی اچ را قطع نکنید.

- از آنجایی که فینازکس-آی اچ، سبب کاهش مشکلات ادراری در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات می گردد، بایستی به هنگام عصر از نوشیدن مایعات، به ویژه قهوه یا الکل خودداری کنید، تا به علت دفع ادرار دچار اختلال در خواب نشوید.

فینازکس-آی اچ را چگونه مصرف کنید

مقدار مصرف دارویی شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشند.

چه مقدار مصرف کنید:

- هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) ۵ میلی گرم (یک قرص) یک بار در روز.
دوز تأیید نشده:

- سندرم درد مزمن لگن: ۵ میلی گرم (یک قرص) یک بار در روز.
- هیروسیتسم در زنان: ۲/۵ تا ۵ میلی گرم در روز.

- تنظیم دوز در نارسایی کلیوی: تنظیم دوز ضروری نمی باشد.
- تنظیم دوز در اختلالات کبدی: در بیماران با اختلال عملکرد کبدی با احتیاط مصرف شود.

چطور مصرف کنید:

قرص به طور کامل بلعیده شود. از جویدن یا خرد کردن قرص بپرهیزید.

چه زمانی مصرف کنید:

این دارو می تواند قبل یا بعد از غذا مصرف شود.

برای چه مدت مصرف کنید:

چنانچه قصد دارید مصرف دارو را قطع کنید، در این خصوص با پزشک خود مشورت کنید و مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.

علائم بهبود در مدت کوتاهی مشاهده می شود ولی معمولاً ۶ ماه درمان، جهت ارزیابی تاثیر دارو مورد نیاز است.

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، بلافاصله پس از به یاد آوردن، فقط یک قرص مصرف کنید سپس استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. اگر نزدیک به زمان مصرف قرص بعدی رسیده است از مصرف قرص فراموش شده خودداری نموده و استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. از مصرف هم زمان دو قرص خودداری نمایید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیا می دانستید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

بارداری و شیردهی

- این دارو در بارداری، در رده X قرار دارد. در مطالعاتی بر روی تولید مثل حیوانات، در اندام های تناسلی خارجی گونه های نر، موارد غیر عادی گزارش شده است.

- مصرف دارو در زنان باردار یا کسانی که به زودی قصد بارداری دارند، ممنوع است.
- زنان باردار باید از تماس مستقیم با قرص خرد شده یا شکسته شده و مایع منی شریک جنسی خود (که در معرض مهار کننده ۵-آلفا ردوکتازها مانند فیناستراید می باشد) خودداری نمایند.

- اطلاعاتی در مورد ترشح این دارو در شیر مادر موجود نمی باشد. لذا استفاده از این دارو در مادران شیرده ممنوع است.

مصرف هم زمان با سایر داروها

در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های تغذیه ای که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی احتمالی مصرف فینازکس-آی اچ چه می باشد

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

ناتوانی جنسی، کاهش میل جنسی، اختلال در انزال، بزرگ شدن پستان در مردان، گیجی، ادم، راش پوستی، ضعف، کاهش فشار خون وضعیتی، کاهش حجم انزال، خواب آلودگی، تنگی نفس، التهاب مخاط بینی، حساسیت به لمس پستان.

آیا می دانستید در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقاء گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است).

فینازکس-آی اچ چگونه نگهداری می شود

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- تا زمانی که قرص های خود را مصرف می کنید آن ها را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

- از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری نمایید.

- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری نمایید.

توصیف محصول

شکل ظاهری فینازکس-آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص فینازکس-آی اچ ۵، به صورت آبی رنگ، گرد، محدب و روکش دار می باشد که در جعبه های ۳۰ عددی (حاوی ۳ پلیستر کارت ۱۰ عددی) همراه با برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

فینازکس-آی اچ، محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.
کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران.

تلفن صدای مشتری: ۹-۰۵۵۱۷۰۵۴۹۰۸۲۱ (داخلی ۳۵۸)

تاریخ بازنگری:

۱۳۹۹/۰۵/۱۲



BRC P-S097-01/01

کابر گولین (کابرلین ۱)

الی دو هفته به میزان ۵/۰ تا ۱ میلی گرم افزایش می یابد تا پاسخ مناسب حاصل گردد.

در افرادی که تحت درمان با لوودوپا بوده اند با افزایش تدریجی مقدار کابرلین، می بایست مقدار لوودوپا کاهش یابد تا زمانی که تعادل مناسب بین مقدار دو دارو ایجاد شود. حداکثر دوز درمانی ۳ میلی گرم در روز می باشد که به صورت یک بار در روز مصرف می گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید. ضعف و خستگی مفرط، تهوع، استفراغ، یبوست یا اسهال، سردرد، سرگیجه، خواب رفتن دست ها و پاها، تغییر حالت روانی، اختلال در تمرکز، تورم دست و پا و قوزک پا، درد سینه، اختلالات قاعدگی، اختلال دید، دردهای شکمی، کاهش اشتها، افت ناگهانی فشار خون در اثر تغییر وضعیت از نشسته یا خوابیده به حالت ایستاده، سو، هاضمه، خشکی دهان، نفخ، علائم شبه آنفلوآنزا، گرگرفتگی، اختلال در خواب، افسردگی، درد عضله و مفاصل، خارش، درد دندان، آبریزش بینی، آکنه و افزایش میل جنسی.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۰۹-۵۵۱۷۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



Caberlin 1

Cabergoline
Scored Tablet

کابرلین ۱

کابرگولین
قرص خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به دارو، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
– در صورت ابتلا به پرفشاری خون کنترل نشده، اختلالات کبدی، اکلامپسی و پره اکلامپسی و سابقه آن.
– در صورت مصرف هر گونه دارو به خصوص داروهایی مانند متیل دوبا و رزروپین، دوپامین بلاکرها (مانند متوکلوپرامید و داروهای نورولپتیک مانند فنوتیازین ها و تیوتیکسین ها).
– مصرف هیچ دارویی را بدون مشورت با پزشک آغاز و یا قطع نکنید.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– به طور کلی آگونیست های دوپامین نباید در کسانی که به فشار خون بالا در حین حاملگی مبتلا هستند استفاده شوند مگر اینکه پزشک تشخیص دهد که مزایای دارو از مضرات آن بیشتر است.
– چنانچه در حین مصرف این دارو احتمال حاملگی وجود داشته باشد و یا تصمیم به حاملگی داشته باشید حتماً پزشک خود را مطلع کنید.
– الکل باعث تشدید عوارض جانبی این دارو می شود. در حین درمان با کابرلین از مصرف الکل خودداری نمایید.
– مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی گردد، لذا ضمن درمان، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
– برای پیشگیری از بروز سرگیجه هنگام بلند شدن از حالت نشسته یا دراز کشیده، آهسته تغییر وضعیت دهید.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در حاملگی توصیه نمی شود.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که دارو سبب کاهش و مهار ترشح شیر می گردد، لذا در زنانی که قصد شیردهی دارند نباید مصرف شود.

مقدار مصرف دارو:

درمان علائم پارکینسون:

دوز اولیه در صورت تک درمانی ۵/۰ میلی گرم در روز و در صورت درمان کمکی همراه با لوودوپا ۱ میلی گرم در روز می باشد، مقادیر فوق هر یک

کابر گولین (کابرلین ۰/۵)

Caberlin 0.5

Cabergoline
Scored Tablet

کابرلین ۰/۵

کابر گولین
قرص خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به دارو، غذاها، مواد محافظ، رنگ ها و مشتقات ارگوت.
- در صورت ابتلا به پرفشاری خون کنترل نشده، اختلالات کبدی، اکلامپسی و پره اکلامپسی و سابقه آن.
- در صورت مصرف سایر داروها به خصوص مصرف هر یک از داروهای ضد فشار خون، فنوتیازین ها (پرفنازین، تری فلونوپرازین، کلرپرومازین)، تیوگراتین ها، هالوپریدول، متوکلوپرامید و تنوفیلین، موارد را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- بطور کلی آگونیسست های دوپامین نباید در کسانی که دچار فشار خون بالا در حین حاملگی هستند استفاده شوند مگر اینکه پزشک تشخیص دهد که مزایای دارو از مضرات آن بیشتر است.
- چنانچه در حین مصرف این دارو احتمال بارداری وجود داشته باشد و یا تممیم به بارداری داشته باشید حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.
- الکل باعث بروز شدیدتر عوارض جانبی این دارو می شود. در حین درمان با کابرلین از مصرف الکل خودداری نمایید.
- از کارهایی که احتیاج به هوشیاری کامل دارند مانند رانندگی اجتناب کنید.
- برای پیشگیری از بروز سرگیجه هنگام بلند شدن از حالت نشسته یا دراز کشیده، آهسته تغییر وضعیت دهید.

مصرف در بارداری:

این دارو در بارداری در رده B قرار دارد. اما از آنجایی که اطلاعات کامل در ارتباط با اثر دارو بر روی جنین انسان در دسترس نیست توصیه می شود تنها در صورت لزوم در دوران بارداری مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که دارو سبب کاهش و مهار ترشح شیر می گردد، لذا در زنانی که قصد

شیردهی دارند نباید مصرف شود.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

درمان اختلالات ناشی از هایپرپرولاکتینمی: شروع درمان با مقدار ۰/۲۵ میلی گرم دو بار در هفته به صورت خوراکی است که در صورت نیاز در فواصل ۴ هفته ای مقدار ۰/۲۵ میلی گرم ۲ بار در هفته به مقدار قبلی اضافه می شود. حداکثر مقدار دارو ۲ میلی گرم در هفته است (۱ میلی گرم ۲ بار در هفته).

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:
ضعف و خستگی مفرط، تهوع، استفراغ، یبوست یا اسهال، سردرد، سرگیجه، خواب رفتن دست ها و پاها، تغییر حالت روانی، اختلال در تمرکز، تورم دست/ پا / قوزک پا، درد سینه، اختلالات قاعدگی، اختلال دید، دردهای شکمی، کاهش اشتها، افت ناگهانی فشار خون در اثر تغییر وضعیت از نشسته یا خوابیده به حالت ایستاده، سو، هاضمه، خشکی دهان، نفخ، علائم شبه آنفلوآنزا، گرگرفتگی، اختلال در خواب، افسردگی، درد عضله و مفاصل، خارش، درد دندان، آبریزش بینی، آکنه، افزایش میل جنسی، تپش قلب و اضطراب.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۵۵۱۰۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P-SEI8-01/03

کنتراسپتیو اچ دی (لوونورژسترل + اتینیل استرادیول)

(اووستاپ-اچ)

Ovustop-H
Contraceptive HD
F.C. Tablet

اووستاپ-اچ
کنتراسپتیو اچ دی
قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. روز اول خونریزی روز اول قاعدگی نامیده می شود و این قرص باید از روز اول قاعدگی مصرف گردد.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به استروژن ها، پروژستین ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.
- در صورت ابتلا یا سابقه خانوادگی سرطان پستان و رحم، نارسایی قلبی، بیماری های عروقی کرونر، تنوپلازی وابسته به استروژن، بیماری کبدی، اختلالات صفراوی، تومور کبدی، ترومبوز، ترومبوفیلیت و اختلالات ترومبوآمبولیک، خونریزی غیر طبیعی رحمی، یرقان انسدادی، دیابت ملیتوس، فشار خون بالا، میگرن و افسردگی.
- در صورت مصرف داروهای مانند کورتیکواستروئیدها، سیکلوسپورین، القا، کننده های آنزیم های کبدی (مانند کاربامازپین، گریزنوفولون، فنی تونین)، ریتوناویر، تنوفیلین، ضد انعقادها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، آنتی-بیوتیک ها، مهار کننده های HIV و HCV پروتاز، مدافینیل، افلوپیرن، اکس کاربازپین، توپیرامات، آتورواستاتین، فلوکونازول، پیوگلیتازون، تراکتامیک اسید، بتا لاکرها، بنزودیازپین ها (مانند دیازپام، آلپرازولام)، لاموتریزین، سلزایلین، والپروئیک اسید، تاموکسیفن، داروهای ضد دیابت، کلوفیبرات، داروهای دارای سمیت کبدی، گل راعی (علف چای)، اپریتانت، بوستان، هورمون تیروئیدی، ضد سرخ ها مانند باربیتورات ها، استامینوفن، ویتامین C، کافئین.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- در اولین دوره مصرف این دارو، در ۷ روز اول از یک روش جلوگیری دیگر هم استفاده نمایید. برخی از متخصصین عقیده دارند که بهتر است طی اولین دوره مصرف این دارو (۲۱ روز) از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
- دارو را هر شب در ساعت معینی و ترجیحاً بعد از غذا یا هنگام خواب میل نمایید.
- جهت کاهش عوارض جانبی و افزایش اثر دارو، بهتر است فواصل مصرف دارو بیش از ۲۴ ساعت نباشد.
- این دارو در برخی از افراد ممکن است حساسیت به نور ایجاد نماید، لذا توصیه می شود در طول مصرف دارو از ضد آفتاب استفاده شود.
- در صورت مشکوک شدن به بارداری مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.
- به طور منظم هر ۶ ماه تا یک سال به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت نیاز به انجام تست های آزمایشگاهی پزشک مربوطه را از مصرف قرص ضد بارداری مطلع سازید.
- مصرف این دارو هیچ گونه اثر محافظتی در مقابل بیماری های آمیزشی نظیر HIV ندارد.
- این دارو ممکن است سبب التهاب، تورم و خونریزی لثه گردد، لذا مسواک زدن، ماساژ لثه و مراجعه منظم به دندان پزشک توصیه می گردد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

- این دارو به منظور جلوگیری از بارداری به صورت رژیم ۲۱ روزه مصرف می شود بدین ترتیب که یک قرص از روز اول قاعدگی مصرف می شود. پس از ۲۱ روز به مدت ۷ روز مصرف قرص قطع می گردد و در روز هشتم بدون توجه به اینکه خونریزی قاعدگی قطع شده باشد یا خیر، مجدداً رژیم ۲۱ روزه بعدی شروع می شود.
- اگر مصرف یک قرص را فراموش کردید به محض به یاد آوردن آن را مصرف نموده و سپس قرص بعدی را در وقت مقرر مصرف نمایید که در این صورت ممکن است در یک روز دو قرص را با هم مصرف نمایید و بقیه قرص ها را طبق روال معمول ادامه دهید.
- اگر مصرف دو قرص در دو روز متوالی را در هفته اول یا دوم دوره پیشگیری فراموش نمودید به محض به یاد آوردن، در دو روز متوالی بعد، روزی ۲ قرص مصرف نمایید و بقیه قرص ها را طبق روال معمول ادامه دهید و در باقی دوره از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری استفاده نمایید.
- اگر مصرف دو قرص متوالی را در هفته سوم و یا سه قرص متوالی را در هر زمانی از دوره فراموش نمودید، بسته قبلی قرص را دور انداخته و یک دوره مصرف جدید را شروع نمایید و همچنین تا ۷ روز بعد از یک روش دیگر غیر-هورمونی (فیزیکی) جلوگیری از بارداری استفاده نمایید. ممکن است شما در این ماه پریدود نشوید ولی اگر در دو ماه متوالی قاعدگی رخ نداد با پزشک معالج مشورت نمایید. در سایر موارد با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در دوران شیردهی: این دارو باعث تغییراتی در کیفیت و کمیت شیر مادر می گردد. هم چنین مقدار کمی از دارو وارد شیر مادر شده و مدارکی دال بر اثرات این دارو بر روی شیرخوار گزارش شده است. لذا مصرف آن در این دوران توصیه نمی گردد مگر با نظر پزشک معالج.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید: ترومبوآمبولی یا ترومبوز (دردهای غیر عادی، ناهانی، شدید یا ادامه دار شکم، درد بازو و یا ساق پا، ضعف و بی حالی غیر عادی، سردرد، درد قفسه سینه، تنفس کوتاه، اختلال در تکلم، سرفه خون آلود، از دست دادن هماهنگی بدن)، خونریزی مغزی، تغییرات در قاعدگی، عدم تحمل گلوکز و تغییر در متابولیسم چربی، سردرد و میگرن، افزایش فشار خون، کاندیدیاز واژینال و واژینیت (عفونت مهبل)، احتمال اندک سرطان وابسته به ضد بارداری های خوراکی در اندام های جنسی و کبد، تومور پستان، افسردگی، مشکلات کبد و کیسه صفرا، نفخ، آکنه (که سه ماه بعد از مصرف دارو از بین می رود)، حساسیت غیر طبیعی پستان ها به لمس و فشار، گیجی، تهوع و استفراغ، احتیاس سدیم و مایعات، خستگی، افزایش موی صورت و بدن، افزایش حساسیت به نور و مشکلات بینایی، کاهش یا افزایش میل جنسی، بثورات و لکه های پوستی، قرمزی، افزایش یا کاهش وزن، افزایش احتمال سکنه قلبی و مغزی، عدم تحمل لنزهای تماسی، عوارض قلبی-عروقی. در زنانی که دخانیات مصرف می کنند یا عوامل خطر زایی مانند بیماری عروق کرونر و فشار خون بالا، کلسترول و چربی خون بالا، چاقی و دیابت دارند بیشتر است.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۰۹۱۷-۴۴۹۰۵۵۵ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SH28-01/02

کنتراسپتیو ال دی (لوونورژسترل + اتینیل استرادیول)

(اووستاپ-ال)

Ovustop-L
Contraceptive LD
F.C. Tablet

اووستاپ-ال
کنتراسپتیو ال دی
قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو بر حسب نیاز فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیبه آن به دیگران خودداری نمایید. مصرف این دارو هیچ گونه اثر محافظتی در مقابل بیماری های آمیزشی (مقاربتی) مانند HIV (ایدز) ندارد. روز اول خونریزی روز اول قاعدگی نامیده می شود و این قرص باید از روز اول قاعدگی مصرف گردد.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

وجود هر نوع حساسیت به استروژن ها، پروژستین ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، رنگ ها و مواد محافظ. در صورت ابتلا یا سابقه خانوادگی سرطان پستان، سرطان رحم، تومورهای کبد یا اندام های جنسی، سابقه سکنه قلبی، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های عروق کرونر و عروق مغزی، بیماری های کبدی و اختلالات صفراوی و یرقان انسدادی، ترومبوز، ترومبولیت و اختلالات ترومبوآمبولیک، خونریزی غیر طبیعی رحم، دیابت ملیتوس، صرع، بالا بودن فشار خون، سردردهای میگرنی، افسردگی، جراحی های عمومی یا عدم تحرک طولانی مدت، در صورت مصرف سیگار، بیماری کره، پور فیبری، آنژیوادم، کاهش سطح سرمی فولات، پانکراتیت، بارداری و شیردهی. در صورت مصرف داروهایی مانند کورتیکواستروئیدها، سیکلوسپورین، الفاک، کنتده های آنزیم های کبدی (مانند کاربامازپین، گریزوفلووین، فنئو تونین)، ریتوناویر، تنوفیلین، ضد انعقادها، ضد اسفردگی های سه حلقه ای، آنتی بیوتیک ها، مهار کننده ها HCV و HIV پروتاز، مدافینیل، افویریز، آکس کاربازپین، توپیرامات، آتورواستاتین، فلوکونازول، پیوگلیتازون، تراکزامیک اسید، بتابلاکرها، بنزودیازپین ها (مانند دیازپام، آلپرازولام)، لاموتریزین، سلزیلین، والپروئیک اسید، تاموکسیفن، داروهای ضد دیابت، کلوفیبرات، داروهای دارای سمیت کبدی، گل راغی (علف چای)، اپریتانت، بوستان، هورمون تیروئیدی، ضد مرع ها مانند باربیتورات ها، استامینوفن، ویتامین C، کافئین.

نکات قابل تومیبه به هنگام مصرف دارو:

- در اولین دوره مصرف این دارو، در ۷ روز اول از یک روش جلوگیری دیگر هم استفاده نمایید. برخی از متخصصین عقیده دارند که بهتر است طی اولین دوره مصرف این دارو (۲۱ روز) از یک روش جلوگیری از بارداری غیر هورمونی دیگر هم استفاده نمایید.

- دارو را در ساعت معین و ترجیحاً پس از شام یا هنگام خواب میل کنید. تومیبه می شود که فاصله مصرف ۲ قرص متوالی بیش از ۲۴ ساعت نباشد. در طول ۳ ماه اول ممکن است خونریزی نامنظم شود و احتمال لکه بینی نیز می باشد که در صورت ادامه آن باید به پزشک معالج مراجعه شود.

- در صورت مشکوک شدن به بارداری مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید. به طور منظم هر ۶ ماه تا یک سال به پزشک مراجعه نمایید.

- در صورت نیاز به انجام تست های آزمایشگاهی پزشک مربوطه را از مصرف قرص ضد بارداری مطلع سازید.

- مصرف این دارو قبل از اولین قاعدگی تومیبه نمی شود.

- این دارو ممکن است سبب التهاب، تورم و خونریزی لکه گردد، لذا مسواک زدن و مراجعه منظم به دندان پزشک تومیبه می گردد.

- در طول درمان با این دارو از قرار گرفتن در برابر نور آفتاب یا لامپ های سولاریوم به مدت طولانی خودداری کنید. در صورت مراجعه به پزشک، وی را از مصرف دارو مطلع نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

این دارو به منظور جلوگیری از بارداری به صورت رژیم ۲۱ روزه مصرف می شود بدین ترتیب که از روز اول قاعدگی روزی یک قرص مصرف می شود. پس از ۲۱ روز مصرف قرص قطع می گردد و در روز هشتم بدون توجه به اینکه خونریزی قاعدگی قطع شده باشد یا خیر، مجدداً رژیم ۲۱ روزه بعدی شروع می شود.

اگر مصرف یک قرص را فراموش گردید به محض یادآوری آن را مصرف نموده و سپس قرص بعدی را در وقت مقرر مصرف نمایید و در این صورت ممکن است در یک روز دو قرص را با هم مصرف نمایید و بقیه قرص ها را طبق روال معمول ادامه دهید.

اگر مصرف دو قرص در دو روز متوالی را در هفته اول یا دوم دوره پیشگیری فراموش نمودید به محض به یاد آوردن، در دو روز متوالی بعد، روزی ۲ قرص مصرف نمایید و بقیه قرص ها را طبق روال معمول ادامه دهید و در باقی دوره از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری استفاده نمایید.

اگر مصرف دو قرص متوالی را در هفته سوم و یا سه قرص متوالی را در هر زمانی از دوره فراموش نمودید، بسته قبلی قرص را دور انداخته و یک دوره مصرف جدید را شروع نمایید و همچنین تا ۷ روز بعد از یک روش دیگر غیر هورمونی (فیزیکی) استفاده نمایید. ممکن است شما در این ماه پریرود نشوید ولی اگر در دو ماه متوالی قاعدگی رخ نداد یا پزشک معالج مشورت نمایید. در سایر موارد با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در دوران شیردهی: این دارو باعث تغییراتی در کیفیت و کمیت شیر مادر می گردد. همچنین مقدار کمی از دارو وارد شیر مادر شده و مدارکی دال بر اثرات این دارو بر روی شیرخوار گزارش شده است. لذا مصرف آن در این دوران تومیبه نمی گردد مگر با نظر پزشک معالج.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید: ترومبوآمبولی یا ترومبوز (دردهای غیر عادی، ناگهانی، شدید یا ادامه دار شکم، درد پا و یا ساق پا، ضعف و بی حالی غیر عادی، سردرد، درد قفسه سینه، تنفس کوتاه، اختلال در تکلم، سرفه خون آلود، از دست دادن هماهنگی بدن)، خونریزی مغزی، تغییرات در قاعدگی، عدم تحمل گلوکز و تغییر در متابولیسم چربی، سردرد و میگرن، افزایش فشار خون، کاندیدیاز واژینال و واژینیت (عفونت مهبل)، احتمال اندک سرطان وابسته به ضد بارداری های خوراکی در اندام های جنسی و کبد، تومور پستان، افسردگی، مشکلات کبد و کیسه صفرا، نفخ، آکنه (که سه ماه بعد از مصرف دارو از بین می رود)، حساسیت غیر طبیعی پستان ها به لمس و فشار، گیجی، تهوع و استفراغ، احتباس سدیم و مایعات، خستگی، افزایش موی صورت و بدن، افزایش حساسیت به نور و مشکلات بینایی، کاهش یا افزایش میل جنسی، ثورات و لکه های پوستی، قرمزی، افزایش یا کاهش وزن، افزایش احتمال سکنه قلبی و مغزی، عدم تحمل لنزهای تماسی، عوارض قلبی عروقی در زنانی که دخانیات مصرف می کنند یا عوامل خطرزایی مانند بیماری عروق کرونر و فشار خون بالا، کلسترول و چربی خون بالا، چاقی و دیابت دارند بیشتر است.

این احتمال در زنان سالم زیر ۳۰ سال بسیار کم است ولی با افزایش سن به بالای ۳۵ سال و استفاده طولانی مدت و مصرف زیاد دخانیات افزایش می یابد.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد و درون جعبه نگهداری نمایید.



BRC/P-SH29-01/01

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۵۵۴۹۰ داخلی ۳۵۸

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

کنتراسپتو دی ای (دزوژسترل + اتینیل استرادیول)

(دزوژسپتو)

Desoceptive

Contraceptive DE

F.C. Tablet

دزوژسپتو

کنتراسپتو دی ای

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

– این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

– وجود هر نوع آلرژی به استروژن ها، پروژستین ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، رنگ ها و مواد محافظ.
– در صورت مصرف داروهایی مانند کورتیکواستروئیدها، سیکلوسپورین، القاء کننده های آنزیم های کبدی، ریتوناویر، تنوفیلین، پیوگلیتازون، آنتی کوآگولانت ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای، آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد قارچ، سایمتیدین، دیلتیازم، وراپامیل، کاربامازپین، باریتورات ها، فنی تونین، ترانگزامیک اسید، سلژیلین، لاموتریژین، والپروات سدیم و آتورواستاتین.

در صورت ابتلا، به بیماری هایی نظیر سرطان سینه و رحم، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری عروق کرونر، نئوپلازی وابسته به استروژن، بیماری کبدی، اختلالات صفراوی، تومورهای کبدی، یرقان انسدادی، ترومبوز، ترومبوفلیت، اختلالات ترومبوآمبولیک و خونریزی های غیر طبیعی رحم، دیابت ملیتوس، صرع، افزایش فشارخون، سردردهای میگرنی و افسردگی.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

– در طول ۳ ماه اول مصرف ممکن است خونریزی نامنظم شود و احتمال لکه بینی نیز باشد که در صورت ادامه آن باید به پزشک معالج مراجعه شود.

– توصیه می شود که فاصله مصرف ۲ قرص متوالی بیش از ۲۴ ساعت نباشد.

– در اولین دوره مصرف این دارو، در ۷ روز اول از یک روش جلوگیری دیگر هم استفاده نمایید.

– دارو را در ساعت معین و ترجیحاً با غذا میل کنید.

– در هنگام مصرف دارو از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب خودداری نمایید.

– در صورت مشکوک شدن به بارداری مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

مصرف در دوران بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع می باشد.

مصرف در دوران شیردهی:

این دارو باعث تغییراتی در کیفیت و کمیت شیر مادر می گردد. همچنین مقدار کمی از دارو وارد شیر مادر شده و مدارکی دال بر اثرات این دارو بر روی شیرخوار گزارش شده است. لذا مصرف آن در این دوران توصیه نمی گردد مگر با نظر پزشک معالج.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو بدین صورت می باشد: روزانه یک عدد از اولین روز پریود (یکی از ۵ روز اول) به مدت ۲۱ روز مصرف می شود و پس از یک وقفه ۷ روزه مجدداً مصرف ۲۱ قرص بعدی آغاز می گردد. (حتی اگر خونریزی قطع نشده باشد) در صورت فراموش نمودن یک دوز به محض یادآوری قرص بعدی را در وقت مقرر همان روز مصرف نمایید. در این صورت ممکن است در یک روز ۲ قرص مصرف شود.

اگر دو نوبت مصرف دارو را فراموش کردید و این دو نوبت مربوط به هفته های اول و دوم باشد روز یادآوری ۲ قرص و روز بعد نیز ۲ قرص مصرف نمایید. سپس روزانه یک قرص در زمان های مقرر استفاده نمایید. همچنین جهت اطمینان از یک روش ضد بارداری دیگر نیز استفاده کنید.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:

سرگیجه، تهوع، تغییر در الگوی خونریزی قاعدگی، ادم، دپرسیون، سردرد، تغییرات پستان (ترشح، بزرگ شدن)، عفونت های واژینال، تغییرات وزن (کاهش یا افزایش)، عدم تحمل نسبت به لنزهای تماسی، افزایش و یا کاهش موهای صورت و بدن، ملامسا، راش، شکم درد و کاهش تحمل به کربوهیدرات ها.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و در جای خشک نگهداری نمایید.



BRC/ P- SH25- 01/ 02

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری : ۱۹ - ۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸

کلومیفن سترات (اوومید)

قرص اوومید

کلومیفن سترات ۵۰ میلی گرم

راهنمای عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران حتی در صورتی که علایم مشابه یا شما دارند خودداری فرمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا سایر دارو ها و مواد دیگر از قبیل غذا ها، مواد محافظ، رنگ ها و حیوانات.
- در صورت مصرف الکل، تنباکو و هر داروی دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با یا بدون نسخه مصرف می کنید.
- در صورت ابتلا به هر بیماری دیگر به ویژه: اندومتريوز یا سرطان اندومتر، تومورهای فیبروئیدی رحم، اختلال عملکرد کبدی؛ افسردگی، سندروم تخمدان پلی کیستیک یا حساسیت به گنادوتروپین های هیپوفیز.
- بارداری و شیردهی.
- پیش از شروع درمان شما باید از نظر مقادیر استروژن، عملکرد تخمدان و هیپوفیز، ابتلا به اندومتريوز یا سرطان اندومتر، فیبروئیدهای رحمی و وجود سایر عوامل نابرابری مورد ارزیابی قرار بگیرید.

موارد منع مصرف:

حساسیت به کلومیفن سترات یا هر یک از اجزا، فرمولاسیون، بارداری، بیماری کبدی یا سابقه اختلال عملکرد کبد، خونریزی غیر عادی رحمی، افسردگی، کیست و بزرگی تخمدان (غیر مرتبط با سندروم تخمدان پلی کیستیک)، ترومبوفلیت (فعال)، کم کاری یا پر کاری کنترل نشده تیروئید یا اختلال عملکرد آدرنال، وجود ضایعه داخل جمجمه مانند تومور هیپوفیز، تومورهای وابسته به هورمون.

نکات قابل توجه هنگام مصرف:

- پیش از آغاز هر دوره از درمان انجام معاینات لگنی اهمیت دارد. قبل از شروع درمان باید از عدم بارداری اطمینان حاصل کرد.
- در حین مصرف دارو بطور مرتب به پزشک مراجعه نمایید.
- دارو را مطابق دستور پزشک و در زمان مشخصی از روز مصرف نمایید.
- در صورت داشتن قاعدگی، درمان را از روز پنجم دوره آغاز نمایید، برای این منظور روز اول قاعدگی خود را به عنوان روز اول در نظر بگیرید در غیر این صورت می توانید درمان را از هر روزی آغاز نمایید.
- برای تعیین زمان تخمک گذاری، لقاح و اقدام به بارداری از پزشک خود راهنمایی گرفته و به توصیه های ایشان عمل نمایید.
- در صورت شک به باردار شدن سریع مصرف دارو را متوقف کرده و به پزشک اطلاع دهید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل بینایی مصرف دارو را متوقف و به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت بروز درد و نفخ شکمی، درد لگنی، تهوع، استفراغ، اسهال و افزایش وزن سریعاً به پزشک اطلاع دهید.
- این دارو ممکن است باعث تاری دید، مشکل در خواندن یا سایر تغییرات در بینایی، سرگیجه یا سبکی سر شود. بنابراین پیش از انجام رانندگی، استفاده از ماشین آلات یا انجام هرکاری که نیاز به هوشیاری دارد از عدم بروز این عوارض مطمئن شوید و در صورت بروز از انجام این فعالیت ها اجتناب نمایید.
- در صورت فراموش کردن مصرف یک دوز از دارو، به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید اما چنانچه زمانی تا مصرف نوبت بعد باقی نمانده بود، هر دو دوز را با هم مصرف نمایید. در صورت فراموشی بیش از یک دوز، با پزشک خود مشورت نمایید.
- میان دوره های درمان باید به منظور اطمینان از عدم بارداری و عدم بزرگی یا ایجاد کیست تخمدان

مورد ارزیابی قرار بگیرید و دوره بعد درمان تا مشخص شدن نتایج این بررسی ها باید به تعویق بیفتد.

- استفاده از این دارو باعث افزایش وقوع بارداری چند قلوایی و به دنبال آن زایمان زودرس، بارداری خارج رحمی و بارداری هتروتوپیک می گردد.

- چنانچه بعد از ۴-۳ دوره درمان با حداکثر دوز این دارو تخمک گذاری انجام نشد و یا ۶-۳ ماه بعد از درمان علیرغم تخمک گذاری بارداری اتفاق نیفتاد یا قاعدگی ایجاد نشد ادامه درمان با این دارو توصیه نمی شود. استفاده طولانی مدت ممکن است خطر بروز تومورهای تخمدان را افزایش دهد.

مصرف در دوران بارداری:

دسته بندی FDA برای مصرف این دارو در دوران بارداری X می باشد و مصرف آن در زنان باردار ممنوع می باشد.

مصرف در دوران شیردهی:

ترشح این دارو در شیر انسان نامعلوم می باشد و تجویز آن در دوران شیردهی باعث کاهش تولید شیر می شود لذا تجویز آن به زنان شیرده باید با احتیاط صورت پذیرد.

موارد مصرف:

این دارو برای درمان نابرابری ناشی از اختلال عملکرد تخمدان در زنان استفاده می شود.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: ۵۰ میلی گرم (۱ قرص) یک بار در روز به مدت ۵ روز. سپس در صورت عدم تخمک گذاری و در صورت نیاز به فاصله حداقل ۳۰ روز از دوره اول درمان، ۱۰۰ میلی گرم (۲ قرص هم زمان) یک بار در روز به مدت ۵ روز. در اکثر بیماران تخمک گذاری در دوره اول درمان اتفاق می افتد و ۳ دوره درمان به عنوان درمان کافی در نظر گرفته می شود. درمان طولانی مدت (بیش از ۶ دوره) توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر عارضه ای به ویژه عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

بزرگی و یا کیست تخمدان، سندروم پیش از قاعدگی، اختلالات بینایی، زرد شدن چشم ها یا پوست، گرگرفتگی، ناراحتی پستان، سرگیجه یا سبکی سر، منوراژی (افزایش مقدار خونریزی قاعدگی) یا خونریزی بین قاعدگی، افسردگی، سر درد، عصبی شدن، بی قراری، خستگی، افزایش اشتها، بیوست، مشکلات پوستی مانند درماتیت یا راش پوستی، تکرر ادرار یا افزایش حجم ادرار، بی خوابی، خشکی واژن، کاهش یا افزایش وزن، مشکلات قلبی-عروقی یا کبدی، دردهای عضلانی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، گرما، رطوبت، دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و درون ظرف دربسته نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.



BRC/ P- S046- 01/ 02

کلسیم کربنات + ویتامین د۳ (ویتاکلسیک)

Vitacalcic

Calcium - D3

F.C. Tablet

ویتاکلسیک

کلسیم - د۳

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح فرآورده

- این فرآورده صرفاً مکمل تغذیه ای بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی باشد.
- مصرف کلسیم کافی در رژیم غذایی به همراه فعالیت ورزشی مناسب به خصوص در سال های اول زندگی تا ۳۵ سال نقش مهمی در تولید استخوان های محکم دارد.
- این فرآورده صرفاً جهت کمک به سلامت استخوان ها می باشد.
- مواد جانبی: آنروسیل ۲۰۰، اتانول ۹۶٪، کراس کارملوز سدیم، پوویدون K30، متیزیم استئارات.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف فرآورده

- در صورت مصرف سایر فرآورده های حاوی کلسیم و ویتامین د۳ پزشک را در جریان قرار دهید.
- در صورت وجود بیماری های قلبی، فیبریلاسیون بطنی، هیپرکلسمی، ازدیاد کلسیم در ادرار، پرکاری و کمکاری پاراتیروئید، سارکوئیدوز، بیماری کلیوی یا سنگ کلیه و اسهال پزشک را مطلع کنید.
- از مصرف این فرآورده یک تا دو ساعت پس از مصرف سایر داروهای خوراکی خودداری کنید.
- فرآورده را با یک لیوان پر از آب یا آب میوه مصرف کنید.
- بهترین زمان مصرف فرآورده یک تا یک و نیم ساعت پس از مصرف غذا است مگر اینکه پزشک دستور دیگری داده باشد. در صورتی که پزشک این فرآورده را تجویز کرده است برای بررسی پیشرفت درمان به طور مرتب به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت مصرف مواد غذایی حاوی فیبر و غلات قرص ویتامین د۳ را یک تا دو ساعت بعد مصرف کنید.
- در صورت مصرف هم زمان داروهایی مانند: دیگوکسین، اتیدرونات، فنی توئین و تتراسایکلین ها با مکمل های حاوی کلسیم با پزشک خود مشورت نمایید.
- از مصرف بیش از حد نوشابه های حاوی کافئین و استعمال دخانیات خودداری شود.

مصرف در بارداری

توصیه می شود مصرف این فرآورده در دوران بارداری زیر نظر پزشک معالج صورت گیرد.

مصرف در شیردهی

توصیه می شود مصرف این فرآورده در دوران شیردهی زیر نظر پزشک معالج صورت گیرد.

مقدار و نحوه مصرف فرآورده

بزرگسالان: یک تا سه قرص در روز به طور منقسم.
کودکان (۹ تا ۱۸ سال): یک قرص در روز.
زنان باردار و شیرده: یک قرص در روز.
برای کمک به درمان کمبود کلسیم، مقدار مصرف در هر بیمار بر اساس شدت کمبود آن توسط پزشک تعیین می گردد.
این فرآورده نیاز به ویتامین د۳ روزانه شما را با توجه به مقدار ذکر شده فوق تامین نمی کند و در این خصوص باید با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی

هر فرآورده به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود (خصوصاً این فرآورده عوارض جانبی نادر دارد) ولی در صورت مصرف مقادیر زیاد به مدت طولانی در بیماران کلیوی ممکن است عوارضی مشاهده شود. در صورت بروز هر کدام از علایم زیر بلافاصله به پزشک مراجعه کنید:

خواب آلودگی (بسیار نادر)، تهوع و استفراغ مداوم، ضعف، اشکال در دفع ادرار.

علایم سریع مصرف بیش از حد شامل یبوست، خشکی دهان، سردرد مداوم، تشنگی زیاد، تحریک پذیری، کاهش اشتها، افسردگی، احساس طعم فلزی در دهان، ضعف و خستگی می باشد.

علایمی که در طولانی مدت بر اثر مصرف بیش از حد مشاهده می شوند: توهم، خواب آلودگی شدید، بالا رفتن غیر عادی فشار خون، حساسیت چشم و پوست به نور، ضربان قلب سریع یا کند و نامنظم، تکرر ادرار یا افزایش حجم ادرار.

شرایط نگهداری

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- فرآورده را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۰۹-۱۷۰۵۵۹۰۴۴ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SC09- 01/ 06

کلسیم کربنات + منیزیم هیدروکساید + زینک سولفات + ویتامین د ۳

(بن کر)

بن کر

Bonecare

Calcium+ Magnesium+ Zinc+ Vit D₃

کلسیم، منیزیم، زینک+ ویتامین د ۳

F.C. Tablet

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح فرآورده:

این فرآورده مکمل تغذیه ای بوده و شامل مقادیر مورد نیاز روزانه کلسیم، منیزیم، زینک و ویتامین د₃ می باشد که در جهت کمک به سلامت استخوان ها، دندان ها و بافت های بدن کاربرد دارد و جنبه ی تشخیصی، درمانی و یا پیشگیری از ابتلا به بیماری ها را ندارد.

بدن برای ساخت استخوان های محکم و همچنین عملکرد قلب، عضلات و سیستم عصبی به کلسیم نیاز دارد. مکمل های کلسیم بایستی توسط کسانی مصرف شوند که قادر به دریافت مقدار کافی کلسیم به صورت منظم از طریق رژیم غذایی شان نیستند و یا کسانی که تحت تاثیر مصرف برخی داروها و یا شرایط زمینه ای (هایپوکالسمی، دوران بارداری و شیردهی، یانسی، کودکان و سالمندان) نیاز بیشتری به دریافت کلسیم دارند.

مصرف مقدار کافی از منیزیم، برای جذب روده ای و استخوانی کلسیم مورد نیاز می باشد. منیزیم برای فعالیت بسیاری از آنزیم ها به خصوص آنزیم های مرتبط با فسفریلاسیون اکسیداتیو و سیستم های آنزیمی ضروری برای کاهش رادیکال های اکسیژن مورد نیاز می باشد.

ویتامین د₃ جهت استحکام استخوان و دندان کاربرد دارد و همچنین به پیشگیری در از دست دادن کلسیم بافت استخوان ها کمک می نماید.

زینک به رشد طبیعی و ترمیم بافتی کمک نموده و همچنین به عنوان قسمتی از آنزیم های مهم در متابولیسم پروتئین ها و کربنات ها عمل می نماید.

مواد جانبی: آویسل، کراس کارملوز سدیم، پوویدن، منیزیم استئارات، نشاسته ذرت

قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– در صورت وجود هر نوع حساسیت و یا سابقه آلرژی به هریک از اجزاء سازنده فرآورده و یا سایر غذاها و مواد محافظت کننده.

– در صورت مصرف سایر فرآورده هایی که حاوی مقادیر زیاد کلسیم، فسفات، زینک، منیزیم و ویتامین د₃ می باشند.

– در صورت ابتلا به بیماری هایی مانند اختلالات گوارشی، بیماری های قلبی-عروقی، هایپرکالسمی، هایپرکالمی، ازدیاد کلسیم ادرار، پرکاری و کم کاری غده پاراتیروئید، سارکوئیدوز، بیماری های کلیوی و وجود سنگ کلیه.

– در صورت مصرف سایر داروها مانند دیورتیک های تیازیدی، گلیکوزیدهای دیژیتال مانند دیگوکسین، فنی توئین، تتراسایکلین ها، اتیدرونیوت، گالیم نیترات، فلوروکینولون ها، سلولز سدیم فسفات، منیزیم سولفات، آنتی اسیدهای حاوی منیزیم، الکل، سدیم پلی استیرن سولفونات.

– در دوران بارداری، شیردهی و یا در افراد مسن.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف فرآورده:

– از مصرف بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک خودداری نمایید.

– بهترین زمان مصرف این فرآورده یک تا یک ساعت و نیم پس از صرف غذا می باشد مگر اینکه پزشک معالج دستور دیگری را توصیه نموده باشد.

– این فرآورده را بایستی با یک الی دو ساعت فاصله از سایر داروهای خوراکی مصرف نمایید.

– این فرآورده را بایستی با یک الی دو ساعت فاصله از مواد غذایی حاوی غلات و نان های سیوس دار مصرف نمایید.

– توصیه می گردد این مکمل تغذیه ای را با یک لیوان آب و یا آب میوه میل نمایید.

– در دوران مصرف این فرآورده مصرف الکل، نوشیدنی های حاوی کافئین و یا تنباکو را کاهش دهید.

– منیزیم ممکن است باعث تشدید بیماری های قلبی-عروقی موجود در بیمار گردد.

مقدار و نحوه مصرف فرآورده:

مصرف روزانه دو قرص از این فرآورده، به طور معمول نیاز روزانه افراد بزرگسال به کلسیم، منیزیم، ویتامین د₃ و زینک را تامین می نماید.

عوارض جانبی:

عوارضی مربوط به این فرآورده در دوزهای توصیه شده مشاهده نشده است. به طور کلی عوارض زمانی بروز می نماید که فرآورده با دوزهای زیاد، به مدت طولانی و یا در زمانی که فرد دارای بیماری زمینه ای کلیوی است مصرف شود که عوارض آن شامل موارد زیر می باشد:

عوارض اولیه در مصرف بیش از حد (over dose): پیوست، خشکی دهان، سردرد، عطش و تشنگی، کاهش اشتها، افسردگی، خستگی و یا ضعف غیرعادی، درد استخوانی، اسهال، گیجی، تکرر ادرار و یا افزایش حجم ادرار به خصوص در شب ها، خارش پوستی، ضریان نامنظم قلب، درد عضلانی، حالت تهوع و استفراغ.

عوارض تاخیری در مصرف بیش از حد (over dose): گیجی، افزایش فشار خون، افزایش حساسیت چشم و پوست به نور، ضریان نامنظم قلب، تب بالا، درد شدید معده، درد استخوانی، توده استخوانی در بافت خارج استخوانی، کدر شدن ادرار، کاهش اشتها، کاهش میل جنسی، تغییرات خلق و خو، درد عضلانی، تهوع و استفراغ، وجود پروتئین در ادرار، قرمزی و یا ریزش اشک از چشم، قرمزی پلک، آبریزش بینی، کاهش وزن، خارش پوستی.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

توصیه می شود مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی زیر نظر پزشک صورت گیرد.

شرایط نگهداری:

– فرآورده را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف فرآورده پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران
تلفن مدای مشتری: ۰۹-۵۵۱۷۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC P-SCS6-01/06

آمپول کتورولاک ترومتامین (کلاتوزکس- آی اچ ۱۵ و ۳۰)

کتورولاک ۱۵ و ۳۰ کلاتوزکس- آی اچ Injectable Solution

محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- در صورت ابتلا به سایر بیماری ها به ویژه: هر واکنش حساسیتی غیر عادی به این دارو یا هر دارو و ماده دیگر، بیماری های قلبی-عروقی یا داشتن فاکتورهای خطر برای این بیماری ها، فشار خون بالا، دیابت ملیتوس یا داشتن رژیم کم شیرینی، ادم، مشکلات کبدی/ صفراوی/ کلیوی/ پانکراتیت یا سابقه ابتلا به آنها، سابقه خانوادگی ابتلا به آسم/ پولیپ های بینی/ سینوزیت مزمن یا کبیر، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، هموفیلی یا سایر مشکلات خونریزی دهنده، خونریزی مغزی، نوشیدن الکل، مصرف یا سابقه مصرف تنباکو یا سیگار، گلویت، زخم معده یا سایر مشکلات گوارشی، هایپوولمی، سیسپیس، هپاتیت، انسداد صفرا، از دست دادن بینایی، بارداری، اختلال بافت پیوندی و تصمیم به بارداری.

- در صورت مصرف داروهای دیگر به ویژه: ضدانقباضها (مانند وارفارین) یا هیارین یا عوامل ترومبولیتیک (مانند استروکتیکاز)، دیگوسین، آسپرین یا سایر سالیسیلات ها، داروهای ضد التهاب غیر استرویدی (مانند ایبوپروفن و دیکلوفناک)، داروهای ضد فشار خون یا ادرارآور (مانند فوروزماید)، مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین، داروهای ضد صرع (فنی توئین، کاربامازپین)، مکمل های پتاسیم، والپروئیک اسید، ترکیبات طلا، مهارکننده های تجمع پلاکتی (مانند کلوپیدوگرل)، پروبنسید، لیتیم، متوترکسات، پتوکسی فیلین، استامینوفن، کورتیکواستروئیدها (مانند پردنیزولون)، داروهای ایجاد کننده سمیت کلیوی، سفالوسپورین ها (سفامندول، سفوپرازون، سفوتتان)، داروهای ضد افسردگی، روانگردان و مهارکننده های انتخابی باز جذب سروتونین (برای مثال فلوکستین، تیوتیکسن، آلپرازولام، پاروکستین و سرتراپین)، شل کننده های عضلانی، کورتیکوتروپین، مورفین و سیکلوسپورین.

-مصرف این دارو در سالمندان با احتیاط صورت پذیرد.

مصرف کتورولاک در موارد زیر منع مصرف دارد:

حساسیت به کتورولاک ترومتامین یا سایر ترکیبات فرمولاسیون، ابتلا یا سابقه ابتلا به زخم پپتیک یا کولیت اولسراتیو یا پرفوریشن یا خونریزی گوارشی، درمان درد پیش از جراحی در جراحی پیوند عروق کرونر، نارسایی شدید کنترل نشده قلبی، ابتلا به بیماری کبدی یا اختلال پیشرفته کلیوی یا داشتن ریسک نارسایی کلیوی ناشی از کمبود حجم مایعات، مقادیر بالای پتاسیم در خون، جراحی یا ریسک خونریزی بالا و یا داشتن سایر مشکلات خونریزی دهنده، خونریزی مغزی و احتمال آن، هموستاز ناقص، پیشگیری از درد پیش از هر جراحی یا در طی جراحی که هموستاز حیاتی است، درد زایمان، کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال، مصرف هم زمان با پروبنسید، پتوکسی فیلین یا مصرف اخیر آسپرین یا سایر داروهای ضدالتهاب غیر استرویدی، پولیپ بینی مرتبط به برونکواسپاسم، سه ماهه سوم بارداری و حجم کم مایعات بدن.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- هنگام مراجعه به پزشک، دندانپزشک، داروساز و یا هر درمانگر دیگری، مصرف این دارو را اطلاع دهید، به ویژه اگر قصد انجام جراحی قلبی-عروقی دارید.
- در صورت بروز سرگیجه و خواب آلودگی از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث بروز حساسیت بیشتر به نور خورشید یا لامپ خورشیدی شود.
- از مصرف مشروبات الکلی هنگام مصرف این دارو اجتناب نمایید.
- از اختلال کتورولاک و نارکوتیک ها مانند مورفین، میریدین، پرومتازین یا هیدروکسی زین در حجم کم (مانند یک سرنگ) پرهیز نمایید.

موارد، مقدار و نحوه مصرف دارو:

کلاتوزکس - آی اچ در بزرگسالان برای درمان کوتاه مدت (تا ۲ روز) درد حاد نسبتاً شدید که نیاز به استفاده از داروهای ضد درد اپیوئیدی دارد (معمولاً درد پس از جراحی) استفاده می شود و برای دردهای خفیف و مزمن کاربرد ندارد.

- بزرگسالان با وزن بیشتر از ۵۰ کیلوگرم:

۶ میلی گرم تک دوز بصورت عضلانی عمیق یا ۳۰ میلی گرم به صورت وریدی (حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه)، یا هر ۶ ساعت ۳۰ میلی گرم به صورت عضلانی عمیق یا وریدی (حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه) تزریق شود به طوری که روزانه بیش از ۱۲۰ میلی گرم استفاده نگردد.

- بزرگسالان با وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم یا سالمندان یا افراد دارای اختلال عملکرد کلیوی:

۳۰ میلی گرم تک دوز به صورت عضلانی عمیق یا ۱۵ میلی گرم به صورت وریدی (حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه)، یا هر ۶ ساعت ۱۵ میلی گرم به صورت عضلانی عمیق یا وریدی (حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه) تزریق شود به طوری که روزانه بیش از ۶۰ میلی گرم استفاده نگردد.

- تزریق وریدی باید حداقل طی مدت ۱۵ ثانیه و تزریق عضلانی به صورت عمیق و آهسته انجام پذیرد.

- از تزریق اپیدورال یا اینتراتکال دارو خودداری نمایید.

مصرف در دوران بارداری:

این دارو در بارداری در رده C قرار دارد. تجویز این دارو از هفته ۲۰ بارداری و بیشتر صرفاً در صورت ضرورت و ملاحظه پزشک و در کمترین دوز و کوتاه ترین دوره مصرف موثر، باید صورت گیرد.

مصرف در دوران شیردهی:

* مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر عارضه ای به ویژه عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

ادم، افزایش یا کاهش فشار خون، علایم شبه آنفولانزا، زخم یا نقاط سفید روی لب و یا داخل دهان، نقاط قرمز کوچک روی پوست، سوزش (غیر از ناحیه تزریق)، تکرر ادرار، کاهش شنوایی، وزوز گوش، تب همراه یا بدون لرز یا گلو درد، احساس عمومی بیماری، حساس شدن یا تورم ناحیه بالایی شکم، آنافیلاکسی یا واکنش آنافیلاکتیک، سوزش/قرمزی/ضخیم و پوسته پوسته شدن پوست، درد یا گرفتگی عضله، تورم زبان یا مخاط دهان، تشنگی مداوم، غدد متورم یا دردناک، ترومبوسایتوپنی، تغییر حالت یا رفتار غیرمعمول، بی قراری شدید، آبریزش یا خونریزی بینی، خونریزی از زخم پس از جراحی، منژیته آسپتیک، برقان کلساتیک، درد پشت یا پهلو، زخم پپتیک و خونریزی گوارشی و یا پرفوریشن معده و روده، سرخه یا گرفتگی صدا، مدفوع رنگ پریده، تومور، رنگ پریدگی، یف اطراف چشم، سوزش معده، سمیت کلیوی.

- در صورت بروز علایم بالینی اختلال کبدی یا علایم سیستمیک (مانند آنوزینوفیلی یا راش پوستی)، کبیر، تورم یا خارش پوست، زرد شدن پوست یا چشم ها همراه یا بدون خارش، هرگونه تغییر در مقدار یا رنگ ادرار (قرمز یا قهوه ای)، درد یا سختی هنگام دفع ادرار، تورم یا یا اندام انتهایی، افزایش وزن غیر عادی، ضعف، خواب آلودگی، کاهش اشتها، سر درد، سفتی گردن یا پشت، افسردگی، گیجی، تاری دید یا سایر مشکلات بینایی، زخم های خونریزی دهنده یا کیره ای روی لب ها، آبی شدن لب و ناخن، تشنج، غش کردن، تنگی نفس و یا وجود مشکلات تنفسی و یا خس خس کردن، ادم، درد شدید معده یا شکم یا پشت، خونریزی از مقعد یا مدفوع تیره یا خونی، استفراغ خونی، یبوست، اسهال، سرگیجه، سبکی سر، مشکلات شنوایی، سو، هاضمه مزمن، تهوع، استفراغ، نفخ، احساس پری ناحیه شکم، تعریق زیاد، درد یا سنگینی قفسه سینه، ضربان قلب تند یا نامنظم و گرگرفتگی غیر معمول، مصرف دارو را متوقف و به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- این محصول به صورت محلول شفاف و متمایل به زرد می باشد. در صورت تغییر رنگ یا وجود ذره در آمپول از مصرف آن خودداری نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.



ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران
تلفن صدای مشتری: ۹-۱۷۰۵۵۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸

قرص کتورولاک ترومتامین (کلاتوزکس-آی اچ)

Kelatozex-IH 10

کلاتوزکس-آی اچ ۱۰

Ketorolac

کتورولاک

F.C. Tablet

قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- حساسیت به کتورولاک، آسپیرین و سایر داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی.
- ابتلا به بیماری هایی مانند اولسر پپتیک، اختلال عملکرد کلیوی و سابقه ابتلا به خونریزی، بارداری و شیردهی.
- در صورت مصرف داروهایی مانند ضد انعقادها، آسپیرین یا سایر سالیسیلات ها، داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی، سفالوسپورین ها، لیتیم، متوترکسات، پروبنسید، والپروئیک اسید، بیس فسفونات ها، کلستیرامین، مهارکننده های آنزیم مبدل آترئوتانسین، آمینوگلیکوزیدها، بتابلاکرها، سیکلوسپورین، دیورتیک ها و فنی تونین.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- جهت کاهش عوارض گوارشی، دارو را با غذا یا همراه با یک آنتی اسید و با یک لیوان آب میل نمایید، همچنین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه پس از مصرف دارو از دراز کشیدن خودداری نمایید.
- از مصرف دو یا چند داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) به طور هم زمان خودداری نمایید.
- در صورت مشاهده علایمی مانند ادم، خونریزی گوارشی، مشکلات قلبی-عروقی، افزایش وزن غیر عادی و بثورات پوستی سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت بروز خستگی و خواب آلودگی از رانندگی و کار با لوازمی که نیاز به هوشیاری دارند پرهیز نمایید.
- داروی کتورولاک در اولسر پپتیک فعال، خونریزی اخیر گوارشی، نارسایی پیشرفته کلیه، خونریزی مشکوک یا قطعی مغزی، هموستاز ناقص، پورفیریای هیپاتیک و در افراد پر خطر از نظر خونریزی و بیماری که به آسپیرین و سایر داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی حساسیت دارند منع مصرف دارد. این دارو ریسک حمله قلبی را افزایش می دهد لذا در افراد مبتلا به بیماری قلبی باید با احتیاط مصرف شود.
- این دارو به هیچ وجه نباید جهت پیشگیری از درد، قبل از اعمال جراحی استفاده شود.
- از مصرف مشروبات الکلی و آسپیرین در هنگام مصرف این دارو اجتناب نمایید.
- در صورت مشاهده علایم سمیت کبدی مانند تب، خستگی، خارش، سستی، تهوع و درد شکمی به پزشک مراجعه نمایید.
- این دارو در برخی از افراد ممکن است حساسیت به نور ایجاد نماید لذا توصیه می شود در زمان مصرف دارو از ضد آفتاب استفاده شود.

موارد و مقدار مصرف دارو:

- این دارو جهت درمان کوتاه مدت (حداکثر ۵ روز) دردهای نسبتاً شدید حاد کاربرد داشته و در درمان دردهای مزمن و خفیف کار نمی رود، مصرف خوراکی این دارو معمولاً به دنبال تجویز تزریقی آن صورت می گیرد.
در افراد ۱۶-۶۴ سال
- با وزن بیشتر از ۵۰ کیلو گرم و بدون اختلال کلیوی:
دوز اولیه ۲۰ میلی گرم می باشد سپس ۱۰ میلی گرم ۴ مرتبه در روز (در فواصل ۴ تا ۶ ساعت) در صورت نیاز تجویز می شود.

- با وزن کمتر از ۵۰ کیلو گرم یا افراد دارای اختلال عملکرد کلیوی:
میلی گرم ۴ مرتبه در روز (در فواصل ۴ تا ۶ ساعت) در صورت نیاز تجویز ۱۰ می شود.
حداکثر دوز مصرفی در بزرگسالان ۴۰ میلی گرم در روز می باشد. طول دوره مصرف نباید از ۵ روز تجاوز نماید.
ایمنی و اثر بخشی مصرف این دارو در افراد زیر ۱۶ سال به اثبات نرسیده است.

مصرف در بارداری:

این دارو در بارداری در رده C قرار دارد. بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی حاکی از تاثیر سو، بر روی جنین است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد.
بنابراین مصرف این دارو در دوران بارداری بخصوص سه ماهه سوم توصیه نمی شود.

مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، اما در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:
ادم، افزایش یا کاهش فشار خون، بثورات پوستی، زخم لب و دهان، واکنش های آنافیلاکتیک، آتمی، مننژیت آسپتیک، آسم، برونکواسپاسم، کوتاه شدن تنفس، خونریزی زخم پس از جراحی، مدفوع خونی، اختلال در بینایی، یرقان کلستاتیک، تشنج، انوزینوفیلی، درماتیت اکسفولیاتیو، سنگوپ، تب، درد پهلو همراه یا بدون وجود خون در ادرار، مشکلات گوارشی، زخم و خونریزی گوارشی، توهم، اختلال شنوایی، اختلالات کبدی، کهیر، بیش فعالی، تکرر ادرار، افزایش یا کاهش حجم ادرار، لکوپنی، افسردگی، اختلالات کلیوی، خونریزی بینی، پانکراتیت، سایکوز، خونریزی از مقعد، آبریزش بینی، سندرم استیونس جانسون، ترومبو-سیتوپنی، وزوز گوش و نکرولیز اپیدرمال سمی.
همچنین در صورت تداوم یا بدتر شدن عوارض زیر به پزشک مراجعه نمایید:
درد شکمی، اسهال یا یبوست، خواب آلودگی، سردرد، تهوع، استفراغ، سو، هاضمه و تعریق زیاد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن مدای مشتری: ۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷-۴۴۹۰۵۵۸ داخلی



گلی کلازید (کلازکس ۸۰)

Clazex 80

Gliclazide

Scored Tablet

کلازکس ۸۰

گلی کلازید

قرص خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به سولفونیل اوره ها، داروهای سولفونامیدی و دیورتیک های تیازیدی، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- در صورت مصرف داروهایی نظیر: آسپاریناز، بتابلاکرها، کلرامفنیکل، آنتی کوآگولانت ها، کورتیکواستروئیدها، کنتراستپتوها، دیورتیک ها، هورمون های تیروئیدی، مهار کننده های مونوآمینواکسیداز، سایمتیدین، ضدقارچ های آزولی، سیکلوسپورین، لیتیم، فلوروکینولون ها، رانیتیدین و سالیسیلات ها در دوزهای بالا و الکل.
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر:
- استفراغ طولانی مدت، اسهال شدید، تب بالا، عفونت حاد، بیماری های کبدی و کلیوی، پورفیری حاد، کمای دیابتیک و کمای هایپر اسمولار غیر کتونیک، کتواسیدوز، سوختگی شدید، تروما، هایپرآدرنالیزم کنترل نشده، نارسایی هیپوفیز، هایپر تیروئیدیسم کنترل نشده و سوء تغذیه.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- به طور مرتب به پزشک خود مراجعه نمایید.
- در صورت داشتن عفونت و جراحی حاد به پزشک خود اطلاع دهید.
- اگر مصرف یک قرص را فراموش کردید به محض یادآوری آن را مصرف نموده و سپس قرص بعدی را در وقت مقرر مصرف نمایید و در این صورت ممکن است در یک روز دو قرص را با هم مصرف نمایید و بقیه قرص ها را طبق روال معمول ادامه دهید.
- هنگام در معرض آفتاب قرار گرفتن از کرم های ضد آفتاب و لباس های محافظ در برابر آفتاب استفاده نمایید.
- به طور مرتب گلوکز خون را تحت کنترل داشته باشید.
- رعایت رژیم غذایی، تمرینات ورزشی و کاهش وزن هم زمان با مصرف این دارو از اهمیت فراوان برخوردار است.
- درمان دیابت به طور معمول برای تمام طول عمر می باشد.
- در صورت نیاز به جراحی پزشک خود را از مصرف دارو مطلع نمایید.
- در صورت مشاهده علائم هایپوگلیسمی شامل تعریق، ضعف، تکیکاردی، اضطراب، تاری دید، گیجی، رنگ پریدگی، گرگرفتگی شدید، سردرد، تهوع و عصبانیت می توان قند و یا مایعات شیرین مصرف نموده و به پزشک خود مراجعه نمایید.
- در صورت مشاهده علائم هایپرگلیسمی و کتواسیدوز مانند تاری دید، خستگی، خشکی دهان، پوست خشک و برافروخته، تنفس سریع و عمیق با بوی خاص (مشابه بوی استون)، افزایش حجم و تعداد دفعات دفع ادرار، تهوع، استفراغ و تشنگی مفرط سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

مقدار مصرف:

جهت درمان دیابت نوع دو:

دوز اولیه: ۱۶۰ میلی گرم دو بار در روز همراه غذا.

دوز نگهدارنده: ۸۰ تا ۳۲۰ میلی گرم در روز همراه غذا.

کودکان: دوز دارویی برای کودکان توسط پزشک تعیین می گردد.

مصرف در بارداری:

مطالعات بر روی انسان تاکنون انجام نشده است. ولی مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود.

مصرف در شیردهی:

در خصوص ورود این دارو به شیر مادر تاکنون مطالعاتی انجام نشده است. ولی مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

هایپو گلیسمی، نگرانی، اضطراب، عرق سرد، سردرد، تهوع، کابوس های شبانه، تب، زردی، دوبینی، واکنش های پوستی مانند: درماتیت اگسفالوپاتیو، پیوست و سوء هاضمه.

عوارضی که شیوع نادر دارند:

آتمی آپلاستیک، گرانولوسیتوز، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، مشکلات کبدی، هایپوناترمی (Dilutional) و سندرم ترشح نامتناسب هورمون آنتی دیورتیک و یرقان کلاستاتیک.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.



BRC/ P- SL36- 01/ 03

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۱۷۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸

لتروزول (لتروفم)

لتروفم ۲/۵

Letrofem 2.5

Letrozole

F.C. Tablet

لتروزول

قرص روکش دار

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

کوتاه شدن زمان دم و بازدم، درد سینه، عصبی شدن، سرفه، مشکلات ریوی، گیجی، افزایش ضربان قلب، حملات قلبی، اختلالات عروق مغزی، افزایش تعریق، سردرد ناگهانی، از دست دادن تعادل، احساس سرما، تورم پا، افسردگی، خونریزی واژینال، ضعف، حالت تهوع، درد پاها و کشاله ران، ریزش مو، ضعف و بی حسی در پاها و بازو، اختلالات بینایی، ضعف و شکنندگی استخوان ها، ادم محیطی، هایپرتانسیون، عفونت ویروسی، آمبولی ریوی، ترومبو آمبولی، درد عضله و مفاصل، گرگرفتگی.

عوارض زیر ممکن است با ادامه درمان قطع شود با این حال پس از مشاهده این عوارض با پزشک معالج خود مشورت نمایید:

اضطراب، گیجی، بیخوابی، اسهال، هایپرکلسمی با علائمی مانند (خشکی دهان، سردرد، افزایش ادرار، کاهش اشتها، کاهش وزن و وجود طعم فلزی در دهان)، خواب آلودگی، خستگی غیر معمول، استفراغ، درد معده، اشکال در به خواب رفتن، راش و خارش پوستی، افزایش آنزیم های کبدی و هایپرکلسترولمی.

از عوارض دیگر این دارو می توان به درد تومور، لکوپنی و به ندرت احتمال ابتلا به کارسینومای رحم اشاره نمود.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروی تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

- دارو را دور از رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۵۵۱۰۵۵۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SG24- 01/ 02

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به لتروزول، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

- در صورت بارداری و شیردهی.

- در صورت داشتن بیماری های کلیوی و کبدی و ابتلا به استئوپوروز.

- در صورت مصرف تاموکسیفن.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- این دارو را فقط طبق دستور پزشک مصرف نمایید.

- بهتر است در فواصل زمانی مشخص به پزشک خود مراجعه کنید تا بهبودی شما مورد بررسی قرار گیرد.

- اگر مصرف یک دوز را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید ولی در صورتی که زمان به یاد آوردن شما هم زمان با مصرف دوز بعدی بود فقط یک دوز این دارو را مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوز خودداری نموده و بقیه را مطابق با برنامه مصرف نمایید.

- این دارو ممکن است باعث سرگیجه و خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.

- بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) در طول مصرف دارو توصیه می گردد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

- درمان سرطان پستان در زنان یائسه: ۲/۵ میلی گرم یک بار در روز.

- از دیگر موارد مصرف این دارو تحریک تخمک گذاری جهت افزایش احتمال بارداری می باشد که مقدار آن توسط پزشک متخصص تعیین می گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

لیدوکائین هیدروکلراید

Lidocaine 2% Injectable Solution

لیدوکائین ۲٪ محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

تجویز این دارو می بایست زیر نظر پزشک صورت گیرد.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- حساسیت به هر یک از اجزاء سازنده دارو، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت مصرف داروهایی مانند: بتا بلاکرها، غیرانتخابی، داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی، کوکائین، گلیکوزیدهای دیژیتال، هالوپریدول، فنوتیازین ها، ضدافسردگی های سه حلقه ای، اپی نفرین، متوکسامین، فنیل افرین، سایمتیدین، فنی توفین، داروهای ضد ویروس، دیورتیک ها و شل کننده های عضلات.
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر آریتمی، نارسایی قلبی، اختلالات انعقادی، هایپرتانسیون، هایپرتریوئیدیسم، عفونت موضعی در محل تزریق، مت هموگلوبینمی، اختلالات سیستم عصبی مرکزی و بیماری های عروق محیطی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- لیدوکائین در بیماران مبتلا به هیپوولمی و بلوک قلبی ممنوعیت مصرف دارد.
- این دارو در افراد مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، اختلالات هدایتی قلب، برادی کاردی، پور فیری حاد، شوک شدید، میاستنی گراویس، نارسایی کبدی و کلیوی، سرعت و اختلالات تنفسی باید با احتیاط مصرف گردد.
- طی تجویز این دارو، بیمار را از نظر مسمومیت قلبی-عروقی، مسمومیت CNS و وضعیت هوشیاری کنترل کنید.
- در کودکان و افراد مسن، به علت خطر افزایش سمیت سیستمیک، دارو را با احتیاط تجویز نمایید.

موارد و مقدار مصرف دارو:

- آریتمی قلبی

بالغین: ابتدا ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم (1 mg/kg) به صورت یک جا و از طریق وریدی با سرعت ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم در دقیقه تجویز می شود و در صورت نیاز بعد از ۵ دقیقه همان دوز تکرار می گردد.

حداکثر دوز دارو ۳۰۰ میلی گرم (۴/۵ mg/kg) طی ۱ ساعت تجویز می شود. معمولاً پس از تزریق مستقیم وریدی، انفوزیون مداوم وریدی با دوز ۱ تا ۴ میلی گرم در دقیقه به عنوان دوز نگهدارنده صورت می گیرد.

اطفال: ابتدا ۱ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن با سرعت ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم در دقیقه به صورت یک جا و از طریق وریدی تزریق می گردد که در صورت نیاز بعد از ۵ دقیقه همان دوز قابل تکرار می باشد. دوز نگهدارنده در اطفال ۲۰ تا ۵۰ میکروگرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در دقیقه از طریق انفوزیون مداوم وریدی می باشد.

- آنستزی اپیدورال

۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم (۱۰ تا ۱۵ میلی لیتر) از محلول ۲٪

مصرف در بارداری و شیردهی:

لیدوکائین به سرعت از جفت عبور می نماید. اما از آنجاییکه مطالعات جامع و کنترل شده ای بر روی انسان انجام نگرفته است، لذا توصیه می شود مصرف این دارو در دوران بارداری با نظر پزشک معالج صورت گیرد. همچنین بی خطر بودن مصرف لیدوکائین در مادران شیرده ثابت نشده است.

عوارض جانبی:

شایع ترین عوارض جانبی این دارو مربوط به CNS و دستگاه قلبی-عروقی می باشد.

آنمی، درد پشت، برادی کاردی، آریتمی قلبی، درد سینه، یبوست، ضعف و خستگی، سردرد، افزایش یا کاهش فشار خون، کهیر، هایپوترمی، ناتوانی جنسی، بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع، تهوع، استفراغ، بی حسی، تشنج، راش پوستی، خارش، تاکی کاردی، دپرسیون تنفسی و انقباض عروق محیطی از عوارض این دارو می باشند.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن مدای مشتری: ۰۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷-۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



لوونورژسترل (لونژیل ۱/۵ و ۰/۷۵)

Longil

Levonorgestrel 0.75 & 1.5 mg
Tablet

لونژیل

لوونورژسترل ۰/۷۵ و ۱/۵ میلی گرم
قرص

راهتمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای جلوگیری از بارداری در شرایط اورژانسی (در خانم هایی که مقاربت پیشگیری نشده داشته باشند یا به روش پیشگیری مشکوک می باشند) مصرف می شود.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به پروژستین ها، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت داشتن هر نوع رژیم، مثل داشتن رژیم کم نمک یا کم شیرین.

– در صورت مصرف داروهای زیر:

آمینوگلوتمید، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی تونین، ریفامپین و ریفامپین.

– در صورت داشتن سابقه ابتلا به بیماری هایی مانند اختلالات ترومبوآمبولیک، ترومبوفلیت، بیماری های عروق مغزی و عروق کرونر، انفارکتوس میوکارد، سرطان رحم، تومورهای کبدی بدخیم یا خوش خیم، خونریزی واژینال با علت نامعلوم، هایپر تانسیون کنترل نشده، سردرد با علائم عصبی فوکال، دیابت همراه با مشکلات عروقی، یرقان کلستاتیک، سابقه یرقان در دوران بارداری، پورفیری حاد و همچنین در موارد قطعی یا مشکوک به سرطان سینه و در صورت انجام اعمال جراحی که نیاز به استراحت طولانی مدت دارد حتماً با پزشک خود مشورت نمایید، زیرا مصرف این دارو در این موارد ممنوع می باشد.

– در صورت حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– مصرف این دارو هیچ گونه اثر محافظتی در مقابل بیماری های آمیزشی نظیر HIV ندارد.

– چنانچه طی ۲ ساعت پس از مصرف دارو استفراغ رخ دهد، مصرف دارو می بایست تکرار شود.

این دارو در افراد دارای سابقه افسردگی، سندرم سو-جذب شدید، حاملگی خارج رحمی، بیماری های ترومبولاستیک (مربوط به جفت) و افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی، آسم و مرع می بایست با احتیاط مصرف شود.

– این نوع کنتراستپوها دقیقاً پس از مقاربت کنترل نشده مصرف می شوند و برای مصرف مداوم و طولانی بکار نمی روند.

مصرف در بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع می باشد.

مصرف در شیردهی: مصرف این دارو ۶ هفته پس از زایمان بلامانع می باشد.

مقدار مصرف دارو: ۱) در صورت استفاده از قرص ۰/۷۵ میلی گرم: اولین قرص هر چه زودتر پس از مقاربت مصرف شود. (فاصله و زمان مصرف قرص از زمان مقاربت نباید بیش از ۱۲۰ ساعت باشد) و قرص دوم درست ۱۲ ساعت پس از اولین قرص مصرف گردد. در صورتی که دو قرص هم زمان با هم مصرف شوند اثر بخشی بهتر می باشد. ۲) در صورت استفاده از قرص ۱/۵ میلی گرم: ۱ عدد قرص هر چه زودتر پس از مقاربت مصرف شود (فاصله و زمان مصرف قرص از زمان مقاربت نباید بیش از ۱۲۰ ساعت باشد). نکته: جدول زیر به میزان اثر بخشی استفاده از این روش در چند مرجع علمی اشاره دارد با توجه به مطالب ذکر شده در جدول تومیه می گردد جهت دست یابی به اثر بخشی بیشتر دارو به اصل استفاده ((هرچه زودتر، بهتر)) توجه گردد.

عوارض جانبی: هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

بیشترین عوارض جانبی مشاهده شده پس از مصرف این دارو تهوع، استفراغ، خستگی، سردرد، دردهای شکمی، حساس شدن پستان ها، اسهال و اختلال در قاعدگی می باشد.

شرایط نگهداری:

– دارو را درون جعبه، دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن مدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC P-SH9-02/02

اثر بخشی	مصفحه	رفرنس
مصرف قرص تا ۷۲ ساعت به میزان ۸۴٪ و استفاده حد فاصل ۷۳ تا ۱۲۰ ساعت تا ۶۳٪ حاملگی ناخواسته پیشگیری می کند.	۱۹۴	Handbook of Family Planning and Reproductive Healthcare-2008
در میان سیکل به دلیل احتمال بیشتر بارداری ۸۰-۷۰٪ و در سایر زمان ها بدون تفکیک بین ساعت مصرف ۹۶ تا ۹۸٪ بارداری پیشگیری می نماید. ضمن اینکه مصرف در فاصله زمانی ۷۲ تا ۱۲۰ ساعت فقط ۶۰ تا ۶۳٪ از بارداری ناخواسته جلوگیری می نماید.	۱۶۲	Handbook of Family Contraception and Reproductive Sexual Health-2008
بدون تفکیک بین ساعت مصرف این قرص تا ۹۹٪ از بارداری ناخواسته محافظت می نماید.	۴۶	Family Planning: A Global Handbook For Providers-2008
مصرف قرص تا ۷۲ ساعت تا ۹۸٪ و استفاده حد فاصل ۷۳ تا ۱۲۰ ساعت تا ۹۷٪ از حاملگی ناخواسته پیشگیری می کند. بر اساس محاسبات WHO هر ۱۲ ساعت تاخیر تقریباً ۵۰٪ بارداری ناخواسته را (بر مبنای ضریب شکست اولیه روش) افزایش می دهد.	۴۷۴ ۴۷۵	John Gullebaud Contraception-Year Questions Answered 2009
مصرف قرص تا ۷۲ ساعت تا ۹۷٪ از حاملگی ناخواسته پیشگیری می کند و استفاده حد فاصل ۷۳ تا ۱۲۰ ساعت تا ۸۸٪	۹۷	Contraception Tecnology-2008

لیوتیرونین ۲۵ میکروگرم

Liothyronine 25 mcg

Scored Tablet

لیوتیرونین ۲۵ میکروگرم

قرص خط دار

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

– وجود هر نوع حساسیت به هورمون‌های تیروئیدی و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها.
– در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر دیابت، تصلب شرائین، بیماری قلبی، بالا بودن فشار خون، سابقه پرکاری تیروئید، کم‌کاری غده فوق کلیه و غده هیپوفیز.
– در صورت حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک و همواره در زمان معینی از روز مصرف کنید.
– پیش از قطع مصرف دارو به پزشک خود مراجعه کنید.
– در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید. در صورتی که دو یا سه نوبت مصرف دارو را فراموش کردید به پزشک خود مراجعه کنید.
– در صورتی که هر نوع عمل جراحی (از جمله جراحی دندان) یا درمان اضطراری لازم باشد، باید پزشک را از مصرف این دارو آگاه کنید.
ضمناً در بکار بردن این دارو رعایت موارد زیر توصیه می‌شود:
– بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان این دارو با داروهایی نظیر آمفتامین، داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد اشتها، کلستیرامین، انسولین و داروهای پایین آورنده قند خون، سمپاتومیمتیک‌ها، استروئیدها و کنتراست‌یوهای خوراکی، گلیکوزیدهای دیژیتال، بتابلرها، آنتی‌اسیدها، سایمتیکون، سوکرالفت، آمبودارون، هورمون رشد، تنوفیلین، داروهای مربوط به آسم و سایر بیماری‌های تنفسی، داروهای سرماخوردگی و ضد آلرژی و فرآورده‌های حاوی الکل خودداری کنید.
– به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.
– در بیماران با نارسایی کلیوی و یا کاهش عملکرد کلیوی (سالمندان) مقدار دارو باید تعدیل شده و بیمار به طور مرتب پایش شود.

مصرف در بارداری:

مصرف مقادیر مناسب از این دارو هیچ گونه عوارض جانبی را بر روی جنین نشان نداده است. با این حال ممکن است پزشک معالج مقدار مصرف دارو را در دوران بارداری تغییر دهد بنابراین بهتر است در طول بارداری با پزشک معالج مشورت گردد.

مصرف در شیردهی:

مقدار ناچیز از دارو در شیر ترشح می‌شود ولی مصرف مقادیر مناسب از این دارو هیچ گونه عوارض جانبی را بر روی شیرخوار نشان نداده است.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
در کم‌کاری خفیف تیروئید بزرگسالان ابتدا ۲۵ میکروگرم در روز تجویز می‌شود که هر یک یا دو هفته مقدار ۲۵ میکروگرم به آن اضافه می‌گردد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. مقدار دوز نگهدارنده ۷۵-۲۵ میکروگرم در روز می‌باشد. در میگزدم و در گواتر ساده (غیر سمی) ابتدا ۵ میکروگرم در روز تجویز می‌شود که هر یک یا دو هفته مقدار ۱۰-۵ میکروگرم به آن اضافه می‌گردد. هنگامی که مقدار مصرف به ۲۵ میکروگرم در روز رسد می‌توان هر یک یا دو هفته مقدار ۲۵-۱۲/۵ میکروگرم بر مقدار مصرف افزود. مقدار دوز نگهدارنده در میگزدم ۵۰ تا ۱۰۰ میکروگرم در روز و در گواتر ساده ۷۵ میکروگرم در روز می‌باشد.
در کم‌کاری تیروئید مادرزادی کودکان: شروع درمان با ۵ میکروگرم روزانه آغاز می‌شود و سپس در صورت نیاز هر ۳ یا ۴ هفته ۵ میکروگرم اضافه می‌شود تا اثرات مطلوب درمانی حاصل شود. مقدار دوز نگهدارنده در کودکان چند ماهه ۲۰ میکروگرم در روز است و در کودکان یک ساله ممکن است ۵۰ میکروگرم در روز نیاز باشد و در کودکان بیشتر از ۳ سال ممکن است دوز کامل بزرگسالان تجویز شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید. علائم کم‌کاری تیروئید با مصرف مقادیر کمتر از حد درمانی این دارو عبارتند از: تغییر دوره قاعدگی، از دست دادن مهارت در انجام کارها، سردی بدن، پوست خشک و پاد کرده، یبوست، سردرد، بی‌حالی، درد عضلانی، خواب‌آلودگی، خستگی، ضعف و افزایش غیرعادی وزن. همچنین علائم پرکاری تیروئید با عوارض مصرف بیش از حد این دارو عبارتند از: تغییر اشتها، تغییر دوره قاعدگی، درد قفسه سینه، اسهال، تب، لرزش دست‌ها، سردرد، تحریک پذیری، کرامپ ساق پا، عصبانیت، ضربان سریع یا نامنظم قلب، حساسیت به حرارت، تنگی نفس، بی‌خوابی، تعریق غیرعادی، استفرغ و کاهش وزن.
بروز سردردهای شدید در اطفال نیز از عوارض جانبی این دارو می‌باشد.

شرایط نگهداری دارو:

– دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.
– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.



BRC/ P- SF21-01/05

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران
تلفن مدی مشتری: ۹-۰۵۵۱۷۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸

لووتیروکسین سدیم (لووکسین ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰)

لووکسین

قرص خط دار خوراکی لووتیروکسین سدیم ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ میکروگرم

پیش از شروع مصرف لووکسین و هریار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه را همتا را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این برگه را همتا جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

لووکسین چیست و به چه منظور استفاده میشود؟

قرص لووکسین (ل-ووک-سین) حاوی ۱۰۰/۷۵/۵۰ میکروگرم ماده فعال لووتیروکسین سدیم در هر قرص می باشد. لووتیروکسین (ال-تیروکسین؛ T4) یک فرم سنتتیک از تیروکسین می باشد که به گروه دارویی هورمون های تیروئیدی تعلق دارد و برای درمان کم کاری تیروئید و سرکوب ترشح تیروئیدین از هیپوفیز (TSH) استفاده می شود.

آنچه که باید پیش از مصرف لووکسین بدانید:

لووکسین برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه یا شما دارند خودداری نمایید. - نباید از این دارو در نارسایی قشر آدرنال اصلاح نشده، تیروتوکسیکوز درمان نشده، آلرژی به دارو و یا هر یک از اجزای فرمولاسیون، سکت قلبی حاد (MI) استفاده شود. - این محصول نباید برای درمان چاقی یا کاهش وزن استفاده شود. - از مصرف این دارو جهت درمان کمای میگزدم خودداری نمایید. - در صورت داشتن موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید: - بیماری قلبی عروقی، دیابت، سالمندان، فشار خون بالا، هایپوتیروئیدیسم طولانی مدت، سکت قلبی، نارسایی قلبی، کم کاری غده هیپوفیز، افراد مستعد نارسایی آدرنال

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

- در بیماران بزرگسال مبتلا به کم کاری اولیه تیروئید، سطح سرمی TSH را پس از گذشت ۶ الی ۸ هفته از هر تغییر دوزی کنترل نمایید. در بیماران با دوز جایگزینی مناسب و ثابت، پاسخ بیوشیمیایی و کلینیکالی را هر ۶ الی ۱۲ ماه و در هر زمان که تغییری در وضعیت بالینی بیمار ایجاد شد ارزیابی نمایید. - توجه: با توجه به حساسیت نوع دارو، تغییر برند مورد استفاده توصیه نمی شود.

لووکسین را چگونه مصرف نمایید؟

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه را همتا متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

هایپوتیروئیدیسم: - دوز معمول در بزرگسالان تقریباً ۱.۷ mcg/kg/day می باشد. (برای مثال: ۱۰۰ الی ۱۲۵ میکروگرم در روز برای یک فرد بزرگسال با وزن ۷۰ کیلوگرم) - برای افراد بالای ۵۰ سال بدون بیماری قلبی، با دوز ۲۵ الی ۵۰ میکروگرم در روز شروع و در صورت نیاز هر ۶ الی ۸ هفته دوز را ۱۲/۵ الی ۲۵ میکروگرم افزایش دهید. - برای افراد بالای ۵۰ سال با بیماری قلبی، با دوز ۱۲/۵ الی ۲۵ میکروگرم در روز شروع و در صورت نیاز هر ۴ الی ۶ هفته دوز را ۱۲/۵ الی ۲۵ میکروگرم افزایش دهید. کودکان: - ممکن است بیش فعالی در کودکان با سن بالاتر، در صورت شروع دارو با یک چهارم دوز پیشنهادی و افزایش مقدار آن هر هفته تا رسیدن به دوز کامل به حداقل برسد. (در طی ۴ هفته)

AGE	Daily Dose Per Kg Body Weight
0-3 months	10-15 mcg/kg/day
3-6 months	8-10 mcg/kg/day
6-12 months	6-8 mcg/kg/day
1-5 years	5-6 mcg/kg/day
6-12 years	4-5 mcg/kg/day
Greater than 12 years but growth and puberty incomplete	2-3 mcg/kg/day
Growth and puberty complete	1.7 mcg/kg/day

چطور مصرف کنید:

- لووکسین را با یک لیوان پر آب جهت پیشگیری از ایجاد رفلکس میل نمایید. - ممکن است در کودکانی که قادر به بلع قرص نیستند نیاز به شکستن قرص و درست کردن یک سوسپانسیون با کمک ۵ الی ۱۰ میلی لیتر (یک الی دو قاشق چایخوری) آب باشد. توصیه می شود سوسپانسیون را بلافاصله مصرف نمایید. باقی مانده آن را دور بریزید.

چه زمانی مصرف کنید:

لووکسین را به صورت یک بار در روز، صبح ها یا معده خالی، حداقل نیم الی یک ساعت قبل از غذا و مطابق با نظر پزشک تا زمانی که نیاز است مصرف نمایید.

اگر بیش از اندازه مصرف کردید:

- در صورت بروز علایم پرکاری تیروئید، توصیه می شود مصرف لووکسین را به مدت ۲ تا ۳ روز قطع نمایید، سپس با دوز کمتری مصرف نمایید. - درمان مسمومیت حاد با این دارو به صورت کاهش جذب آن از دستگاه گوارش می باشد که ممکن است حداکثر ۳ تا ۴ ساعت پس از مصرف خوراکی دوزهای سمی لووکسین کمک کننده باشد.

- استفاده از برخی از داروها و مراقبت های حمایتی از دیگر روش های درمان مصرف دوز بالای لووکسین می باشد. - بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی DPIC تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیک ترین بیمارستان مراجعه کنید.

آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

به محض به یاد آوردن دوز فراموش شده را مصرف نمایید. اما چنانچه تا زمان مصرف دوز بعدی به خاطر نیاوردید از دو برابر کردن آن خودداری کنید. در صورت فراموش کردن دو یا چند دوز متوالی به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری در رده A قرار دارد. در برخی مواقع نیاز به افزایش دوز دارو در زمان بارداری می باشد. مصرف مقادیر مناسب از لووتیروکسین در دوران شیردهی هیچ گونه عارضه جانبی را در شیرخوار نشان نداده است.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

اگر هریک از داروهای زیر را مصرف می کنید به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید: ضدانقباضها، ضدافسردگی های سه حلقه ای، داروهای ضد دیابت، داروهای بلاک کننده گیرنده های بتا درنژیک، گلستیرامین یا کلسیتیول، کورتیکواستروئیدها، گلیکوزیدهای دیژیتال، استروژن ها، القا کننده های آنزیم های کبدی، کتامین، ماپروتیلین، سدیم دیدید، سوماترم یا سوماتریتان، سمپاتومیمتیک ها

عوارض جانبی احتمالی مصرف لووکسین چه می باشد:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. عوارض جانبی درمان با لووکسین معمولاً در اثر دوز بالای نادرست آن ایجاد می شوند و شامل: - عمومی: خستگی، افزایش یا کاهش وزن، تب، احساس سرما، هماهنگی حرکتی پایین، احساس خستگی، ادم، بد حالی، بحران تیروتوکسیک - سیستم عصبی مرکزی: سردرد، بیش فعالی، عصبی بودن، هیجان، تحریک پذیری، عدم ثبات احساسات، بی خوابی (مشکل در به خواب رفتن)، تومور مغزی کاذب در اطفال (با تظاهر سردرد شدید)، تشنج، گرگرفتگی، واکنش های حساسیتی. - اسکلتی عضلانی: کاهش دانسیته مواد معدنی استخوانی، لرزش، ضعف عضلانی، انقباض و گرفتگی پا و عضلات، درد عضلانی - قلبی عروقی: تپش قلب بسیار شدید، تاکیکاردی، آریتمی، افزایش پالس و فشار خون، نارسایی قلب، آتیرین پکتوریس، سکت قلبی، ایست قلبی، ضربان سریع یا نامنظم قلب - تنفسی: تنگی نفس - گوارشی: اسهال، استفراغ، کرامپ شکمی، تغییرات اشتها، پیوست - پوستی: ریزش مو، راش پوستی، کهیر، پوست خشک/پف کرده. - اندوکراین: افزایش آنزیم های کبدی، تعریق زیاد - تولید مثلی: بی نظمی سیکل ماهانه، اختلال در باروری

آیا می دانید در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنند؟ (کارت زرد ADR را راستای ارتقای گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است.)

لووکسین چطور نگه داری می شود:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید. - دارو را درون جعبه دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید. - دارو را تا زمان مصرف در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید. - از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز گذاشتن آن در خودرو خودداری نمایید. - از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده روی بسته بندی خودداری نمایید.

لووکسین چگونه عرضه می گردد؟

توصیف محصول: لووکسین به صورت قرص های سفید خط دار در جعبه های ۱۰۰ عددی (۱۰ بلیستر ۱۰ عددی) به همراه برگه را همتا عرضه می گردد.

تولید کننده:

لووکسین محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد. کیلووتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران تلفن صدای مشتری: ۹۸۲۱۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ + (داخلی ۳۵۸)



مجسترول (جستیران ۴۰)

Gestiran 40

Megestrol

Scored Tablet

جستیران ۴۰

مجسترول

قرص خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به پروژستین ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

- در صورتی که تحت رژیم خاصی هستید مانند: محدودیت مصرف سدیم و قند.

- در صورت بارداری و شیردهی.

- در صورت مصرف داروهای دیگر مانند: آمینوگلویتیماید، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی تونین و ریفامپین.

- در صورت ابتلا به هر یک از بیماری های زیر:

آسم، مرع، سردردهای میگرنی، بیماری کلیوی، ناراحتی قلبی، خونریزی های نامشخص مانند وجود خون در ادرار یا تغییرات در خونریزی های

واژینال، اختلال سیستم عصبی، دیابت ملیتوس، بیماری کبدی و ناراحتی های پستان.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- در طول درمان با این دارو به طور مرتب به پزشک مراجعه نمایید.

- مصرف این دارو ممکن است باعث ایجاد حالت منگی در بیمار گردد که در این صورت از رانندگی و یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری نمایید.

- مصرف این دارو در بعضی بیماران ممکن است باعث حساس شدن، متورم شدن یا خونریزی در لثه گردد. بنابراین در مدت مصرف باید به دقت مسواک زده شود و به طور مرتب به دندان پزشک مراجعه گردد.

- مصرف این دارو ممکن است باعث خونریزی های بین دوره ای گردد که در این صورت حتماً به پزشک معالج اطلاع دهید.

مصرف در دوران بارداری:

در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری بر روی انسان مطالعات کاملی صورت پذیرفته است، لذا مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود مگر با نظر پزشک معالج و سنجیدن فواید و مضرات مصرف آن در دوران بارداری.

مصرف در دوران شیردهی:

اگرچه پروژستین ها در شیر ترشح می شوند ولی عوارض خاصی در اثر مصرف مقادیر کم آنها در دوران شیردهی مشاهده نگردیده است. با این وجود پروژستین ها در مقادیر زیاد ممکن است باعث تغییراتی در کیفیت و کمیت شیر گردند. لذا توصیه می شود مصرف این دارو در دوران شیردهی زیر نظر پزشک معالج صورت گیرد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی به طور کلی میزان مصرف معمول آن به شرح زیر است:

- برای درمان سرطان پستان: ۱۶۰ میلی گرم در روز (منقسم در ۴ نوبت) به مدت حداقل ۲ ماه توصیه شده است.

- برای درمان سرطان رحم: ۳۲۰-۴۰۰ میلی گرم در روز در دوزهای منقسم به مدت دو ماه یا بیشتر.

- برای درمان بی اشتهایی و ضعف حاصل از بدخیمی ها: ۸۰۰-۴۰۰ میلی گرم در روز.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود:

افزایش وزن، ترومبوآمبولیسم، ناراحتی قلبی، سرگیجه، تهوع، ادم، هایپرگلیسمی، طاسی، راش، ضعف و سستی، منگی، اختلال در خونریزی قاعدگی، نارسایی عملکرد آدرنال، سندرم کوشینگ، کاهش یا افزایش فشار خون، اسهال، نفخ، بی خوابی، کم خونی، تب، کاهش میل جنسی، سوز، هاضمه، درد، تکرر ادرار، عفونت تنفسی، افزایش ضربان قلب، کاردیومیوپاتی، نوروپاتی، افسردگی، تشنج، اختلال افکار، ریزش مو، خارش، تعریق، یبوست، خشکی دهان، هپاتومگالی، افزایش بزاق، آلومین اوریا، عفونت مجاری ادرار، ژنیکوماستی، سرفه، سختی تنفس، فارتیت، بیماری های ریوی، لکوپنی، افزایش سطح LDL خون، درد شکمی، عفونت، مونیلیازیس و سارکوما.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را در ظروف در بسته نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC/P-SJ32-02/02

متفورمین (متگلیندین ۵۰۰)

Metglindine 500

متگلیندین ۵۰۰

Metformin
Scored Tablet

متفورمین
قرص خط دار

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا تومیبه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروها.
- در صورت مصرف داروهایی مانند آمپلوراید، داروهای پلاک کننده کانال کلسیم، سایمتیدین، دیگوکسین، فوروزماید، مورفین، پروکائین آمید، کینیدین، کینین، رانیتیدین، تریامترن، تری متوپریم، ونکومایسین، دیورتیک های تیازیدی، کورتیکو استروئیدها، فنوتیازین ها، هورمون های تیروئیدی، استروژن ها، ضد بارداری های خوراکی، فنی تونین، ایزونیازید، نیکوتینیک اسید، نیفیدپین، سفالکسین، محرک های سیستم سمپاتیک، الکل و سایر داروهای کاهنده قند خون.
- در صورت ابتلا به بیماری هایی مانند اختلالات کبدی، بیماری های غده تیروئید، لاکتیک اسیدوزیس، نارسایی کلیوی، بیماری های قلبی-عروقی حاد، بیماری هایی که سبب تاخیر در جذب غذا می گردند مانند اسهال، استفراغ، انسداد روده، وضعیت های ایجاد کننده هایپوگلیسمی و هایپر یا هایپوگلیسمی.
- بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- این دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید و دوره درمان را کامل نمایید.
- متفورمین را اگر به صورت یک نوبت در روز استفاده می نمایید همراه مباحنه و در صورت استفاده به صورت دو بار در روز همراه مباحنه و شام مصرف نمایید.
- در صورت مشاهده علائم لاکتیک اسیدوزیس مانند تند شدن سرعت تنفس، درد عضلانی، بدحالی و خواب آلودگی غیر طبیعی مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک تماس بگیرید.
- رعایت رژیم غذایی، انجام تمرینات ورزشی و کاهش وزن هم زمان با مصرف متفورمین از اهمیت فراوان برخوردار می باشند.
- برای جلوگیری از بروز کتواسیدوزیس یا لاکتیک اسیدوزیس باید سطح کتون، الکترولیت های سرم، گلوکز خون و در صورت لزوم PH خون، لکانات، پیروات و متفورمین را چک کرد.
- ارزیابی سالانه فاکتورهای خونی و فعالیت کلیه ها ضروری می باشد.
- متفورمین را موقتاً برای عمل جراحی قطع کنید و تا وقتی که بیمار توانایی مصرف خوراکی دارو را بدست آورد و فعالیت کلیوی نرمال شود مصرف را شروع نکنید.
- در صورت نیاز به تزریق داروهای حاجب یددار جهت تصویربرداری پزشک مربوطه را از مصرف داروی متفورمین مطلع نمایید.
- به بیمار بیاورید که در صورت مشاهده علائم هایپوگلیسمی که شامل اضطراب، تاری دید، تعریق سرد، گیجی، رنگ پریدگی، اختلال در تمرکز، گرسنگی شدید، افزایش ضربان قلب، سردرد، تهوع، عصبانیت و خستگی مفرط میباشد، مواد قندی مانند عسل، قند و آمپوه شیرین مصرف نموده و به پزشک معالج خود مراجعه نماید.
- به بیمار بیاورید که در صورت مشاهده علائم هایپرگلیسمی و کتواسیدوزیس که شامل تاری دید، خستگی، خشکی دهان، پوست خشک و برافروخته، تنفس سریع و عمیق با بوی خاص (مشابه بوی استون)، افزایش حجم و تعداد دفعات دفع ادرار، درد شکم، تهوع، استفراغ و تشنگی مفرط می باشد سریعاً به پزشک معالج خود مراجعه نماید.
- وضعیت های همراه با هایپوگلیسمی مانند کلاپس قلبی-عروقی و سکت قلبی ممکن است به لاکتیک

اسیدوزیس یا از تومی منجر شود که در صورت بروز این وضعیت ها مصرف متفورمین می بایست سریعاً قطع گردد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

مقدار مصرف در بالغین:

دوز اولیه: ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز همراه با غذا یا ۸۵۰ میلی گرم صبح همراه با صبحانه که برای افزایش دوز می توان ۵۰۰ میلی گرم را هر هفته و یا ۸۵۰ میلی گرم را هر دو هفته اضافه نمود.

دوز نگهدارنده برای این دارو ۵۰۰ میلی گرم یا ۸۵۰ میلی گرم دو تا سه بار در روز و حداکثر دوز ۲۵۵۰ میلی گرم در روز می باشد.

مصرف در کودکان:

کودکان زیر ۱۰ سال: کارایی آن اثبات نشده است.

کودکان بالای ۱۰ سال: دوز اولیه ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز همراه غذا که افزایش دوز آن ۵۰۰ میلی گرم هر هفته بوده و حداکثر دوز آن ۲۰۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

مصرف در بارداری:

اگرچه گزارشی مبنی بر ایجاد مشکلات جنینی در مورد متفورمین مشاهده نشده است ولی متفورمین در زمان بارداری تومیبه نمی شود. برای کنترل قند خون در دوران بارداری رژیم غذایی به تنهایی یا همراه با انسولین تومیبه می شود.

مصرف در شیردهی:

اگرچه متفورمین در شیر مادر وارد می شود ولی تاکنون گزارشی مبنی بر ایجاد مشکلات در نوزاد به اثبات نرسیده است. با این حال توصیه می شود مصرف این دارو در دوران شیردهی با احتیاط صورت گیرد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

از مهم ترین عوارض جانبی می توان لاکتیک اسیدوزیس، آتمی مگالوبلاستیک و هایپوگلیسمی را نام برد. عوارض دیگر شامل سردرد، ضعف، ناراحتی گوارشی، اسهال، نفخ شکم، درد، تهوع، استفراغ، تپش قلب، گر گرفتگی، راش پوستی، افزایش تعریق، بیماری های ناخن، درد عضلات، تنگی نفس، لرز، علائم آنفلوآنزا و هایپوگلیسمی می باشند.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SL37- 01/ 03

متیل پردنیزولون استات (دیپوکورتین)

متیل پردنیزولون استات ۴۰ Methyprednisolone Acetate 40

Depocortine

40 mg/ 1ml

Injectable Suspension

دیپوکورتین

۴۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

سوسپانسیون تزریقی

راهنمایی های عمومی برای مصرف دارو

این دارو برای درمان بیماری شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید

– وجود هر نوع حساسیت به کورتیکوئیدها یا آدرنوکورتیکوئیدها و موارد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظت کننده و رنگ ها.
– در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر ایدز، عفونت های عمومی یا موضعی، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری های قلبی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری های کلیوی، دیابت، میاستنی گراویس و استئوپروز.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو

– بدون اطلاع پزشک از مصرف هم زمان این دارو با داروهای نظیر آنتی اسیدها، سرم تزریقی، آمفوتریسین B، آنتی بیوتیک های ماکرولیدی، داروهای خوراکی ضد دیابت، گلیکوزیدهای دیژیتال، دیورتیک ها، داروهای القا کننده آنزیمی، دیابت، منابع پتاسیم، داروهای حاوی سدیم، هورمون رشد انسانی، واکسن ها و فرآورده های حاوی الکل خودداری نمایید.
– در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم و کالری و افزایش مصرف مکمل پتاسیم و پروتئین مورد نیاز باشد.
– از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.
– معاینات چشم پزشکی در طول درمان دراز مدت به طور مرتب باید انجام شوند.
– پیش از قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است قطع تدریجی مصرف دارو لازم باشد.
– در صورت بروز عفونت ها یا ضایعات جدی به پزشک اطلاع دهید.
– در صورت مشاهده تورم و یا قرمزی در محل تزریق و ادامه یا بدتر شدن آن به پزشک اطلاع دهید.

مقدار مصرف دارو

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

دقت نمایید که این دارو فقط برای تزریق عضلانی، تزریق داخل مایع سینوویال و تزریق در بافت های نرم و یا داخل ضایعات پوستی مناسب است و هرگز نباید آن را به صورت وریدی و یا تزریقی داخل غلاف نخاعی و عضله دلتوئیدی استفاده نمود.

در افراد بزرگسال:

– آرتريت روماتوئید: هر ۱ الی ۵ هفته:

در مفصل های بزرگ: ۸۰-۲۰ میلی گرم
در مفصل های متوسط: ۴۰-۱۰ میلی گرم
در مفصل های کوچک: ۱۰-۴ میلی گرم
– درمان اختلالات آلرژیک (شوگ آنافیلاکسی): ۱۰-۱۲۰ میلی گرم عضلانی.

– التهابات پوستی شدید: ۱۲۰-۱۰ میلی گرم عضلانی.
– درمان عفونت توبرکلوزیس تنفسی منتشر: ۱۲۰-۴ میلی گرم عضلانی در روز.
– مالتیپل اسکلروزیس: به صورت روزانه ۱۶۰ میلی گرم تا یک هفته سپس ۶۴ میلی گرم یک روز در میان به مدت یک ماه.
در اطفال: میزان آن بر اساس وزن و سطح بدن کودک توسط پزشک تعیین می شود.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود.
اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.
افزایش اشتها، سوء هاضمه، عصبانیت یا بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، سرگیجه، برافروختگی، سردرد، افزایش درد مفاصل، افزایش تعریق، اختلالات آب و الکترولیت، میوپاتی ناشی از استروئیدها، منگی و افزایش غیر طبیعی رشد موی بدن و صورت از جمله عوارض این دارو می باشد. همچنین بدنال مصرف دراز مدت آن عوارضی هم چون درد شکم و معده، آکنه، مدفوع خون آلود، ضربان نامنظم قلب، اختلالات قاعدگی، پوکی استخوان، کاهش حجم عضلات و سایر مشکلات عضلانی و اسکلتی، پانکراتیت، افزایش سطح آنزیم های کبدی، مشکلات پوستی (نازک شدن پوست، اشکال در سرعت بهبود زخم ها)، بالانس منفی نیتروژن به دلیل کاتابولیسم پروتئین ها، واکنش های حساسیتی شدید، خستگی و ضعف غیر معمول، استفراغ، کاهش یا اختلال در دید و تکرر ادرار مشاهده شده است.

شرایط نگهداری

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
– از مصرف داروی تاریخ گذشته اجتناب نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۰۹-۳۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PD12- 01/ 03

مدروکسی پروژسترون استات + استرادیول سیپیونات (دپوفم)

Medroxyprogesterone Acetate + Estradiol Cypionate

Depofem

Injectable Suspension

مدروکسی پروژسترون استات + استرادیول سیپیونات

دپوفم

سوسپانسیون تزریقی

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:
- وجود هر نوع حساسیت به پروژستین ها، استروژن ها، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

- در صورت داشتن هر نوع رژیم غذایی مانند رژیم غذایی کم نمک و یا رژیم غذایی دارای قند پایین.

- در صورت بارداری و شیردهی.

- در صورت استفاده از لنزهای تماسی.

- در صورت مصرف داروهای زیر:

آمینوگلوکوتنمید، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی تونین، اسیدآسکوربیک، ریفاپوتین، ریفاپمپین، استامینوفن، فرآورده گیاهی هایپریکوم، پرفور اتوم، آنتی بیوتیک ها، سیکلوسپورین، پردنیزولون، تنوفیلین، سالیسیلیک اسید، فنیل بوتازون.

- در صورت داشتن سابقه ابتلا به بیماری های زیر:

آسم، مرع، مشکلات قلبی، ناراحتی های کلیوی، سردردهای میگرنی، خونریزی های غیر طبیعی مثلاً وجود خون در ادرار و یا خونریزی غیر طبیعی از واژن، بیماری های پستان، دیابت ملیتوس، بیماری های کبدی و بیماری هایی که احتمال به پوکی استخوان را تشدید می کند، سابقه خانوادگی سرطان سینه، رحم و نوپلازی وابسته به استروژن، ابتلا به سرطان تخمدان، احتباس مایعات، هایپرتانسیون، اختلالات ترمیو آمبولیک، سابقه یرقان کلستاتیک، بیماری های عروق مغزی و عروق کرونر و بالا بودن کلسترول و تری گلیسیرید خون.

- افراد سیگاری بالای ۳۵ سال قبل از مصرف دارو می بایست با پزشک خود مشورت نمایند.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- این دارو را فقط تحت نظر پزشک مصرف نمایید.

- چنانچه خونریزی غیر منتظره از واژن برای مدت طولانی رخ داد با پزشک خود مشورت نمایید.

- چنانچه سیکل ماهیانه شما برای مدت ۴۵ روز از آخرین دوره قاعدگی تکرار نشد با پزشک خود مشورت نمایید.

- چنانچه احتمال می دهید به تاخیر افتادن قاعدگی شما به علت

بارداری می باشد باید فوراً مصرف این دارو را قطع کنید و پزشک خود را مطلع نمایید.

- در صورت نیاز به انجام آزمایشات پزشکی، مصرف کردن این دارو را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

- برای جلوگیری از بارداری: مقدار مصرف این دارو به صورت تزریق عضلانی یک آمپول در ماه می باشد. اولین تزریق می بایست در پنج روز اول قاعدگی صورت گیرد.

- میتوان این دارو را در عضلات دلتوئید، سرینی بزرگ (Gluteus Maximus) و جلوی ران تزریق نمود.

- قبل از تزریق، آمپول محتوی دارو را به خوبی تکان دهید.

- فاصله بین دو تزریق حداقل ۲۸ روز و حداکثر ۳۳ روز میباشد.

مصرف در بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در شیردهی: این دارو در شیر مادر ترشح می شود ولی اثرات آن بر روی شیرخوار مشخص نشده است. مصرف این دارو تا ۶ هفته پس از زایمان توصیه نمی گردد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات درمانی دارای برخی عوارض ناخواسته می باشد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید: سر درد میگرنی، تغییر در بینایی، افزایش دفعات خونریزی ماهیانه، افزایش و یا کاهش حجم خون در دوره قاعدگی، توقف سیکل ماهیانه، تغییر در اشتها، جوش های پوستی، تورم صورت و پاها، آکنه، کاهش میل جنسی، سفتی و درد پستان، تغییر وزن، درد شکمی، افسردگی، تهوع، آکوپسی، آموره، واکنش های آنافیلاکتیک، لخته شدن خون، حملات قلبی، یرقان کلستاتیک، ناپایداری احساسات، عصبانیت، عدم تحمل کربوهیدرات ها، تغییر در متابولیسم چربی ها، لک های پوستی، عفونت های واژن و احتباس آب و نمک.

شرایط نگهداری:

۱- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

۲- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

۳- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹ - ۰۵۵۱۷۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PHI 4- 01/ 02

مزالازین (مزیوکس – آی اچ ۱۲۰۰)

مزیوکس-آی اچ ۱۲۰۰

مزالازین پیوسته رهش

قرص پیوسته رهش حاوی ۱۲۰۰ میلی گرم مزالازین

بارداری و شیردهی:

- در مطالعات تولید مثل حیوانی عوارض جانبی مشاهده نشده است. در صورت نیاز به درمان بیماری های التهابی روده در طول مدت بارداری، ممکن است از مزیوکس-آی اچ استفاده شود.
- به دلیل احتمال ایجاد هر گونه عوارض جانبی مانند اسهال در نوزادان، مصرف این دارو در طول مدت شیردهی با احتیاط صورت پذیرد.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

- مصرف هم زمان با سایر داروها:
مزیوکس-آی اچ در صورت مصرف می تواند با داروهای دیگر حتی داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی که با نسخه یا بدون نسخه مصرف می کنند به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهد.
- آنتی اسیدها: از مصرف هم زمان آنتی اسیدها با قرص پیوسته رهش مزیوکس-آی اچ پرهیز کنید.
- گلیکوزیدهای قلبی: از مصرف هم زمان مزیوکس-آی اچ به دلیل کاهش غلظت سرمی گلیکوزیدهای قلب توسط مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید، با احتیاط استفاده کنید.
- آنتاگونیست های هیستامینی (H2): به دلیل افزایش pH دستگاه گوارش، از مصرف هم زمان آنتاگونیست های گیرنده هیستامینی با دوز بالا به همراه قرص پیوسته رهش مزیوکس-آی اچ، پرهیز کنید.
- هپارین و هپارین با وزن مولکولی پایین: مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید ممکن است سبب تقویت عوارض جانبی یا اثرات سمی هپارین یا هپارین با وزن مولکولی پایین گردد.
- عوامل ضدالتهابی غیر استروئیدی: داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی ممکن است سبب افزایش اثرات سمی مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید بر کلیه گردد.
- مهارکننده های پمپ پروتون: مهار کننده های پمپ پروتون ممکن است سبب کاهش اثرات درمانی مزیوکس-آی اچ گردند. از مصرف هم زمان مهارکننده های پمپ پروتون با مقادیر بالا، به همراه قرص پیوسته رهش مزیوکس-آی اچ پرهیز کنید.
- آنالوگ های تیوپورین: مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید، ممکن است سبب کاهش متابولیسم آنالوگ های تیوپورین گردند.
- واکسن حاوی ویروس واریسلا: مشتقات ۵- آمینوسالیسیک اسید، ممکن است سبب افزایش سمیت واکسن حاوی ویروس واریسلا گردد. اولین تکنه ای که به دنبال مصرف سالیسیلات در کودکان مبتلا به عفونت واریسلا باید مد نظر قرار گیرد، احتمال ابتلا به سندرم ری می باشد.

عوارض جانبی احتمالی مصرف مزیوکس-آی اچ:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض ممکن است در یک فرد دیده نشود ولی در صورت بروز عوارض زیر، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
- عوارض با شیوع بیشتر از ۱۰٪: سردرد، دردهای شکمی، آروغ، بدتر شدن کولیت اولسراتیو، حالت تهوع، فارینژیت، نوزوفارینژیت، ضعف و تب.
- عوارض با شیوع کمتر از ۱۰٪: درد قفسه سینه، فشار خون بالا، ادم محیطی، گشادشدگی رگ ها، اضطراب، لرز، سرگیجه، خستگی، سستی و سفتی عضلانی، بی خوابی، میگرن، عصبانیت، پارسازی (گزگز شدن اندام ها)، سرگیجه، آکنه و لکاریس، الویسی، پوسته پوسته شدن، خارش، راش پوستی، افزایش تری گلیسیرید خون، کاهش وزن، ورم شکم، مدفوع غیر عادی، دردهای روده ای - مقعدی، اسهال، خونی، یبوست، اسهال، سوء هاضمه، نفخ شکم، گاستروانتریت، خونریزی دستگاه گوارش، هورمونیت، پانکراتیت، درد در ناحیه مفصل، کلاریت (تخلخل مجاری صفراوی)، تانسوس (احساس نیاز به دفع مدفوع علی رغم خالی بودن کولون)، استراغ، وجود خون در ادرار، کاهش هماتوکریت خون، کاهش هموگلوبین خون، خونریزی مقعدی، عملکرد نامناسب کبدی، هیپاتیت کولستاتیک، افزایش ALT (آلانین آمینوترانسفراز) و ترانس آمینازهای سرم، آنفیلاکسی، عفونت، عفونت ویروسی، تب، سندرم عدم تحمل درد مفصل، التهاب و سفتی مفصل، درد در ناحیه پشت، دردهای اسکلتی عضلانی (با / مفاصل)، درد عضلانی، ضعف، ورم ملتحمه، اختلال بینایی، درد گوش، وزوز گوش، کاهش دفع کراتینین، پر ادراری، برونشیت، سرفه، تنگی نفس، التهاب بینی، سینوزیت، خواب آلودگی و گلودرد.

آیا می دانید در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقاء گزارش دهنی عوارض دارویی تهیه شده است)

مزیوکس-آی اچ چگونه نگهداری می شود:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- در طول مدتی که قرص های خود را مصرف می کنید آن ها را در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
- از نگهداری دارو در حمام، کنار سینک، پشت پنجره و نیز جا گذاشتن آن در خودرو خودداری کنید.
- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده بر روی بسته بندی خودداری نمایید.

توصیف محصول:

شکل ظاهری مزیوکس-آی اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

قرص پیوسته رهش مزیوکس-آی اچ به صورت قرص مایل به قهوه ای، بیضی شکل، با حکاکی ۴ بر یک طرف قرص می باشد که در جعبه های ۳۰ عددی (حاوی ۳ پیوسته کارت ۱۰ عددی)، همراه با برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

مزیوکس-آی اچ محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.
کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران.
تلفن صدای مشتری: ۰۹۸۲۱۴۴۹۰۵۵۱۷۰۹ (داخلی ۳۵۸)

تاریخ بازنگری:

۱۳۹۹/۰۴/۲۲

پیش از شروع مصرف مزیوکس-آی اچ و هر بار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی اطلاعات جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

مزیوکس-آی اچ چیست و به چه منظور مصرف می شود:

قرص مزیوکس-آی اچ (م-زی-توکس-آی اچ) حاوی ۱۲۰۰ میلی گرم ماده موثره مزالازین می باشد که به گروه دارویی ۵- آمینو سالیسیلیک اسید تعلق دارد. مزیوکس-آی اچ به عنوان درمان و دوز نگهدارنده جهت بهبود فرم فعال خفیف تا متوسط کولیت اولسراتیو استفاده می شود. بیماری کولیت اولسراتیو التهاب تکرار شونده در لایه مخاطی روده بزرگ می باشد.

آنچه که باید پیش از مصرف داروی مزیوکس-آی اچ بدانید:

مزیوکس-آی اچ برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علائم شبیه یا شما دارند خودداری نمایید.

مواردی که این دارو را نباید مصرف کنید:

- اگر به مزالازین، سالیسیلات ها، آمینوسالیسیلات ها یا سایر ترکیبات فرمولاسیون حساسیت دارید.

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

- مصرف این دارو در بیماران که مستعد پریکاریت (التهاب پرده قلب) و میوکاردیت (التهاب عضله قلب) می باشند، با احتیاط صورت پذیرد (به دلیل واکنش های افزایش حساسیتی قلبی ناشی از مزالازین).
- اگر مبتلا به اختلالات انسدادی دستگاه گوارش هستید، بایستی این دارو را با احتیاط مصرف کنید. در بیماران مبتلا به تنگی پیلور یا هر گونه ناراسای در عملکرد دستگاه گوارش فوقانی، ممکن است احتیاط طولانی مدت قرص ها در معده و یا تاخیر در آزادسازی مزیوکس-آی اچ در کولون ایجاد شود.
- مصرف مزیوکس-آی اچ ممکن است سبب ایجاد سندرم عدم تحمل حاد، همانند: گرتگی و انقباض، دردهای شکمی، اسهال خونی و در برخی مواقع ایجاد تب، سردرد، بدحالی، خارش، راش پوستی و ورم ملتحمه گردد. در صورت وقوع یا احتمال وقوع سندرم مذکور، مصرف این دارو قطع گردد.
- مصرف این دارو در بیماران که حساسیت شدید به سولفاسالازین دارند با احتیاط صورت پذیرد. این گروه از بیماران ممکن است نسبت به مزیوکس-آی اچ هم واکنش نشان دهند.
- مواردی از ایجاد واکنش های حساسیتی شدید به دنبال استفاده از مزالازین گزارش شده است که ممکن است شامل درگیری اندام های درونی همانند: هیپاتیت، اختلالات خونی و یا پنومونی (عفونت ریه) باشد. در صورت ایجاد واکنش های افزایش حساسیتی ناشی از مصرف مزیوکس-آی اچ، مصرف این دارو قطع گردد.

- مصرف مزیوکس-آی اچ ممکن است سبب ایجاد عوارض کلیوی، همانند: نفروپاتی، نفريت بینابینی حاد یا مزمن، سندرم نفروپاتیک و به ندرت سبب ناراسای کلیه شود. بنابراین توصیه می گردد پیش از شروع درمان و یا در بازه های زمانی مشخص در طول مدت درمان، عملکرد کلیه مورد ارزیابی قرار گیرد.
- مواردی از الیگواسرمی (کاهش تعداد اسیرم ها) ناشی از مصرف این دارو در مردان گزارش شده است (از جمله موارد نادر و بازگشت پذیر می باشد).
- مصرف مزیوکس-آی اچ در افراد بالای ۶۵ سال بایستی با احتیاط صورت پذیرد. گزارش های دریافتی بیانگر افزایش وقوع دیسکراسی خونی در بیماران با سن بالاتر از ۶۵ سال می باشد. لازم است در طول مدت درمان، آزمایشات CBC به صورت دوره ای انجام شود. همچنین ممکن است عملکرد کلیه در بیماران مسن کاهش پیدا کرده باشد.

مزیوکس-آی اچ را چگونه مصرف کنید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند. تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

در بزرگسالان:
- جهت درمان بیماری: ۲/۴ یا ۴/۸ گرم در روز
- درمان نگهدارنده: ۲/۴ گرم در روز
قطره مصرف کنید: دارو را همراه با یک لیوان پر از آب (۲۵۰ میلی لیتر) میل نمایید. از شکستن، خرد کردن و جویدن قرص خودداری نمایید.

چه زمانی مصرف کنید: دارو را همراه با بلافاصله بعد از غذا میل نمایید.
برای چه مدت مصرف کنید: مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید. چنانچه قصد دارید مصرف دارو را متوقف نمایید، در این خصوص با پزشک خود مشورت کنید.
اگر مصرف دارو را فراموش کردید: بلافاصله پس از به خاطر آوردن، یک قرص مصرف کنید. اگر نزدیک به زمان مصرف قرص بعدی است، از مصرف قرص فراموش شده خودداری نموده و استفاده از دارو را مثل قبل ادامه دهید. از دو برابر کردن دوز مصرفی خودداری نمایید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید (Overdose): بلافاصله با مرکز اطلاعات دارویی و سموم (DPIC) تماس بگیرید یا به بخش اورژانس نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید.

مزیوکس-آی اچ یک آمینو سالیسیلات است و نشانه های مسمومیت با سالیسیلات ممکن است شامل: وزوز گوش، سرگیجه، سردرد، گیجی، خواب آلودگی، تعریق، تشنج، نفس زدن، تنگی نفس، استفراغ و اسهال باشد. مسمومیت شدید، ممکن است منجر به از بین رفتن تعادل الکترولیتی و pH خون، هایپرترمی، کمبود آب بدن و آسیب به ارگان های حیاتی گردد. لازم به ذکر است که پانزهری برای مزیوکس-آی اچ وجود ندارد، اگرچه درمان های معمول مربوط به رفع مسمومیت ناشی از سالیسیلات در موارد حاد سوء مصرف می تواند سودمند باشد. عدم تعادل مایعات و الکترولیت های بدن بایستی از طریق درمان های داخل وریدی مناسب اصلاح شود. همچنین عملکرد مناسب کلیه نیز بایستی بررسی گردد.

آیا می دانید ۱۹۰ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم در تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟



مزالازین (مزینوکس – آی اچ ۵۰۰)

Mezinox-IH 500

Mesalazine

E.C. Tablet

مزینوکس-آی اچ ۵۰۰

مزالازین

قرص اشتریک کتید

مصرف در شیردهی:

مزالازین و متابولیت آن در شیر ترشح می شوند لذا دارو در دوران شیردهی با احتیاط و فقط با نظر پزشک معالج مصرف شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو در بزرگسالان در درمان کولیت اولسراتیو حاد و پیشگیری از عود بیماری، ۳-۱/۵ گرم در روز در دوزهای منقسم می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

ضعف، خستگی، سردرد، بی خوابی، اضطراب و بی قراری، آکنه، ریزش مو، خارش، راش، تعریق، کهیر، درد شکم، نفخ، یبوست، کرامپ، اسهال، تهوع، استفراغ، بی اشتها، بدتر شدن کولیت، بادگلو، سو، هاضمه، درد مفاصل، درد پشت، آرتریت، درد عضلات، هایپرگلو، سرفه، فارتریت، آبریزش بینی، درد سینه، لرز، التهاب ملتحمه چشم، دیسمنوره، تب، سندرم شبه آنفلوآنزا، ادم محیطی، درد، پانکراتیت، هپاتیت، میوکارдит، پری کاردیت، سوزش ادرار، هماجوری، احساس فوریت در دفع ادرار، آگرانولوسیتوپنی، اختلالات خونی مانند آتمی، ترومبوسیتوپنی، تشدید آسم و اختلالات ریوی، انوزینوفیلی، سندرم شبه لوپوس، نقرس، خشکی دهان، زخم دهان، اسهال خونی، نوروپاتی محیطی، افسردگی و ناپایداری عواطف.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

راهنمایهای عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به مزالازین، سولفاسالازین، سالیسیلات ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها
- بارداری و شیردهی
- در صورت مصرف داروهایی مانند ضد التهاب های غیر استروئیدی، وارفارین، مرکاپتوپورین، آرتیوپورین و امپرازول
- در صورت ابتلا به نارسایی کلیوی، تنگی پیلور و میوکارдит

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- مصرف دارو را به طور ناگهانی و بدون دستور پزشک قطع ننمایید.
- دوز تجویز شده توسط پزشک را مصرف نموده و از تغییر دادن دوز دارو خودداری فرمایید.
- قرص مزالازین را به طور کامل بلعیده و از شکستن یا جویدن قرص ها خودداری نمایید.
- دوره درمان را کامل نمایید و در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.
- در طول درمان، بررسی عملکرد کلیه و آزمایش شمارش سلول های خونی (CBC) به صورت دوره ای انجام گردد.
- در صورت وقوع اسهال یا خونریزی مقعدی و یا علائم حساسیت به دارو، درمان متوقف شود.
- مصرف طولانی مدت دارو در موارد نادر می تواند منجر به هپاتیت شود.
- بیمار بایستی در طی درمان با این دارو به طور مرتب توسط پزشک معاینه گردد.
- دارو را قبل از وعده های غذایی و در هنگام خواب با یک لیوان کامل آب میل نمایید.
- ممکن است سطوح BUN یا کراتینین سرم، AST، ALT، آلکالین فسفاتاز، بیلی روبین، LDH، آمیلاز و لیپاز افزایش یابد.
- اثر بخشی و کارایی دارو در کودکان مشخص نشده است.

مصرف در بارداری:

این دارو در بارداری در رده B قرار دارد. این دارو از جفت عبور می نماید و از آنجایی که مطالعات کافی در زمینه اثرات این دارو بر روی جنین انسان صورت نگرفته است لذا مصرف آن در دوران بارداری می بایست با نظر پزشک معالج صورت گیرد.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۰۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SQ81- 01 / 04

متی مازول (تیرومت- آی اچ)

Thiromet-IH 5

Methimazole

Scored Tablet

تیرومت-آی اچ ۵

متی مازول

قرص خطدار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- وجود هر نوع حساسیت به این دارو و هر یک از تیوآمیدها و هم چنین مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت ابتلا به نارسایی کبدی.
- در صورت مصرف داروهایی مانند: داروهای ضد انعقاد، آمیودارون، بتابلکرها، تنوفیلین، گلیکوزیدهای دیژیتال، داروهای حاوی ید رادیواکتیو.
- در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- این دارو را فقط طبق نظر پزشک مصرف نمایید.
- اگر مصرف یک دوز را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید ولی در صورتی که زمان به یاد آوردن شما هم زمان با مصرف دوز بعدی بود فقط یک دوز این دارو را مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوز خودداری نموده و بقیه را مطابق با برنامه مصرف نمایید.
- پیش از قطع مصرف دارو و هم چنین در صورت بروز جراثحت، عفونت و سایر بیماری ها، به پزشک مراجعه نمایید.
- بهتر است در فواصل زمانی مشخص به پزشک خود مراجعه کنید تا بهبودی شما مورد بررسی قرار گیرد و از قطع ناگهانی دارو بدون مشورت با پزشک معالج خودداری نمایید.
- قبل از هر گونه عمل جراحی حتی دندان پزشکی، پزشک معالج خود را از مصرف این دارو مطلع نمایید.
- طی درمان با این دارو و پس از قطع آن در صورت نیاز به هر نوع واکسیناسیون با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری:

این دارو در بارداری، در رده D قرار دارد.

مصرف در شیردهی:

این دارو در شیر ترشح می شود ولی در مطالعات صورت گرفته هیچ اثر بالینی بر روی شیرخوار مشاهده نشده است و در صورت تجویز پزشک می توان دارو را در دوره شیردهی استفاده کرد.

مقدار مصرف دارو:

- مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
- بزرگسالان: - مقدار دوز شروع در پرکاری خفیف تیروئید روزانه ۱۵ میلی گرم در ۳ دوز منقسم می باشد.
- مقدار دوز شروع در پرکاری نسبتاً شدید تیروئید روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلی گرم در ۳ دوز منقسم می باشد.
- مقدار دوز شروع در پرکاری شدید تیروئید روزانه ۶۰ میلی گرم در ۳ دوز منقسم می باشد.
- هم چنین مقدار دوز نگهدارنده این دارو ۵ تا ۱۵ میلی گرم روزانه می باشد.
- کودکان: مقدار دوز شروع در پرکاری تیروئید روزانه ۰/۴ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ۳ دوز منقسم می باشد و مقدار دوز نگهدارنده روزانه ۰/۲ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در ۳ دوز منقسم می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

تب، راش پوستی، خارش، لکوپنی، آگرانولوسیتوز، نوروپاتی محیطی، درد و التهاب مفاصل، سندرم شبه لوپوس، آئمی آپلاستیک، لنفادنوپاتی، ترومبوسیتوپنی، یرقان کلاستاتیک، بزرگی غدد بزاقی، التهاب کلیه، گیجی، اختلال در حس چشایی، تهوع، استفراغ و درد شکمی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷-۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SP48- 02/ 03

ملوکسیکام (کاملوکس ۷/۵ و ۱۵)

Camelox 7.5 & 15

Meloxicam
Tablet

کاملوکس ۷/۵ و ۱۵

ملوکسیکام
قرص

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- حساسیت به آسپیرین و یا دیگر دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی.
- سابقه ابتلا به بیماری هایی نظیر آسم، انقباض مجاری هوایی به واسطه وجود پولیپ بینی، خونریزی گوارشی، بیماری های قلبی - عروقی، افزایش فشار خون، نارسایی احتقانی قلب و نارسایی عملکرد کلیه و کبد.
- مصرف داروهایی مانند مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین، آسپیرین، فورزماید، لیتیم، متوترکسات، وارفارین یا سایر آنتی کوآگولانت ها.
- مصرف الکل و سیگار.
- مصرف در بارداری و شیردهی.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- در صورت مصرف طولانی مدت این دارو به طور مرتب به پزشک مراجعه نمایید.
- از مصرف دو یا چند داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) به طور هم زمان خودداری نمایید.
- در صورت مشاهده علایمی مانند ادم، خونریزی گوارشی، مشکلات قلبی - عروقی، افزایش وزن غیر عادی و بثورات پوستی سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت مشاهده علایم سمیت کبدی مانند تب، خستگی، خارش، سستی، تهوع و درد شکمی به پزشک مراجعه نمایید.
- توجه داشته باشید که مصرف این دارو باعث تغییر در نتایج آزمون های عملکرد کبدی (ALT, AST) می گردد.
- مصرف این دارو به عنوان ضد درد در بیمارانی که کاندید عمل جراحی عروق کرونر می باشند ممنوعیت دارد.
- این دارو را می توان با معده خالی یا همراه غذا با یک لیوان آب مصرف نمود.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:
جهت درمان آرتروز روماتوئید و استئوآرتروز در بزرگسالان: دوز شروع درمان و دوز نگهدارنده دارو ۷/۵ میلی گرم یک بار در روز و حداکثر دوز دارو ۱۵ میلی گرم یک بار در روز است.

کودکان: ایمنی مصرف این دارو در کودکان و افراد زیر ۱۸ سال ثابت نشده است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت کنید.
واکنش های آلرژیک، آسم، ناراحتی قلبی، کولیت، تشنج، تنگی نفس، خونریزی گوارشی، کاهش یا افزایش فشار خون، لکوپنی، مدفوع خونی، التهاب پانکراس، آتمی، پیرقان، سندرم استیونس-جانسون و اختلالات کلیوی از جمله عوارضی هستند که در صورت مشاهده آنها باید سریعاً به پزشک مراجعه شود.

سو: هاضمه، نفخ، دردهای شکمی، اسهال، اختلالات بینایی، ریزش مو، اضطراب، گیجی، بیبوست، تهوع و استفراغ، خشکی دهان، افسردگی، خواب آلودگی، تعریق زیاد، تب و افزایش یا کاهش وزن از دیگر عوارض این دارو می باشند که در صورت تداوم آنها بهتر است با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری:

انجمن غذا و داروی ایالات متحده (FDA) مصرف این دارو را در بارداری در رده C قرار داده است. بدین معنی که مطالعات انجام گرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی حاکی از تاثیر سو: بر روی جنین است اما مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری در انسان وجود ندارد، بنابراین مصرف این دارو در دوران بارداری به خصوص سه ماهه سوم توصیه نمی شود.

مصرف در شیردهی:

از آنجایی که مطالعات کافی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر در دسترس نمی باشد، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد و در صورت تجویز و الزام استفاده دارو توسط پزشک، می بایست شیردهی متوقف گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



BRC/ P- S M B 8 - 01 / 03

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن صدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷-۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸

مدروکسی پروژسترون (مدروفم)

Medrofen 5
Medroxyprogesterone
Scored Tablet

مدروفم ۵
مدروکسی پروژسترون
قرص خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو: این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به پروژستین ها و موارد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر: ترموفلیت، اختلالات حاد کبدی، بیماری های عروق مغزی، سابقه ابتلا به بیماری های ترموآمبولیک، سرطان سینه و خونریزی واژینال با دلیل نامشخص.
- در صورت مصرف هم زمان با داروهای: آمینوگلوتمید، کاربامازپین، فنی تونین، ریگامپین، آتازاناویر، باربیتورات ها، کلوبازام، گریزنوفولون، ایتراکونازول، کتوکونازول و فنوباریتال.
- در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- این دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید و دوره درمان را کامل نمایید.
- به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور مرتب با پزشک خود در تماس باشید. همچنین در صورت تاخیر در قاعدگی و یا بروز خونریزی های غیر عادی فوراً به پزشک مراجعه نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است باعث گیجی شود که ۴-۱ ساعت پس از مصرف دارو ایجاد می شود. در صورت رانندگی یا کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
- در صورت مشکوک شدن به آبستنی مصرف دارو را فوراً قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.
- در برخی بیماران عوارض مربوط به دندان مانند حساسیت غیر طبیعی لثه ها به لمس و فشار، تورم یا خونریزی لثه ها دیده می شود که در این صورت استفاده از مسواک و نخ دندان و ماساژ دادن لثه ها توصیه می شود.

در ضمن برای بررسی وضعیت دندان ها به طور منظم به دندانپزشک مراجعه نمایید.

مقدار مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:
- درمان آمنوره ثانویه: ۱۰-۵ میلی گرم در روز به مدت ۱۰-۵ روز که از هر زمانی از دوره قاعدگی می توان درمان را آغاز نمود.
 - برای کنترل خونریزی غیر معمول رحمی ناشی از عدم تعامل هورمونی در شرایطی که بیماری ارگانیکی وجود نداشته باشد: ۱۰-۵ میلی گرم در روز به مدت ۱۰-۵ روز که می توان آن را از روز شانزدهم یا بیست و یکم دوره عادت ماهیانه شروع کرد.
 - برای ایجاد تغییرات ترشعی مطلوب در آندومتر که بوسیله استروژن های درون زاد یا برون زاد به حد کافی تحریک شده است: مقدار ۱۰ میلی گرم به مدت ۱۰ روز مصرف می شود که شروع آن از روز شانزدهم قاعدگی می باشد.
 - پیشگیری از هایپرپلازی رحمی ناشی از تجویز استروژن در خانم های یائسه: به میزان ۱۰-۵ میلی گرم روزانه برای ۱۴-۱۲ روز متوالی در ماه که از روز اول یا شانزدهم قاعدگی آغاز می شود.

مصرف در بارداری:

در هنگام مصرف پروژستین ها، در صورت بارداری حتماً به پزشک اطلاع دهید. دوز بالای پروژستین ها در بارداری باعث ایجاد ناهنجاری مادرزادی می گردند.

به طور کلی مصرف مدروکسی پروژسترون در طول بارداری توصیه نمی گردد و ممنوع است.

مصرف در شیردهی:

اگرچه پروژستین ها به داخل شیر مادر ترشح می شوند ولی تا کنون گزارشی مبنی بر ایجاد مشکلات در نوزاد مشاهده نشده است. با این وجود، پروژستین ها ممکن است باعث تغییرات در کیفیت یا مقدار شیر مادر شوند. بنابراین بهتر است که در دوران شیردهی داروی دیگری مصرف شود و در مورد مصرف این دارو در دوران شیردهی منافع دارو در برابر مضرات آن باید توسط پزشک سنجیده شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

حساس شدن سینه ها، لکه بینی، تغییر در مقدار خونریزی قاعدگی، آمنوره، خونریزی غیر معمول واژینال، گالکتوره، تغییر در وزن، تهوع، اختلال در خواب، تب، افسردگی، ایجاد بثورات جلدی، ادم، یرقان کلساتییک و پرمویی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



BRC/ P- SJ 33- 01/ 02

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۴۴۹ داخلی ۳۵۸

مدروکسی پروژسترون استات (دیوجسترون)

مدروکسی پروژسترون استات Medroxyprogesterone Acetate

150mg / 1ml

۱۵۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

Depogesteron

دیوجسترون

Injectable Suspension

سوسپانسیون تزریقی

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:
- وجود هر نوع حساسیت به پروژستین ها، غذاها (به خصوص بادام زمینی)، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت داشتن هر نوع رژیم غذایی مانند رژیم غذایی کم نمک و یا رژیم غذایی دارای قند پایین.
- در صورت بارداری و شیردهی.
- در صورت مصرف داروهای زیر:
آمینوگلوتمید، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین و ریفامپین.

- در صورت داشتن سابقه ابتلا به بیماری های زیر:

صرع، مشکلات قلبی، ناراحتی های کلیوی، خونریزی های غیر طبیعی مانند وجود خون در ادرار و یا خونریزی غیر طبیعی از واژن، دیابت ملیتوس، بیماری های کبدی و بیماری هایی که احتمال ابتلا به پوکی استخوان را تشدید می کند. لخته شدن خون و اختلالات ترومبوآمبولیک، بیماری های عروق مغزی، میگرن، سرطان سینه و یا احتمال ابتلا به آن.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

- این دارو را فقط طبق نظر پزشک مصرف نمایید.
- چنانچه خونریزی غیر منتظره از واژن برای مدت طولانی رخ داد با پزشک خود مشورت نمایید.
- چنانچه سیکل ماهیانه شما برای مدت ۴۵ روز از آخرین دفعه قاعدگی تکرار نشد با پزشک خود مشورت نمایید.
- چنانچه احتمال می دهید به تاخیر افتادن قاعدگی شما به علت بارداری می باشد باید فوراً مصرف این دارو را قطع کنید و پزشک خود را مطلع نمایید.
- چنانچه می خواهید یک آزمایش طبی بدهید مصرف پروژسترون را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
- در بعضی از بیماران ممکن است این دارو باعث خونریزی از لثه شود بنابراین توصیه می شود که دندان هایتان را مرتب مسواک نمایید و لثه های خود را ماساژ دهید.
- در صورتی که زمان تزریق بعدی دارو از ۱۳ هفته تجاوز نماید، از یک روش دیگر جلوگیری از بارداری استفاده نموده و به پزشک خود مراجعه نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می نماید ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
- به منظور جلوگیری از بارداری: ۱۵۰ میلی گرم هر سه ماه یک بار به صورت عضلانی تزریق می گردد.
- جهت درمان آندومتریوز: ۱۵۰ میلی گرم هر سه ماه یک بار به مدت حداقل ۶ ماه به صورت عضلانی تزریق می گردد.
- قبل از مصرف آمپول را خوب تکان دهید.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف در شیردهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می شود ولی اثرات آن بر روی شیرخوار مشخص نشده است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید:

لخته شدن خون، حمله قلبی، سکت، مشکلات کبدی و چشمی، سردرد میگرنی، درد سینه، تغییر در تکلم صدا، تغییر در بینایی، کوتاه شدن تنفس، افزایش دفعات خونریزی ماهیانه، افزایش و یا کاهش حجم خون در دوره قاعدگی، توقف سیکل ماهیانه، جوش های پوستی به خصوص در ناحیه صورت، افزایش ترشح شیر، تورم صورت و پاها، مشکل در به خواب رفتن، کاهش میل جنسی، سفتی و درد پستان، درد در محل تزریق، افزایش وزن، هایپرگلیسمی با علائمی مانند تکرار در ادرار، کاهش اشتها و خشکی دهان، افسردگی، کاهش فشارخون و کم کاری غده آدرنال، سندرم کوشینگ، پوکی استخوان، اسهال، تهوع، استفراغ، عصبانیت، بزرگ شدن تخمدان ها و یا تشکیل کیست تخمدان، خستگی غیر معمول، افزایش یا کاهش موی سر و بدن گرگرفتگی و تغییر در خلق و خو.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۱۹ داخلی ۳۵۸



BRC-P-PHI3-01/03

ناندرولون دکانونات (دکاندرولون)

Nandrolone Decanoate 25
Decandrolone
Injectable Solution

ناندرولون دکانونات ۲۵
دکاندرولون
محلول قابل تزریق

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
جهت مصرف در کم خونی حاصل از نارسایی کلیه در خانم‌ها: ۵۰-۱۰۰ میلی گرم به فاصله ۱ تا ۴ هفته به صورت عضلانی تزریق می‌شود.
در آقایان: ۲۰۰-۵۰۰ میلی گرم به فاصله ۱ تا ۴ هفته به صورت عضلانی تزریق می‌گردد. بنابر تشخیص پزشک ممکن است درمان تا ۱۲ هفته نیز ادامه یابد. بدین صورت که پس از ۴ هفته یک دوره استراحت بدون دریافت دارو به بیمار داده شده و پس از آن سیکل درمانی با توجه به نظر پزشک ادامه می‌یابد.
کودکان بین ۲ تا ۱۳ سال: ۵۰-۲۵ میلی گرم به صورت تزریق عضلانی در طول ۳ تا ۴ هفته.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود.
اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود.
عوارض جانبی در خانم‌ها: آکنه یا پوست چرب، بزرگ شدن کلباتوریس، کلفت شدن صدا، رشد یا ریزش غیر طبیعی مو، عادت ماهیانه نامنظم و به ندرت افسردگی.
عوارض جانبی در آقایان: آکنه، کاهش فعالیت جنسی.
عوارض جانبی در پسران: بزرگ شدن آلت تناسلی، رشد غیرطبیعی مو، افزایش فعالیت نعوظ.
عوارض مشترک بین خانم‌ها و آقایان که به محض مشاهده این عوارض باید به پزشک مراجعه شود: درد استخوان، افزایش غیر عادی وزن، سرگیجه و تهوع.
سایر عوارض جانبی که به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو رفع می‌شوند عبارتند از: احساس سرما، اسهال، درد و نفخ معده، گرفتگی عضلات، اشکال در به خواب رفتن و کاهش غیر عادی تمایلات جنسی (در صورت ادامه یافتن این عوارض به پزشک اطلاع دهید).

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

وجود هر نوع حساسیت به استروئیدهای آنابولیک یا آندروژن‌ها و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ‌ها.
در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر سرطان پستان، دیابت ملیتوس، بزرگی پروستات و یا سرطان پروستات، بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری کلیوی و کبدی و بالا بودن میزان کلسیم خون یا سابقه آن.
در صورت مصرف هم‌زمان با داروهای زیر:
فنی‌توئین، والپروئیک اسید، کلروکین، نالترکسون، استامینوفن، استروژن‌ها، متیل‌دوپا، فنوتیازین‌ها و آندروژن‌ها (هورمون‌های مردانه).
در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

دارو را دقیقاً طبق تجویز پزشک مصرف نمایید و از مصرف مقادیر بیشتر دارو جداً خودداری نمایید.
به منظور تاثیر بهتر دارو طبق تجویز پزشک از رژیم‌های غذایی حاوی پروتئین و کالری زیاد استفاده نمایید.
در صورتی که یک نوبت از دارو را فراموش کردید به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید اما اگر تقریباً نوبت بعدی مصرف دارو فرا رسیده است آن نوبت از دارو را حذف و به هیچ وجه مقدار مصرف بعدی را دو برابر نکنید و مصرف دارو را طبق روال عادی ادامه دهید.
به منظور کنترل بهبود بیماری باید بطور مرتب تحت نظر پزشک باشید.
این دارو ممکن است باعث تغییر میزان قند خون در بیماران مبتلا به دیابت گردد لذا قبل از انجام هرگونه آزمایش در این زمینه با پزشک خود مشورت نمایید.
مصرف این دارو در مردان سالخورده ممکن است سبب بروز بزرگی پروستات یا سرطان پروستات گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف ناندروولون در زنان باردار و شیرده به طور معمول پیشنهاد نمی‌شود ولی در موارد اضطراری باید با نظر پزشک متخصص مصرف گردد.

مصرف در کودکان:

مصرف در کودکان ممکن است باعث توقف رشد گردد و ممکن است باعث رشد جنسی زودرس در پسران و باعث ایجاد صفت مردانه در دختران گردد.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۱۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PA01-01/ 03

ناپروکسن (ناپرون ۲۵۰ و ۵۰۰)

ناپرون ناپروکسن

Napron Naproxen

F.C. Tablet 250 mg
E.C. Tablet 500 mg

قرص روکش دار ۲۵۰ میلی گرم
قرص اتتریک کتده ۵۰۰ میلی گرم

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید: - سابقه هرگونه واکنش غیر عادی یا حساسیتی نسبت به داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی یا هر ماده دیگر اعم از دارویی، غذایی، مواد محافظ یا رنگ ها.

- بارداری و شیردهی.

- ابتلا به بیماری هایی نظیر اختلالات خونی، اختلالات گوارشی (کولیت، زخم معده و یا دیگر مشکلات معده ای)، بیماری های کلیوی و کبدی، آنمی، آسم، صرع، فشار خون بالا، پارکینسون، اختلالات عصبی و اعتیاد به الکل.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو در ۳ ماهه ی سوم بارداری غیر مجاز می باشد. توصیه می شود در ارتباط با مصرف این دارو در دوران بارداری با پزشک معالج مشورت گردد.

مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی غیر مجاز می باشد.

هشدارها:

- مصرف در کودکان زیر ۲ سال ممنوع است.

- پس از مصرف این دارو به مدت ۳۰-۱۵ دقیقه از دراز کشیدن خودداری نمایید.

- قرص ناپروکسن ۵۰۰ میلی گرم اتتریک کتده را ببلعید و از جویدن آن خودداری کنید و در هنگام مصرف از خرد کردن یا شکستن آن پرهیز نمایید.

- مصرف قرص ناپروکسن ۵۰۰ میلی گرم اتتریک کتده برای کودکان غیر مجاز است.

- مصرف این دارو در افراد مبتلا به نارسایی قلبی شدید ممنوع است. - تجویز این دارو در سالمندان به دلیل ریسک آسیب های گوارشی باید با احتیاط فراوان انجام شود.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- قبل از اقدام به هر عمل جراحی (از جمله دندانپزشکی) مصرف این دارو را به پزشک مربوطه اطلاع دهید.

- از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب نمایید.

- برای کاهش عوارض گوارشی، دارو را همراه با غذا با یک لیوان پراز آب میل نمایید.

- از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.

پزشک خود را مطلع سازید:

- اگر علائم بیماری بهبود نیافته و یا بدتر شود.

- اگر این دارو برای کاهش تب مصرف شود و پس از ۳ روز نتیجه مطلوب حاصل نگردد، و یا اگر ناحیه ی دارای درد دچار قرمزی و تورم شود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند و میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت است ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

کنترل درد خفیف تا متوسط در بزرگسالان: قرص ۵۰۰ میلی گرمی هر ۱۲ ساعت و یا قرص ۲۵۰ میلی گرمی هر ۶ الی ۸ ساعت.

اگر مصرف یک دوز را فراموش نمودید به محض به یاد آوردن، آن را مصرف نمایید ولی در صورتی که زمان به یاد آوردن شما هم زمان با مصرف دوز بعدی بود فقط یک دوز این دارو را مصرف نمایید و از دو برابر نمودن دوز خودداری نموده و بقیه را مطابق با برنامه مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید. برخی عوارض جانبی که در صورت مشاهده ی آنها، سریعاً باید دارو را قطع نمایید شامل شوک آنافیلاکسی، برونکواسپاسم، استفراغ خونی، خونریزی از بینی بدون علت مشخص، درد سینه، تشنج، سنکوپ، خونریزی گوارشی و دیسکرازی خونی می باشد. از عوارض دیگر این دارو می توان اختلال در تکلم، توهم، مننژیت، آسپتیک، میگرن، تغییر خلق و خو، نوروپاتی محیطی، آلرژی پوستی، اختلالات گوارشی، سندرم استیونس جانسون، عفونت های ادراری، آنمی، هپاتیت و تب را نام برد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- دارو را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.



ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۳۵۸۱۷۰۵۵۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/P-SM40-01/02

ویتامین د۳ (سان ویت)

ویتامین د۳ (کوله کلسیفرول) Vitamin D₃ (Cholecalciferol)

Sunvit

سان ویت

Injectable Solution

محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

ویتامین د مانع برداشت کلسیم از استخوان می شود. این ویتامین برای رشد استخوان ها و دندان ها بسیار ضروری می باشد. کمبود و فقدان این ویتامین به خصوص در اطفال سبب بروز نرمی استخوان می شود و استخوان ها و دندان ها ضعیف می گردند. این ویتامین در روغن کبد ماهی، شیر، تخم مرغ، کره، جگر موجود است.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

– سابقه حساسیت به ویتامین د۳ (ترکیبات ویتامین د) یا داروهای دیگر، غذاها و مواد محافظ.

– در صورت مصرف آنتی اسید های حاوی آلومینیوم، ضد مرع ها (هیدانتوئین، باربیتورات ها یا پریمیدون)، کلسی تونین، اتیدرونیت، گالیوم نیترات، پامیدرونیت، پلیکامایسین، کلسیتیرامین، کولستپول، میترال اوپیل، گلیکوزیدهای دیجیتال، مهار کننده های آنزیم کبدی، فرآورده های حاوی کلسیم و فسفات، دیورتیک های تیازیدی، ریفامپیسین، ایزونیازید و کورتیکو استروئیدها و در صورت مصرف دیگر آنالوگ های ویتامین د.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

– این دارو فقط باید به صورت عضلانی تزریق شود.

– این دارو در نوزادان نارس و تازه متولد شده به دلیل وجود بنزیل الکل در فرمولاسیون دارو منع مصرف دارد.

– از مصرف بیش از حد این دارو خودداری نمایید.

– از مصرف این دارو در بیماران مبتلا به هایپر کلسمی و همچنین ناراحتی های قلبی-عروقی و کلیوی بپرهیزید.

– مصرف این دارو در اطفال و سالمندان بایستی تحت نظر پزشک باشد.

توجه داشته باشید که مصرف برخی از داروهای ضد مرع مثل کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی تونین و پیریمیدون نیاز به ویتامین د را افزایش می دهند.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

– مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند و این دستورات ممکن است

با اطلاعات موجود در این بروشور متفاوت باشد ولی به طور کلی مقدار مصرف دارو به قرار زیر است :

– جهت درمان کمبود ویتامین د، مقدار مصرف توصیه شده به میزان ۸۰۰-۴۰۰ واحد در روز می باشد.

– در کمبود ویتامین د ناشی از سوء جذب و یا اختلالات کبدی نیاز به دوزهای بالاتر این ویتامین تا مقدار ۴۰,۰۰۰ واحد در روز نیاز می باشد.

– جهت درمان هایپوکلسمی ناشی از هایپوپاراتیروئیدیسم مقادیر بالاتر تا میزان ۲۰۰,۰۰۰ واحد در روز توصیه می گردد.

مصرف در بارداری:

مصرف این دارو طی دوران بارداری با نظر پزشک مجاز است.

مصرف در شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی با نظر پزشک مجاز است.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر کدام از عوارض زیر بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.

عوارض این ویتامین نادر بوده و تنها در صورت مصرف بیش از حد آن مشاهده می شود.

از عوارض مهم این دارو می توان به هایپر فسفاتمی و هایپر کلسمی اشاره نمود که هایپر کلسمی منجر به رسوب کلسیم در بافت ها و بروز اختلالات کلیوی و قلبی-عروقی می گردد.

عوارض ناشی از مصرف بیش از اندازه این ویتامین، بی اشتها، ضعف و خستگی، تهوع و استفراغ، یبوست یا اسهال، پر ادراری، شب ادراری، تعریق، سردرد، تشنگی، خواب آلودگی و سرگیجه می باشد.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری و از بخ زدگی محافظت نمایید.

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن صدای مشتری : ۱۹-۱۷۰۵۵۱۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PC07-02/ 02

ویتامین ب ۶

Vitamin B₆

Supplement

Scored Tablet

ویتامین ب ۶

مکمل غذایی

قرص خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف فرآورده:

این فرآورده برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

– مواد جانبی: پوویدون K25، لاکتوز مونوهیدرات، منیزیم استئارات، اتانول ۹۶ %

قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

– وجود هر نوع حساسیت به ویتامین ب ۶ و موارد دیگر از قبیل: غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت مصرف هم زمان با داروهای دیگر به خصوص لوودوپا و فنی تونین.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف فرآورده:

– از آنجایی که کمبود ویتامین های گروه ب به تنهایی شایع نیست، به طور معمول ترکیبی از این ویتامین ها تجویز می شود.

– این فرآورده را به عنوان جایگزینی برای رژیم غذایی متعادل استفاده نکنید.

– بیش از مقدار مصرف توصیه شده در روز مصرف نکنید، زیرا خطر مسمومیت با مصرف مقادیر زیاد و به مدت طولانی وجود دارد.

مصرف در بارداری:

تاکنون هیچ گونه عوارضی با مصرف مقادیر عادی مورد نیاز روزانه ثابت نشده است، لذا توصیه می شود ویتامین ب ۶ در دوران بارداری بیشتر از مقدار مورد نیاز روزانه مصرف نگردد.

مصرف در شیردهی:

ویتامین ب ۶ به داخل شیر ترشح می شود ولی با مصرف مقادیر عادی مورد نیاز روزانه، هیچ گونه عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده است ولی مصرف بالای ۶۰۰ میلی گرم در روز باعث مهار ترشح شیر می گردد.

مقدار مصرف فرآورده:

در کمبود عمومی ویتامین ب ۶ تا دوز ۱۵۰ میلی گرم در روز مصرف می شود و در انواع خاصی از آنمی مثل آنمی سیدروبلستیک و درمان اختلالات خاص متابولیک مانند هموسیستین اوریا و یا هیپوواگزالوری اولیه تا ۴۰۰ میلی گرم در روز تجویز می شود. همچنین از دیگر موارد مصرف این فرآورده، کمبود ویتامین ب ۶ ناشی از مصرف داروهایی مانند ایزونیازید، هیدرالازین و ضدبارداری های خوراکی، تهوع و استفراغ در حاملگی، سندرم پیش از قاعدگی و سندرم تونل کارپ می باشد.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود:

– مصرف مقادیر ۲۰۰ میلی گرم در روز به مدت طولانی سبب ایجاد سندرم وابستگی به ویتامین ب ۶ می شود.

– مصرف مقادیر بسیار زیاد (۲ تا ۷ گرم در روز) این ویتامین به مدت چند ماه سبب نوروپاتی وخیم حسی، لرزش، ناهماهنگی و بی نظمی در حرکات عضلات، عدم تعادل در هنگام راه رفتن، بی حسی پا تا کرختی و از دست دادن مهارت دست ها می شود. به نظر می رسد که این حالات با قطع مصرف ویتامین ب ۶ قابل برگشت باشند، هر چند که مشاهده شده است که برخی از این ضعف ها باقی می مانند.

شرایط نگهداری:

– فرآورده را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

– فرآورد را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P-SC11-01/02

ویتامین ب ۱۲ (بیتاویون ۵۰۰ و ۱۰۰۰)

اطفال:

برای درمان علانم خونی ۱۰ الی ۵۰ میکروگرم در روز به مدت ۵ تا ۱۰ روز و سپس ۱۰۰ الی ۲۵۰ میکروگرم هر ۲ تا ۴ هفته تزریق می شود.
در صورت وجود علانم عصبی ۱۰۰ میکروگرم در روز به مدت ۱۵ تا ۱۰ روز و سپس ۱ یا ۲ بار در هفته به مدت چند ماه تجویز می شود و می توان ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ میکروگرم را ماهانه به مدت ۱ سال تزریق نمود.

مصرف در بارداری:

با مصرف مقدار مورد نیاز روزانه این ویتامین در دوران بارداری (۲/۲ میکروگرم در روز) عوارضی در انسان مشاهده نشده است.
جهت مصرف مقادیر بالاتر از نیاز روزانه در این دوران با پزشک معالج مشورت گردد.

مصرف در شیردهی:

این ویتامین با غلظتی تقریباً هم سطح غلظت خونی آن در شیر ترشح می شود.
میزان ویتامین ب ۱۲ مورد نیاز در دوران شیردهی ۲/۶ میکروگرم در روز می باشد.
لذا جهت مصرف مقادیر بالاتر از نیاز روزانه در این دوران با پزشک معالج مشورت گردد.

عوارض جانبی:

هر دارویی به موازات اثرات درمانی دارای برخی عوارض ناخواسته می باشد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت کنید:

بثورات پوستی، خارش، ادم ریوی، نارسایی احتقانی قلب، ترومبوز عروق محیطی، شوک آنافیلاکتیک، اسهال گذرا و درد در محل تزریق.

درمان با ویتامین ب ۱۲ ممکن است علانم پلی سیتمی ورای مخفی را آشکار سازد.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
– از نگهداری و مصرف داروی تاریخ مصرف گذشته خودداری کنید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن مدای مشتری: ۰۹-۱۷۵۵۱۷۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P-PC05- 02/ 03

Vitamin B₁₂

ویتامین ب ۱۲

Bitavion 100 & 1000 mcg

بیتاویون ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم

Injectable Solution

محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به ویتامین ب ۱۲، کبالت، غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت بارداری و شیردهی.

– در صورت مصرف داروهای زیر:

آمینوسالیسیلیک اسید، کلرامفیکل، کلشی سین، متوترکسات، پیریمتامین و الکل.

– در صورت داشتن سابقه ابتلا به بیماری Leber (آتروفی ارثی عصب بینایی).

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

– این دارو را فقط طبق نظر پزشک مصرف نمایید.

– از مصرف فولیک اسید به جای ویتامین ب ۱۲ خودداری نمایید.

فولیک اسید ممکن است کم خونی را برطرف نماید ولی از پیشرفت عوارض عصبی ناشی از کمبود ویتامین ب ۱۲ جلوگیری نمی کند.

موارد و مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف صحیح هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

– درمان آئمی پرنیسیوز (سو، جذب ویتامین ب ۱۲)

بزرگسالان:

۱۰۰ میکروگرم به مدت ۶ یا ۷ روز به صورت تزریق عمیق زیر جلدی یا عضلانی تجویز می شود.

به دنبال آن در صورتی که بهبود بالینی و پاسخ رتیکولوسیت پدید آید مقدار ۱۰۰ میکروگرم یک روز در میان برای ۷ نوبت و سپس هر ۳ تا ۴ روز یک بار به مدت ۳-۲ هفته تزریق عمیق زیر جلدی یا عضلانی صورت می گیرد.

مصرف نگهدارنده این ویتامین یک بار در هر ماه به میزان ۱۰۰ میکروگرم می باشد.

– درمان کمبود ویتامین ب ۱۲:

بزرگسالان:

۳۰ میکروگرم در روز به مدت ۵ تا ۱۰ روز به صورت عضلانی و یا زیر جلدی عمیق تزریق می گردد که دوز نگهدارنده آن ۱۰۰ الی ۲۰۰ میکروگرم در ماه می باشد.

ویتامین اچ (بیوتین) (ویتا اچ ۵ میلی گرم)

Vita H 5 mg

Biotin

Scored Tablet

ویتا اچ ۵ میلی گرم

بیوتین

قرص خط دار

پیش از شروع مصرف بیوتین و هربار که قرار است مصرف این دارو را تکرار نمایید این برگه راهنما را مطالعه کنید زیرا ممکن است حاوی مطالب جدید باشد. این برگه راهنما جایگزین صحبت با پزشک و داروساز در مورد بیماری و یا درمان آن نمی باشد.

ویتا اچ چیست و به چه منظور استفاده می شود:

قرص ویتا اچ (وی-تا-اچ) حاوی ماده موثره بیوتین با میزان ۵ میلی گرم در هر قرص می باشد که تحت عنوان ویتامین H یا B7 نیز شناخته می شود و در واقع از گروه ویتامین های B است و برای موارد زیر به کار می رود:

- بیوتین به بدن کمک می کند تا چربی ها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها را تجزیه کند.
- بیوتین به عنوان درمان جایگزین به عنوان یک عامل کمکی موثر احتمالی در درمان یا پیشگیری از کمبود بیوتین استفاده شده است. کمبود بیوتین می تواند ناشی از سو: تغذیه، کاهش سریع وزن سریع، تغذیه طولانی مدت با لوله و سایر شرایط پزشکی باشد.

آنچه که باید پیش از مصرف ویتا اچ بدانید:

ویتا اچ برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران حتی در صورتی که علایم شبیه به شما دارند خودداری نمایید.
اگر سابقه واکنش غیرمعمول یا آلرژی با این دارو یا سایر داروها، غذاها، رنگ ها، مواد نگهدارنده یا حیوانات داشته اید، پزشک خود را مطلع کنید.

در طول مصرف این دارو باید بدانید:

- بیوتین می تواند با برخی تست های آزمایشگاهی مانند آزمایشات عملکرد تیروئید و یا آزمایش سطح ویتامین D3 خون تداخل ایجاد نماید.

ویتا اچ را چگونه مصرف نماید:

مقدار مصرف داروی شما را پزشک تعیین می کند، تمامی دستورات پزشک یا داروساز خود را با دقت دنبال کنید. این دستورات ممکن است با اطلاعات موجود در این برگه راهنما متفاوت باشد.

چه مقدار مصرف کنید:

بزرگسالان:

۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میکروگرم در روز

کودکان:

۴ سال سن و بیشتر ۳۰۰ میکروگرم در روز

سالمدان:

۳۰ میکروگرم در روز

چه زمانی مصرف کنید:

قرص همراه با غذا و مایعات در یک دوز و یا به صورت منقسم در روز مصرف نمایید.

برای چه مدت مصرف کنید:

مصرف دارو را تا زمان تعیین شده توسط پزشک خود ادامه دهید.

اگر دارو را بیش از حد معمول مصرف کردید:

هیچ مدرکی برای اثبات سمیت بیوتین در دوزهای بالا وجود ندارد. مطالعات انجام شده هیچ گونه اثرات سو، با دوز ۵۰ - ۱۰ میلی گرم بیوتین در روز پیدا را نشان نداده است و تا ۲۰۰ میلی گرم در روز بیوتین خوراکی در بیماران مبتلا به کمبود بیوتین از علایم سمیت را ایجاد نکرده است.
آیا می دانید ۱۹ شماره تلفن مرکز اطلاعات دارویی و سموم تهران و اکثر شهرستان ها می باشد؟

اگر مصرف یک دوز دارو را فراموش کردید:

اگر یک دوز مصرف این دارو را فراموش کردید، آن را در اسرع وقت مصرف کنید. با این حال، اگر تقریباً نوبت بعدی فرا رسیده است، از دوز فراموش شده صرف نظر کرده و مطابق قبل ادامه دهید. دوز دارو را دو برابر نکنید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

قبل از مصرف هرگونه دارو در دوران بارداری و شیردهی با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

- بارداری: بیوتین از جفت عبور می کند. مصرف روزانه ۳۰ میکروگرم بیوتین در دوران بارداری توصیه می شود.

- شیردهی: بیوتین وارد شیر مادر می شود. مصرف روزانه ۳۵ میکروگرم بیوتین در دوران شیردهی توصیه می شود.

مصرف هم زمان با سایر داروها:

اگر داروی دیگری از جمله داروهای گیاهی، ویتامین ها و مکمل های غذایی چه در صورتی که با نسخه و یا بدون نسخه مصرف می کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید به خصوص: الکل، تنباکو، داروهای ضد تشنج مانند کاربامازپین، پریمیدون، فنی تونین و فنوباربیتال.

عوارض جانبی احتمالی مصرف ویتا اچ چه می باشد:

هر دارو به موازات اثر درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. هر چند هیچ عارضه جانبی برای بیوتین در مقادیر حداکثر ۱۰ میلی گرم در روز گزارش نشده است. (drugs.com)

آیا می دانید در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبی می توانید از پزشک یا داروساز خود بخواهید کارت زرد ADR را برای شما پر کنند؟ (کارت زرد ADR در راستای ارتقای گزارش دهی عوارض دارویی تهیه شده است).

ویتا اچ چگونه نگه داری می شود:

- فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

- فرآورده را درون جعبه دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- تا موقع مصرف دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.

- از نگهداری دارو در حمام، سینک، پشت پنجره و نیز گذاشتن آن در خودرو خودداری نمایید.

- از مصرف دارو پس از تاریخ انقضای درج شده روی بسته بندی خودداری نمایید.

توصیف محصول:

شکل ظاهری ویتا اچ و نحوه عرضه آن چگونه است:

ویتا اچ به صورت قرص های سفید رنگ و خط دار در جعبه های ۳۰ عددی (۳ بلیستر کارت ۱۰ عددی) به همراه برگه راهنما عرضه می گردد.

تولید کننده:

ویتا اچ محصول شرکت داروسازی ایران هورمون می باشد.

کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی ۱۳۱۸۵۱۷۶۷، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۹-۰۵۵۱۷۰۹۴۹۹۸۲ + (داخلی ۳۵۸)

تاریخ بازنگری:

۱۴۰۰/۰۳/۲۳



BRC/ P-SV101-01/00

ویتامین اچ (بیوتین) (ویتا اچ ۳۰۰ میکروگرم)

Vita H 300 mcg

ویتا اچ ۳۰۰ میکروگرم

Biotin

بیوتین

Scored Tablet

قرص خط دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح فرآورده:

- این فرآورده صرفاً مکمل تغذیه ای بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری نمی باشد.
- این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.
- مواد جانبی: کراس کارملوز سدیم، پوویدون K25، لاکتوز مونوهیدرات، منیزیم استنارات، میزاستارچ، اتانول ۹۶٪

قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به هر یک از اجزاء سازنده فرآورده و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظت کننده و رنگ ها.
- در صورت مصرف داروهایی مانند کاربامازپین، فنی توبین، فنوباربیتال و پیریمیدون.
- در صورت بارداری و شیردهی.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف فرآورده:

- آنتی بیوتیک های وسیع الطیف سبب از بین رفتن باکتری های دستگاه گوارش که در ساخت بیوتین نقش دارند، می گردند. لذا در صورت مصرف این آنتی بیوتیک ها، احتمال کمبود این ویتامین و لزوم مصرف مکمل های حاوی آن وجود دارد.
- هیچ گونه اثرات سمی پس از مصرف این فرآورده، حتی در مقادیر بالا گزارش نشده است، با این حال توصیه می شود در صورت نیاز به مصرف مقادیر بالاتر از نیاز روزانه، با پزشک مشورت گردد.
- کمبود بیوتین با علائمی مانند زبان متورم و دردناک، خستگی، ریزش مو، درد عضلانی، کاهش اشتها، افسردگی، پوست خشک و ترک گوشه های دهان همراه است لذا توصیه می شود جهت پیشگیری از کمبود این ویتامین غذاهای حاوی آن مانند زرده تخم مرغ، شیر، کلم و مخمر با توجه به نیاز روزانه مصرف گردد و در صورت ابتلا به کمبود این ویتامین از مکمل ها و اشکال دارویی حاوی آن با توجه به نظر پزشک استفاده شود.

موارد و مقدار مصرف فرآورده:

مقدار مورد نیاز روزانه بیوتین به شرح زیر می باشد:

بزرگسالان: ۳۰۰ الی ۱۰۰۰۰ میکروگرم در روز

کودکان ۴ سال و بالاتر: ۳۰۰ میکروگرم در روز

سالمندان: ۳۰ میکروگرم در روز

مصرف در دوران بارداری:

با مصرف مقدار مورد نیاز روزانه این ویتامین در دوران بارداری (۳۰ میکروگرم در روز) مشکلی مشاهده نشده است. توصیه می شود جهت مصرف مقادیر بالاتر در این دوران با پزشک مشورت گردد.

مصرف در دوران شیردهی:

با مصرف مقدار مورد نیاز روزانه این ویتامین در دوران شیردهی (۳۵ میکروگرم در روز) مشکلی مشاهده نشده است. توصیه می شود جهت مصرف مقادیر بالاتر از نیاز روزانه در این دوران با پزشک مشورت گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت نمایید. عوارض جانبی ناشی از بیوتین بسیار نادر می باشند ولی عوارضی مانند کهیر و ناراحتی های گوارشی پس از مصرف این دارو مشاهده شده است.

شرایط نگهداری:

- فرآورده را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۵۵۱۷۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SC08- 01/ 03

ویتامین Vit.B12+ Vit.B6+Vit.B1 (بنورویت)

Vitamin B₁/B₆/B₁₂
Benourovit
Injectable Solution

ویتامین ب ۱ / ب ۶ / ب ۱۲
بنورویت
محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده دارو و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.
- در صورت مصرف داروهایی مانند لوودوپا، فنی تونین، آمینو سالیسیلیک اسید، کلرامفنیکل، کلشی سین، نئومایسین، متوترکسات، آنتاگونیست های گیرنده H₂، پریمتامین و الکل.
- در صورت ابتلا به بیماری Leber (آتروفی ارثی عصب بینایی).
- بارداری و شیردهی.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- توجه: به علت وجود بنزیل الکل، این دارو نباید در نوزادان نارس یا رسیده استفاده شود.
- توصیه می شود افرادی که به کبالت حساسیت دارند از مصرف این دارو خودداری نمایند.
- در بیمارانی که به کم خونی مگالوبلاستیک شدید مبتلا هستند، تجویز مقادیر زیاد ویتامین ب ۱۲ ممکن است به افت پتاسیم خون منجر شود.
- لذا توصیه می شود طی ۴۸ ساعت اول درمان با ویتامین ب ۱۲ سطح پتاسیم خون بیمار تحت بررسی قرار گیرد.
- از مصرف فولیک اسید به جای ویتامین ب ۱۲ خودداری نمایید زیرا فولیک اسید ممکن است علائم مربوط به کم خونی را برطرف نماید اما از پیشرفت عوارض عصبی جلوگیری نمی کند.
- به علت ناسازگاری ویتامین ب ۱ موجود در دارو با محلول های بازی توصیه می شود از ترکیب آن با محلول هایی نظیر کربنات ها، سیترات ها، باربیتورات ها، استات ها و یون های مس خودداری نمایید. همچنین محلول های حاوی سولفیت نیز با ویتامین ب ۱ ناسازگاری دارند.
- توصیه می شود بیمارانی که داروی لوودوپا مصرف می نمایند از مصرف اشکال دارویی حاوی ویتامین ب ۶ خودداری نمایند.
- مصرف مقادیر زیاد ویتامین ب ۶ در دراز مدت می تواند ایجاد وابستگی نماید.
- استفاده از مقادیر زیاد ویتامین ب ۶ در دراز مدت باعث بروز نوروپاتی شدید محیطی می گردد.
- هم چنین افت غلظت خونی اسید فولیک بعد از مصرف ویتامین ب ۶ مشاهده شده است.
- این دارو را به عنوان جایگزین برای رژیم غذایی متعارف استفاده نکنید.

مصرف در دوران بارداری:

توصیه می گردد مصرف این دارو در دوران بارداری، با نظر پزشک معالج و با سنجیدن فواید و مضرات دارو صورت گیرد.

مصرف در دوران شیردهی:

از آنجایی که احتمال مهار ترشح شیر توسط ویتامین ب ۶ موجود در دارو، وجود دارد و هم چنین در ارتباط با ترشح ویتامین ب ۱ در شیر مادر اطلاعات کافی در دسترس نیست لذا توصیه می شود این دارو در دوران شیردهی با توصیه پزشک معالج مصرف گردد.

موارد مصرف:

این دارو در موارد کمبود ویتامین های ب ۱، ب ۶، ب ۱۲ و یا افزایش نیاز بدن به این ویتامین ها به کار می رود، هم چنین به عنوان یک درمان حمایتی در نوروپاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف دارو توسط پزشک معالج تعیین می شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید.

احساس گرما، خارش، کهیر، ضعف، تعریق، انسداد عروق محیطی، تهوع، بی قراری، ادم ریوی، خونریزی گوارشی، اختلال در حس لامسه، نارسایی قلبی، خواب آلودگی، گرفتگی گلو، اسهال گذرا و درد در محل تزریق، احتمال بروز شوک با آنافیلاکسی فرآورده های تزریقی حاوی ویتامین ب ۱۲ نیز وجود دارد.

شرایط نگهداری:

- دارو را در یخچال (در دمای بین ۸- تا ۲ درجه سانتی گراد)، درون جعبه، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



BRG/ P- PC03- 01/ 05

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران
تلفن مدای مشتری: ۰۲۱-۳۵۸۱۷۰۵۵۴۴ داخلی ۳۵۸

ویتامین ب کمپلکس

Dexpanthenol +Nicotinamide +Vit.B6+ Vit.B2+Vit.B1

Vitamin B Complex

Injectable Solution

ویتامین ب کمپلکس

محلول قابل تزریق

هر آمپول ۲ میلی لیتری حاوی:

(Vit B1 10 mg-Vit B2 4 mg-Vit B6 4 mg-Dexpanthenol 6 mg-Nicotinamide 40 mg)

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

- وجود هر نوع حساسیت به هر یک از اجزا و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

- در صورت حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

- در صورت بروز هر گونه عوارض به پزشک معالج اطلاع دهید.

- به دلیل وجود بنزیل الکل در این دارو مصرف آن در نوزادان ممنوع می باشد.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

به طور معمول یک آمپول ۲ میلی لیتری به صورت عضلانی و یا انفوزیون وریدی طبق دستور پزشک آهسته تزریق می شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

با مصرف مقادیر مجاز روزانه این ویتامین ها در دوران بارداری و شیردهی، عوارضی در انسان مشاهده نشده است. توصیه می شود جهت مصرف مقادیر بالاتر از نیاز روزانه در دوران بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

برافروختگی عمومی، بثورات جلدی، سرگیجه، خارش و حساسیت غیر طبیعی به فشار یا لمس و سفتی عضلات در محل تزریق، پر رنگ شدن ادرار، تعریق، بی قراری، سفتی گلو و واکنش های حساسیتی.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۰۱۹-۱۷۵۵۱۰۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PC04-01/ 02

والگانسیکلوویر (به صورت هیدروکلراید) (والگاسیت-آی اچ)

Valgacyte- IH 450

Valganciclovir

F. C. Tablet

والگاسیت-آی اچ ۴۵۰

والگانسیکلوویر

قرص روکش دار

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

- این دارو بر حسب نیاز فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
- در صورت ابتلا به بیماری‌های کلیوی و سطح پایین سلول‌های خونی، موارد را به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
- توصیه می‌شود در طول مصرف این دارو معاینات مرتب پزشکی، مخصوصاً معاینه چشم و آزمایشات دوره ای خون انجام گیرد.
- وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر مواد جانبی داروها، غذاها، رنگ‌ها و مواد نگهدارنده را به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به این دارو و یا سابقه حساسیت به گانسیکلوویر یا والگانسیکلوویر.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری در رده C قرار دارد و مصرف آن در این دوران توصیه نمی‌شود. در صورت ارجحیت یافتن مزایای مصرف این دارو برای زنان باردار در مقابل خطرات آن، می‌تواند تحت نظر پزشک تجویز شود.

مصرف این دارو در دوران شیردهی به دلیل بروز عوارض جانبی برای نوزاد توصیه نمی‌شود. در صورت ضرورت مصرف دارو، پزشک معالج دستورات لازم را در مورد قطع شیردهی خواهد داد.

هشدار: این دارو دارای اثرات سمیت خونی، کارسینوژنی، تراتوژنی و اختلالات باروری است.

احتیاطات:

- در سالمندان، بیماران با نارسایی کلیوی و بیمارانی که از داروهای نفروتوکسیک استفاده می‌کنند احتیاط شود.
- در صورت پایین بودن سطح نوتروفیل‌ها، پلاکت‌ها و هموگلوبین خون و یا سابقه سائتوپنی در بیمار احتیاط شود.
- در صورت انجام پرتو درمانی و یا مصرف داروهای سرکوب‌کننده مغز استخوان احتیاط شود.
- در هنگام مصرف این دارو و در صورت بروز علائمی مانند تب و لرز، عفونت غیر عادی، گلو درد، کمر درد یا پهلو درد، سختی در ادرار، مدفوع سیاه رنگ، مشاهده خون در ادرار، خونریزی‌های غیر عادی و خون مردگی در پوست، پزشک خود را مطلع سازید.
- در طی مصرف این دارو از تماس با بیماران عفونی اجتناب نمایید.
- در طی مصرف این دارو به دلیل حساسیت لثه‌ها، مسواک زدن و نخ دندان کشیدن را به آرامی و با احتیاط انجام دهید و از بریدگی پوست نیز جلوگیری کنید.
- قبل از انجام اعمال جراحی و دندانپزشکی، پزشک و دندانپزشک خود را مطلع سازید.
- از تماس پوست و مخاط با قرص‌های خرد شده و یا شکسته شده اجتناب نمایید و در صورت تماس، پوست خود را با آب و مایون شستشو دهید. در صورت تماس با چشم، با آب شستشو دهید.
- توصیه می‌شود در طول مصرف این دارو در انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری و تمرکز بالا دارند، احتیاط نمایید.
- توصیه می‌شود خانم‌هایی که در سنین باروری قرار دارند، در طی مصرف این دارو و تا ۳۰ روز پس از اتمام دوره مصرف دارو، از روش‌های جلوگیری از حاملگی موثر استفاده نمایند.
- همچنین آگاهی این که این دارو را مصرف می‌نمایند، در طی مصرف این دارو و تا ۹۰ روز بعد از اتمام دوره مصرف، حتماً هنگام مقاربت از کاندوم استفاده نمایند.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

دیدانوزین، گانسیکلوویر، میکوفنولات متیل، داروهای سرکوب‌کننده مغز استخوان، داروهای نفروتوکسیک، پروبنسید، تری متوپریم، زیدوودین.

مصرف هم زمان این دارو با داروهای اشاره شده در فوق و پرتو درمانی، سرکوب مغز استخوان را تشدید خواهند کرد.

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

- درمان رتینیت سائتومگالوویروس فعال در بزرگسالان: شروع درمان با ۹۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز و به مدت ۲۱ روز است و دوز نگهدارنده، ۹۰۰ میلی گرم روزی یک بار است.
- پیشگیری از عفونت‌های سائتومگالوویروس در بیماران پیوندی: با ۹۰۰ میلی گرم روزی یک بار و حداکثر تا دهمین روز انجام پیوند، آغاز می‌شود و تا ۱۰۰ روز ادامه می‌یابد.
- دارو را همراه غذا میل نمایید تا جذب آن بیشتر شود.
- از شکستن و خرد کردن قرص‌ها خودداری نمایید.
- دارو را منظم و طبق دستور پزشک مصرف نمایید و دوره مصرف را کامل کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض شایع: آتمی (رنگ پریدگی پوست، سختی تنفس، خستگی غیر معمول)، نوتروپنی (لرز، سرفه، گرفتگی صدا، کمر درد، پهلو درد، ادرار سخت و دردناک، گلو درد، زخم و جراث و یا نقاط سفید در داخل مخاط دهان، خستگی غیر معمول)، ترومبوسیتوپنی (سیاه شدن مدفوع، مشاهده خون در ادرار و مدفوع، لکه‌های نقطه‌ای و قرمز پوستی، خونریزی یا خون مردگی غیر عادی)، جدا شدن شبکه‌ها (برق و درخشش در میدان دید، نقطه‌های قرمز متحرک در چشم)، تب، بی‌خوابی، زردی، کاهش فشار خون، لرزش.

عوارض با شیوع کم: خونریزی، کاهش فشار خون، بی‌قراری، گیجی، تشنج، افسردگی، سرگیجه، خستگی، توهم، اختلال در حواس، جنون، ضعف، آکنه، درماتیت، خارش، اتساع شکم، درد شکم، آسیت، سوزش دهان، کاهش کلیرانس کراتینین، سوزش ادرار، مشکلات کلیوی، عفونت مجاری ادراری، آتمی آپلاستیک، دیرسیون مغز استخوان، پان سیتوپنی، مشکلات کبدی، واکنش‌های اژدیاد حساسیت، کاهش میل جنسی، کاهش آب بدن، ادم، افزایش قند خون، هایپرکالمی، هایپوکالمی، هایپوکلسمی، هایپومگنیزمی، هایپوفسفاتی، ادم محیطی، درد مفاصل، گرفتگی عضلانی، فارتیت، نازوفارنژیت، افیوژن پلور، آبریزش بینی، عفونت‌های موضعی یا سیستمیک یا سپسیس، عفونت دستگاه تنفس فوقانی.

ممکن است عوارض دیگری نیز مشاهده شود که نیاز جدی به توجهات پزشکی نداشته و اغلب در ادامه روند مصرف دارو خود بخود رفع می‌شوند و یا با توصیه‌های پزشکی قابل برطرف شدن هستند مانند:

شکم درد، اسهال، سردرد، تهوع و استفراغ، بی‌حسی و کرختی، سوزش یا درد و یا حس ضعف در دست و پا، بی‌خوابی، گیجی و آشفتگی.

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران تلفن صدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SO67- 01/ 05

والاسیکلوویر (ویراترکس-آی اچ ۵۰۰ و ۱۰۰۰)

ویراترکس-آی اچ

۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم

والاسیکلوویر

قرص روکش دار

Viraterex-IH

500 & 1000 mg

Valacyclovir

F.C. Tablet

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر مواد جانبی، داروها، غذاها، رنگ ها و مواد نگهدارنده را به پزشک خود اطلاع دهید.

سابقه پیوند مغز استخوان، پیوند کلیه، بیماری های کلیوی، بیماری های کبدی و ابتلا به بیماری ایدز را به پزشک معالج اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت و یا عدم تحمل این دارو و یا داروی آسیکلوویر.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در رده B بارداری قرار دارد ولی از آنجایی که مطالعات کافی و کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است، مصرف دارو در دوران بارداری می بایست تحت نظر پزشک معالج و با توجه به مزایای مصرف دارو در برابر خطرات احتمالی آن صورت گیرد.

از آنجایی که در ارتباط با ورود دارو به شیر مادر اطلاعات دقیق در دسترس نیست، لذا مصرف آن در دوران شیردهی می بایست تحت نظر پزشک معالج و با احتیاط انجام شود.

احتیاطات:

• در بیماران با نارسایی کلیوی و بیماران مبتلا به ایدز و بیماران پیوندی و بیماران با وضعیت سیستم ایمنی تضعیف شده و سالمندان، با احتیاط مصرف شده و تنظیم مقدار دارو مورد نیاز می باشد.

• توصیه می شود طی مصرف این دارو مخصوصاً در سالمندان و بیماران کلیوی به اندازه کافی آب و مایعات مصرف شود.

• دوره درمانی را تکمیل نمایید و در صورتی که بعد از چندین روز از مصرف دارو، علائم بهبودی حاصل نشد با پزشک خود مشورت نمایید.

• از آنجایی که غذا بر روی جذب دارو تاثیری ندارد، می توان دارو را همراه غذا مصرف نمود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:

مایکوفنولات مقبیل، پروپنسید، سایمتیدین، مایکوفنولیک اسید.

مقدار و نحوه مصرف صحیح دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به شرح زیر می باشد: - درمان تبخال لب (هرپس لبیال) در بزرگسالان: ۲ گرم ۲ بار در روز (هر ۱۲ ساعت) و به مدت یک روز تجویز می شود. درمان می بایست با بروز اولین علائم بیماری مانند خارش، سوزش و... آغاز شود.

- درمان تبخال تناسلی (هرپس ژنیتال) بزرگسالان در اولین ابتلا: ۱ گرم ۲ بار در روز و به مدت ۱۰ روز تجویز می شود.

توصیه می شود درمان حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد از بروز علائم و تشخیص بیماری آغاز شود.

درمان تبخال تناسلی بزرگسالان در صورت عود مجدد: ۵۰۰ میلی گرم ۲ بار در روز و به مدت ۳ روز تجویز می شود.

بیماران همودیالیزی باید داروی خود را بعد از همودیالیز دریافت نمایند.

پیشگیری از تبخال تناسلی عود کننده در بزرگسالان:

• در بیماران با سیستم ایمنی نرمال ۱ گرم یک بار در روز تجویز می شود.

• در بیماران با تاریخچه ۹ مورد یا کمتر عود مجدد بیماری در سال، ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز تجویز می گردد.

• در بیماران آلوده به ویروس HIV ($CD_4 \geq 100 \text{ cells/mm}^3$) ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز تجویز می شود و جهت کاهش انتقال از شریک جنسی آلوده با تاریخچه ۹ مورد یا کمتر عود بیماری در سال، ۵۰۰ میلی گرم یک بار در روز تجویز می گردد.

- درمان زونا (هرپس زوستر): در سریع ترین زمان ممکن بعد از تشخیص ۱ گرم از دارو ۳ بار در روز به مدت ۷ روز، تجویز می شود.

- درمان آبله مرغان در افراد ۱۸-۲۰ سال:

دوز معمول ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سه بار در روز به مدت ۵ روز (توصیه می شود درمان با بروز اولین علائم شروع شود).

حداکثر دوز: ۱ گرم سه بار در روز.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به توجه بیشتری دارند:

قاعدگی دردناک به همراه اسهال و تهوع شدید، کم خونی آپلاستیک (علائم: درد قفسه سینه، تب و لرز، سرفه، سردرد، کوتاه شدن تنفس)، اختلالات آنزیم های کبدی (علائم: خستگی غیر معمول، زرد شدن رنگ پوست و چشم، علائم شبه آنفلوآنزا)، نارسایی کلیوی (علائم: درد پهلوها و قسمت تحتانی کمر به همراه کاهش حجم و دفعات ادرار)، ترومبوسیتوپنی (علائم: مدفوع سیاه رنگ، درد قفسه سینه، تب و لرز، سرفه)، واکنش های حساسیتی شدید (علائم: افزایش ضربان قلب، ورم صورت، خس خس سینه، سختی تنفس و بلع، خارش و راش پوستی)، آتمی همولیتیک، کاهش سطح هوشیاری در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، رفتارهای تهاجمی، توهم، افزایش فشار خون و واکنش های پوستی (مانند اریتم مولتی فرم، حساسیت به نور و راش پوستی).

عوارضی که در صورت تداوم و یا بدتر شدن قابل توجه هستند:

سردرد، تهوع، درد مفاصل، ضعف و گیجی، یبوست، اسهال، بی اشتها، معده درد، استفراغ، اضطراب و بی قراری، خشکی دهان، تحریک پذیری و عصبانیت.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۵۵۱۷۰۵۵۴۴۹ داخلی ۳۵۸



BRC/P-S078-01/03

وریکونازول (وکوزیکس- آی اچ)

Vocozix -IH 200
Voriconazole
F.C. Tablet

وکوزیکس- آی اچ ۲۰۰
وریکونازول
قرص روکش دار

راهنمایی های عمومی برای مصرف مصرف دارو:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.
- در صورت وجود سابقه حساسیت به این دارو یا سایر داروها، مواد جانبی داروها، رنگ ها و غذاها، موارد را به پزشک خود اطلاع دهید.
- سابقه پیوند مغز استخوان، مصرف داروهای شیمی درمانی، بیماری های قلبی، کلیوی و کبدی را به پزشک خود اطلاع دهید.

موارد منع مصرف:

استفاده هم زمان وریکونازول با داروهای ترفنادین، آستemizol، سیزاپراید، پیموزاید، کینیدین، سیرولیموس، ریفاپین، کاربامازپین، باریتورات های طولانی اثر، دوزهای بالای ریتوناویر و آلکالوئیدهای ارگوت مانند ارگوتامین و دی هیدروارگوتامین و گیاه علف چای منع مصرف دارد.
حساسیت به وریکونازول و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده دارو.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در رده D حاملگی قرار دارد و مصرف آن در این دوران ممنوع است. ممکن است در صورت ضرورت و حیاتی بودن مصرف دارو، با ارزیابی فواید مصرف دارو بر مضرات آن توسط پزشک تجویز شود.

اطلاعات کافی در مورد بی ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی وجود ندارد، بنابراین مصرف آن توصیه نمی شود.

احتیاطات:

- مصرف این دارو در برخی افراد سبب تاری دید و درخشش نقطه ای در میدان دید می شود بنابراین توصیه می شود از رانندگی، مخصوصاً در شب و کار با ماشین آلاتی که نیاز به بینایی و دقت بالا دارند اجتناب نمایید.
- در صورت مصرف طولانی مدت دارو (بیش از ۲۸ روز) انجام معاینات دوره ای و دقیق چشم توصیه می شود.

- در بیماران قلبی، کبدی و نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود.
- در طول مصرف این دارو از مواجهه طولانی مدت با نور مستقیم آفتاب پرهیز نمایید.
- استفاده از یک روش موثر ضدبارداری برای خانم های در سن باروری الزامی است.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف داروهای زیر پزشک خود را مطلع سازید:
کاربامازپین، فنی توین، فنوباربیتال، پیموزاید، سیزاپراید، سایمتیدین، امپرازول، پنتوپرازول، ارگوتامین، دی هیدروارگوتامین، متیل ارگونوین، کینیدین، افابیرنز، ریتوناویر، ریفاپین، اریترومايسين، لووآستاتین، آتورواستاتین، سیمواستاتین، نیفدیپین، دیلتیازم، وراپامیل، داروهای مخدر، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا NSAID ها، گلی بنکلامید، پردنیزولون، تاکرولیموس، سیرولیموس، کلوفیدوگرل، وارفارین، سیکلوسپورین، زولپیدم، آلپرازولام، کلونازپام، لورازپام، دیازپام، فلورازپام، میدازولام، اکازپام، داروهای جلوگیری از بارداری، فلوکونازول، وین بلاستین، وین کریستین، آریپیپرازول، ساکساکلیپتین، نویراپین، ارلوتینیب، ریواروکسابان، نیلوتینیب، ریفاپین، دوستاکسل، نلفیناویر و گیاه علف چای (قطره هایپیران).

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

در بیماران با وزن بیشتر از ۴۰ کیلو گرم درمان به صورت ۲۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت بوده و در صورت عدم پاسخ مناسب، دوز خوراکی تا ۳۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت افزایش می یابد.
- در بیماران با وزن کمتر از ۴۰ کیلو گرم درمان به صورت ۱۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت شروع و در صورت عدم پاسخ مناسب، این دوز تا ۱۵۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت افزایش می یابد.
بیماران باید حداقل تا ۱۴ روز پس از بهبود علایم یا ۱۴ روز بعد از آخرین کشت مثبت درمان شوند.

- مصرف دارو همراه با غذا باعث کاهش میزان جذب آن می شود، بنابراین توصیه می شود دارو را یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا مصرف نمایید.

- در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت از دارو به محض یادآوری آن را مصرف نمایید، ولی اگر زمان مصرف بعدی دارو فرا رسیده باشد از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز بشود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولیکن در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارضی که نیاز به توجه بیشتری دارند:

راش پوستی، زردی، افزایش و یا کاهش فشار خون، افت پتاسیم و منیزیم خون (علایم: گیجی، کاهش حجم ادرار، خشکی دهان، ضربان نامنظم قلب، بی اشتهایی، درد و گرفتگی عضلات، تهوع و استفراغ، تغییرات خلقی، بی حسی و یا احساس سوزش در دست ها، پاها و لب ها، کوتاه شدن تنفس، خستگی و ضعف غیر عادی)، تغییر در نتایج آزمایش های کبدی، ادم محیطی، افزایش ضربان قلب، کم خونی، قرمز شدن چشم ها، درد چشم، ترومبوسیتوپنی، پان سائیتوپنی، لکوپنی، اختلال در نوار قلبی (QT prolongation).

عوارضی که در صورت تداوم و یا ایجاد زحمت برای بیمار قابل توجه هستند:

اختلالات بینایی، تب و لرز، تهوع و استفراغ، درد شکمی، اسهال، گیجی، خشکی دهان، سردرد، توهیم، کپهر، درد قفسه سینه.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران
تلفن صدای مشتری: ۱۹-۰۵۵۱۷-۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



هیدروکسی پروژسترون کاپروات (هیدروژکس - آی اچ ۲۵۰ و ۵۰۰)

Hydroxyprogesterone Caproate
Hydrogex-IH
250 mg / 1 ml
500 mg / 2 ml
Injectable Solution

هیدروکسی پروژسترون کاپروات
هیدروژکس - آی اچ
۲۵۰ میلی گرم در ۱ میلی لیتر
۵۰۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر
محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای بیمار:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا تومیه به دیگران جداً خودداری نمایید.

در صورت بروز عوارضی مانند: درد، تورم، خارش، کبودی و واکنش های محل تزریق شامل واکنش های التهابی، تراوش خون یا مایع و احساس ناراحتی بیش از حد را حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

اثر بخشی و بی خطر بودن این دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

موارد منع مصرف:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت داشتن سابقه حساسیت به پروژستین ها و یا سایر اجزای فرآورده.
- دیابت، مرع، سردردهای میگرنی، آسم، مشکلات قلبی، مشکلات کلیه، افسردگی، فشار خون بالای کنترل نشده، تومورهای کبدی خوش خیم یا بدخیم یا بیماری کبدی فعال، اختلالات ترومبوز یا ترومبوآمبولی، زردی در زمان بارداری، خونریزی غیر طبیعی واژینال، سابقه سرطان پستان و یا سرطان وابسته به هورمون.

مصرف در بارداری و شیردهی:

این دارو در شیر مادر ترشح می شود. دارو را از هفته ۳۷ بارداری یا تولد نوزاد قطع نمایید.
بسیاری از مطالعات هیچ گونه عوارض جانبی از پروژستین ها در کارایی شیر مادر یا بر روی سلامتی و رشد نوزاد را نشان نمی دهند.

این دارو در بارداری در رده B قرار دارد. مطالعات کنترل شده هیچ گونه ناهنجاری های مادرزادی شامل اختلالات تناسلی در نوزادان دختر یا پسر در طول مصرف این دارو را نشان نداده است.

هشدارها:

- اختلالات ترومبوآمبولی: در صورت داشتن سابقه ترومبوز وریدی عمقی یا شریانی در چند وقت اخیر دارو را قطع نمایید.

- واکنش های آلرژیک: در صورت وقوع واکنش های حساسیتی شامل کهیر، خارش و آنژیوادم در هنگام مصرف دارو، آن را قطع نمایید.

- عدم تحمل گلوکز: پروژسترون ها ممکن است تحمل گلوکز را کاهش دهند لذا میزان گلوکز خون در بیماران دیابت باید مانیتور گردد.

هشدار: در صورت ایجاد رسوب از مصرف آن خودداری شود.

احتیاطات:

- بیماران دارای سابقه افسردگی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. در صورت عود بیماری بر اساس شواهد، مصرف دارو باید قطع گردد.

در صورت بروز علایمی مانند از دست دادن ناگهانی بینایی به طور کامل و یا جزئی و یا بروز ناگهانی دوبینی، میگرن و بیرون زدگی چشم و ضایعات عروقی چشم در طول درمان، مصرف دارو باید قطع گردد.

نگهداری مایعات: داروهای پروژستینی ممکن است باعث احتباس آب شوند، لذا خانم هایی که مستعد (پره) اکلیمسی، مرع، میگرن، آسم، اختلالات کلیوی و قلبی، باشند باید مانیتور گردند.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع سازید.

در طول درمان با هیدروکسی پروژسترون کاپروات ممکن است غلظت داروهای توفیلین، کلوزاپین، استامینوفن، هالوتان، نیکوتین، آقویرن، بوبروپرون و متادون در بدن افزایش یابد.

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل می باشد:
تولد نوزاد زودتر از موعد مقرر:

شروع درمان بین هفته ۱۶ و هفته ۲۱ بارداری می باشد، ابتدا ۲۵۰ میلی گرم هفته ای ۱ مرتبه عضلانی تجویز

می گردد. درمان تا هفته ۳۷ بارداری یا تولد نوزاد ادامه می یابد.

- آمپور (اولیه و ثانویه) و خونریزی غیرطبیعی رحمی به علت عدم تعادل هورمونی:

۳۷۵ میلی گرم عضلانی تزریق شود و یا ۲۰۰ میلی گرم استرادیول والرات روز اول سیکل تزریق شود. ۲ هفته بعد ۲۵۰ میلی گرم هیدروکسی پروژسترون کاپروات و ۵ میلی گرم استرادیول والرات تزریق گردد. ۴ روز بعد از تخریب دیواره رحم یا اگر خونریزی اتفاق نیفتد ۲۱ روز بعد هیدروکسی پروژسترون کاپروات به تنهایی تزریق شود. هر ۴ هفته تا ۴ سیکل تزریق می تواند انجام گردد.

- ترشحات و ریزش اپی تلیال اندومتريوم:

بر اساس شرایط بیمار درمان به یکی از ۳ روش زیر انجام می گیرد:

● در صورتی که بیمار تحت درمان با استروژن نباشد: برنامه درمان سیکلیک انجام می گیرد. روز اول سیکل ۲۰۰ میلی گرم استرادیول والرات تزریق گردد. ۲ هفته بعد ۲۵۰ میلی گرم هیدروکسی پروژسترون کاپروات و ۵ میلی گرم استرادیول والرات تزریق گردد. این برنامه هر ۴ هفته تکرار شود تا زمانی که نیازی به درمان نباشد. در صورت کمبود طولانی مدت استروژن، منس شدن تا زمانی که استروژن برای چند ماه تجویز نگردد، اتفاق نمی افتد.

● اگر بیمار تحت درمان با استروژن باشد: ۳۷۵ میلی گرم هیدروکسی پروژسترون کاپروات تزریق گردد.

● در صورتی که دوره درمان به صورت سیکلیک انجام گردد: روز اول سیکل ۲۰۰ میلی گرم استرادیول والرات تزریق گردد. ۲ هفته بعد ۲۵۰ میلی گرم هیدروکسی پروژسترون کاپروات و ۵ میلی گرم استرادیول والرات تزریق گردد.

۴ روز بعد از تخریب دیواره رحم یا اگر خونریزی اتفاق نیفتد هیدروکسی پروژسترون کاپروات به تنهایی تزریق شود. این برنامه هر ۴ هفته تکرار گردد تا زمانی که دیگر نیازی به درمان نباشد.

- آدنوکارسینوما رحم در مراحل پیشرفته (مرحله ۳ و ۴):

۱۰۰۰ میلی گرم یا بیشتر (۱ تا ۷ گرم در هفته) بلافاصله به صورت عضلانی و تا زمانی که بیماری عود می کند: بعد از ۱۲ هفته که پاسخ لازم ایجاد نشد درمان قطع می گردد.

سنجش تولید داخلی استروژن:

۲۵۰ میلی گرم، برای اطمینان ۴ هفته بعد از اولین تزریق تکرار شود.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

از شایع ترین عوارض جانبی این دارو می توان به واکنش های محل تزریق شامل درد، تورم، خارش و سفت شدن در محل تزریق، کهیر، خارش، تهوع و اسهال اشاره نمود. از دیگر عوارض جانبی این دارو می توان به گوارش مانند کرامپ های شکمی، نفخ، ادم، لکه بینی، تغییرات وزنی، سردرد، افزایش موکوس دهانه رحم، راش آلرژیک، آبرسه، سردرد میگرنی، افزایش فشار خون، افسردگی، عدم تخم گذاری بعد از درمان، کیست، رشد موی زاید، ریزش موی سر، تغییر در میل جنسی، تغییر در اشتها، سرگیجه و خستگی اشاره کرد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از نور و در دمای بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

- این دارو برای یک بار مصرف است. بعد از مصرف باقی مانده دارو را دور بریزید.

- دارو را خارج از یخچال نگهداری نمایید.

- از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران، ایران
تلفن مدای مشتری: ۱۹-۱۷۵۱۷۰۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/P-PJ35-01/03

هیپارین سدیم

Heparin Sodium 5000

5000 IU/ 1ml
Injectable Solution

هیپارین سدیم ۵۰۰۰

۵۰۰۰ واحد در ۱ میلی لیتر
محلول قابل تزریق

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

این دارو بر حسب نیاز فعلی شما تجویز گردیده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

در صورت داشتن حساسیت به هیپارین و یا هر کدام از اجزای فرمولاسیون، کاهش شدید تعداد پلاکت های خون و خونریزی فعال غیر قابل کنترل. در صورت سابقه حساسیت به گوشت گاو و یا هر نوع پروتئین حیوانی.

نکات قابل توجه به هنگام مصرف دارو:

دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید و از قطع مصرف و یا تغییر میزان دارو بدون مشورت با پزشک بپرهیزید.

از تزریق دارو به صورت عضلانی خودداری شود.

علائم و نشانه های خونریزی در بیمار باید از نزدیک و با دقت بررسی شوند. در برخی بیماران شامل بیماران مبتلا به اندوکاردیت تحت حاد باکتریایی، بیماری های خونریزی مادرزادی و یا اکتسابی، زخم فعال گوارشی، تخلیه مستمر دستگاه گوارش با لوله، فشار خون شدید کنترل نشده، سابقه سکنه همورائیک، استفاده با فاصله زمانی کم بعد از جراحی مغز، ستون فقرات، چشم و یا هر فرایند تهاجمی شامل بیهوشی نخاعی یا اسپینال تپ، همزمانی مصرف با مهار کننده های پلاکتی، خونریزی اخیر گوارشی، کاهش تعداد پلاکت های خون یا نقص پلاکتی، بیماری شدید کبدی، رتینوپاتی در بیماران دیابتی و یا بیماران مبتلا به فشار خون بالا، هموفیلی، نارسایی کلیوی و یا بیماران بالای ۶۰ سال (به خصوص زنان) احتمال خطر خونریزی بیشتر می باشد. در این بیماران در صورت خونریزی یا استفاده از دوز بالای دارو از پروتامین استفاده شود.

مصرف هیپارین می تواند سبب افزایش پتاسیم خون شود بنابراین سطح پتاسیم خون باید چک شود. مصرف طولانی مدت هیپارین (بیشتر از ۶ ماه) می تواند سبب کاهش دانسیته مواد معدنی موجود در استخوان شود.

در طول مصرف هیپارین سطح فاکتورهای انعقادی خون باید مورد بررسی قرار گیرد.

این دارو بیمارستانی است.

تداخلات:

مشقات ۵- آمینوسالیسیلیک اسید می توانند سمیت و عوارض جانبی هیپارین را افزایش دهند. هیپارین به همراه داروهای مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین و مهارکننده های گیرنده آنژیوتانسین نوع دو سبب تشدید افزایش سطح پتاسیم خون می شود. علاوه بر این موارد، هیپارین می تواند با داروهای زیر نیز تداخل داشته باشد:

آلپسکیرن، آنتی ترومبین، آپیکسابان، آسپیرین، کانگالیکلوزین، کلاناز، کورتیکورلین، دایکاتران اتکسیلات، داساتینیب، دفازیروکس، دنوکسی کولیک اسید، دسیرودین، ادوکسابان، اپلرون، مشتقات استروژن، فاکتور X، مشتقات گیاهی با اثرات آنتی کوآگولانتی و یا ضد پلاکتی، ایبریتومومب، ایبروتینیب، لیماپروست، نیتدانیپ، نیتروگلیسیرین، ضد التهاب های غیر استروئیدی، اینوتوزومب، اماستاکسین، امگا ۳، اوریتاوانسین، پالیفرمین، پیتوسان پلی سولفات سدیم، پنتوکسی فیلین، نمک های پتاسیم، دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم، پروستین ها، آنالوگ های پروستاسایکلین، ریواروکسابان، سالیسیلات ها، استرپتوکیناز، سوگامادکس، تلاوانسین، ترکیبات ترومبولیتیک، تیپولون، تیپرانایور، توسیتومومب، آبوداین ۱۳۱، اوروکیناز، ویتامین E، آنتاگونیست های ویتامین K مانند وارفارین، ووراپاکسار.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می نماید اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

بر اساس نحوه استفاده، شرایط بیمار و نوع بیماری دوز دارو متفاوت می باشد.

- پیشگیری از ترومبوز:

۵۰۰۰ واحد به صورت زیر جلدی هر ۸ تا ۱۲ ساعت استفاده می شود.

توصیه می شود در بیمارانی که تحت جراحی تعویض مفصل ران، تعویض مفصل زانو یا جراحی شکستگی ران قرار گرفته اند، حداقل ۱۰ تا ۱۴ روز استفاده گردد.

- آمبولی حاد ریه یا ترومبوز وریدی عمقی یا یا اندام های فوقانی:

تزریق وریدی: ابتدا ۸۰ واحد به ازای هر کیلو گرم از وزن بیمار و دوز نگهدارنده ۱۸ واحد به ازای هر کیلو گرم وزن بیمار در ساعت.

تزریق زیر جلدی: ابتدا ۳۳۳ واحد به ازای هر کیلوگرم از وزن بیمار و دوز نگهدارنده ۲۵۰ واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار دوبار در روز.

- آتژین ناپایدار: ابتدا ۶۰ واحد به ازای هر کیلوگرم از وزن بیمار به صورت وریدی (بیشترین میزان ۴۰۰۰ واحد) و دوز نگهدارنده ۱۲ واحد به ازای هر کیلوگرم از وزن بیمار در ساعت به صورت وریدی (بیشترین میزان ۱۰۰۰ واحد در ساعت).

- سکنه قلبی حاد یا افزایش پیک: ابتدا ۶۰ واحد به ازای هر کیلوگرم از وزن بیمار به صورت وریدی (بیشترین میزان ۴۰۰۰ واحد) و دوز نگهدارنده ۱۲ واحد به ازای هر کیلوگرم از وزن بیمار در ساعت به صورت وریدی (بیشترین میزان ۱۰۰۰ واحد در ساعت). درمان را حداقل ۴۸ ساعت و ترجیحاً در طول بستری بودن بیمار (تا ۸ روز) یا در صورت انجام عمل آنژیوپلاستی یا عمل جراحی بای پس عروق کرونر تجویز دارو تا آن هنگام ادامه یابد.

مصرف در دوران بارداری:

هیپارین در بارداری در رده C قرار دارد و از جفت عبور نمی کند. هیپارین در پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی در خانم های باردار ممکن است استفاده شود. اگرچه استفاده از هیپارین با وزن مولکولی پایین ترجیح داده می شود.

مصرف در دوران شیردهی:

هیپارین در شیر مادر ترشح نمی شود و در خانم های شیرده می تواند استفاده شود.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت نمایید.

خونریزی (شایع ترین شکایت در طول درمان با هیپارین)، کاهش تعداد پلاکت های خون، واکنش های حساسیتی همراه با تب، لرز، کهیر، آسم، آبریزش بینی، سردرد، تهوع و استفراغ و واکنش های آنفیلکسی شامل شوک (به ندرت اتفاق می افتد)، خارش و سوزش به ویژه در انگشتان پا، قرمزی، خون مردگی، تحریک موضعی، درد خفیف محل تزریق زیر جلدی، تداخل در نتایج تست های ALT و AST.

شرایط نگهداری:

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، تهران
تلفن مبدای مشتری: ۱۹-۱۷۰۵۵۵۴۴۹۰ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- PO34- 01/ 02

هیدروکورتیزون (سوکورتیز)

Socortise 10

Hydrocortisone

Scored Tablet

سوکورتیز ۱۰

هیدروکورتیزون

قرص خط دار

و در نهایت قطع نمود. از قطع ناگهانی مصرف دارو در این موارد جداً خودداری نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

– بزرگسالان: ۲۰ تا ۲۴۰ میلی گرم در روز به صورت تک دوز یا منقسم.
– کودکان: براساس وزن و سطح بدن آنها توسط پزشک تعیین می گردد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک خود مشورت کنید:

شوک آنافیلاکسی، گرگرفتن صورت و گونه ها، پانکراتیت، افزایش اشتها، سوء هاضمه، عصبانیت یا بی قراری، اشکال در به خواب رفتن، تیره یا کمرنگ شدن پوست، سرگیجه، سردرد، منگی، برافروختگی و درد مفاصل از جمله عوارض این دارو می باشند.

عوارض مصرف طولانی مدت دارو:

اختلالات قاعدگی، ضعف عضلانی، پیدایش شیارهایی در پوست، پرمویی، آکنه، زخم گوارشی، نازکی و شکنندگی پوست، پارگی تاندون، افزایش فشار خون، پوکی استخوان، گرد شدن صورت، عدم تعادل آب و الکترولیت، گلوکوم، دیابت ملیتوس، اختلالات روانی، نایبانی ناگهانی، آریتمی قلبی، صرع، کاهش عملکرد آدرنال، کاتاراکت، سندرم کوشینگ، کاهش رشد (در کودکان)، تاخیر در روند بهبودی زخم، عفونت چشمی.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
– دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

ساخت شرکت داروسازی ایران هورمون، ایران، تهران

تلفن صدای مشتری: ۱۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ داخلی ۳۵۸



BRC/ P- SDI 6- 01/ 02

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

– این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز گردیده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

– وجود هر نوع حساسیت به کورتیکواستروئیدها و موارد دیگر از قبیل غذا، مواد محافظ و رنگ ها.

– در صورت ابتلا به بیماری هایی نظیر عفونت های موضعی یا سیستمیک، اختلالات دستگاه گوارش، بیماری های قلبی-عروقی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری های کلیوی، دیابت ملیتوس، میاستنی گراویس، اختلالات مربوط به غده تیروئید، بیماری های کبدی و بالا بودن کلسترول خون، توبرکلوزیس، آبله مرغان، گلوکوما، لوپوس اریتموماتوزیس.

– در صورت حاملگی و شیردهی.

نکات قابل توصیه به هنگام مصرف دارو:

– برای به حداقل رساندن تحریکات گوارشی، این دارو را با غذا مصرف کنید.
مصرف همزمان الکل ممکن است سبب افزایش اثرات اولسروژنیک این دارو گردد.

– در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو به ترتیب زیر عمل نمایید:
در صورت مصرف یک روز در میان دارو، اگر صبح همان روز به یاد آوردید دارو را مصرف کنید در غیر این صورت صبح روز بعد دارو را مصرف نمایید.
بنابراین یک روز مصرف دارو حذف می شود.

اگر دارو را یک بار در روز مصرف می کنید به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر زمان مصرف بعدی فرا رسیده است، دوز بعدی را مصرف کرده و مقدار مصرف را دو برابر ننمایید.

اگر دارو چند بار در روز تجویز شده است، هرچه زودتر آن را مصرف کنید و اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است آن را دو برابر نکنید.

– از مصرف بیش از مقدار و مدت توصیه شده توسط پزشک خودداری نمایید.
– به منظور عدم ناسازگاری دارویی در مورد مصرف هر نوع داروی نسخه ای و بدون نسخه با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

– در درمان دراز مدت ممکن است محدودیت مصرف سدیم و کالری و مصرف بیشتر مکمل پتاسیم و پروتئین مورد نیاز باشد.

– در طول درمان با این دارو به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.

– جهت قطع مصرف دارو به دنبال مصرف طولانی مدت آن توصیه می شود که تحت نظر پزشک معالج به صورت دوره ای و به تدریج مقدار مصرف دارو را کم